

BSMM201CCT

تفرقی مساوات

(Differential Equations)

مع

لیب مینول

(Lab Manual)

فاصلاتی اور روایتی نصاب پر مبنی خود اکتسابی مواد

برائے

پچلر آف سائنس (بی۔ ایس سی)

(دوسرا سمسٹر)

نظامت فاصلاتی تعلیم

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

حیدرآباد-32، تلنگانہ-بھارت

©Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad

Course-Bachelor of Science

ISBN: 978-XX-XXXXX-XX-X

Edition: January, 2022

ناشر	:	رجسٹرار، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
اشاعت	:	جنوری، 2022
تعداد	:	1000
کمپوزنگ	:	ڈاکٹر کاشف خان، نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
ترتیب و تزئین	:	ڈاکٹر محمد اکمل خان، نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

تفرقی مساوات

(Differential Equations)

For B.Sc. 2nd Semester

On behalf of the Registrar, Published by:

Directorate of Distance Education

Maulana Azad National Urdu University

Gachibowli, Hyderabad-500032 (TS), Bharat

Director: dir.dde@manuu.edu.in Publication : dpublication@manuu.edu.in

Phone number: 040-23008314

Website: manuu.edu.in



مجلس ادارت

(Editorial Board)

مضمون مدیران (Subject Editors)	
Dr. Syed Abdul Hai Head, Dept of Mathematics MAM Govt. Junior College, Nampally, Hyderabad	ڈاکٹر سید عبدالحی صدر، شعبہ ریاضی ایم اے ایم جونیئر کالج، نامپلی، حیدرآباد
Dr. Khaja Moinuddin Assistant Professor (Mathematics) School of Sciences, MANUU	ڈاکٹر خواجہ معین الدین اسسٹنٹ پروفیسر (ریاضی) اسکول برائے سائنسی علوم، مانو، حیدرآباد
Dr. Kashif Khan Guest Faculty (Mathematics) DDE, MANUU	ڈاکٹر کاشف خان گیسٹ فیکلٹی (ریاضی) نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد
زبان مدیر (Language Editor)	
Dr. Mohd Akmal Khan Guest Faculty (Urdu) Directorate of Distance Education, MANUU	ڈاکٹر محمد اکمل خان گیسٹ فیکلٹی (اردو) نظامت فاصلاتی تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

نظامت فاصلاتی تعلیم

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

حیدرآباد-32، تلنگانہ-بھارت

کورس کو آرڈی نیٹر

ڈاکٹر خواجہ معین الدین

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ریاضی

اسکول برائے سائنسی علوم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد

مصنفین

اکائی نمبر

اکائی 1 تا 4

اکائی 5 تا 16

- ڈاکٹر خواجہ معین الدین، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ریاضی، مانو، حیدرآباد
- ڈاکٹر کاشف خان، گیسٹ فیکلٹی (ریاضی)، ڈی ڈی ای، مانو، حیدرآباد

لیب مینول

اکائی 17 تا 20

اکائی 21 تا 24

- ڈاکٹر خواجہ معین الدین، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ ریاضی، مانو، حیدرآباد
- ڈاکٹر کاشف خان، گیسٹ فیکلٹی (ریاضی)، ڈی ڈی ای، مانو، حیدرآباد

پروف ریڈرس:

اول	:	ڈاکٹر کاشف خان
دوم	:	ڈاکٹر محمد اکمل خان
فائنل	:	ڈاکٹر خواجہ معین الدین

فہرست

7	وائس چانسلر	پیغام
8	ڈائریکٹر	پیغام
9	کورس کو آرڈی نیٹر	کورس کا تعارف
بلاک I		
11	تفرقی مساوات کی تشکیل	اکائی 1
24	پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساواتیں	اکائی 2
47	ٹھیک تفرقی مساوات	اکائی 3
67	پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساواتیں	اکائی 4
بلاک II		
88	پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساواتیں (p کے لیے حل کی جانے والی مساواتیں)	اکائی 5
110	پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساوات (x اور y کے لیے حل کی جانے والی مساواتیں)	اکائی 6
126	پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساواتیں (کلیر و کی مساوات)	اکائی 7
144	پہلے رتبے کی تفرقی مساواتوں کے اطلاقات: عمودی ٹراجکٹری	اکائی 8
بلاک III		
164	مستقل ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساواتیں	اکائی 9
183	مستقل ضریب کے غیر متجانس خطی تفرقی مساواتوں کے خاص بتکملے	اکائی 10
219	متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساواتیں	اکائی 11
241	متغیر ضریب کے اعلیٰ رتبے کی خطی تفرقی مساواتیں (پیرامیٹرس کے تغیر کا طریقہ)	اکائی 12

بلاک IV

260	جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل-I	اکائی 13
281	جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل-II	اکائی 14
291	جزوی تفرقی مساواتوں کے حل (لگرنج کا طریقہ)	اکائی 15
308	جزوی تفرقی مساواتوں کے حل (چارپٹ کا طریقہ)	اکائی 16

325

نمونہ امتحانی پرچہ

327

لیب مینول

بلاک V

328	تفرقی مساواتوں کی تشکیل، پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساواتوں کے مسائل	اکائی 17
339	ٹھیک مساواتیں، خطی تفرقی مساوات اور ان کے مسائل	اکائی 18
351	$p = \frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کی جانے والی مساواتیں، پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساواتوں کے مسائل	اکائی 19
361	کلیر وکی مساوات اور تفرقی مساوات کے اطلاقات کے مسائل	اکائی 20

بلاک VI

373	مستقل ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساواتوں کے مسائل	اکائی 21
383	متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات اور پیرامیٹرس کے تغیر کے مسائل	اکائی 22
391	جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کے مسائل	اکائی 23
398	لگرنج اور چارپٹ کے طریقے کے مسائل	اکائی 24

404

نمونہ امتحانی پرچہ

پیغام

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 1998 میں وطن عزیز کی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت قائم کی گئی۔ اس کے چار نکاتی مینڈیٹس یہ ہیں۔

(1) اردو زبان کی ترویج و ترقی (2) اردو میڈیم میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی تعلیم کی فراہمی (3) روایتی اور فاصلاتی تدریس سے تعلیم کی فراہمی اور (4) تعلیم نسواں پر خصوصی توجہ۔ یہ وہ بنیادی نکات ہیں جو اس مرکزی یونیورسٹی کو دیگر مرکزی جامعات سے منفرد اور ممتاز بناتے ہیں۔

قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلیم کی فراہمی پر کافی زور دیا گیا ہے۔

اردو کے ذریعے علوم کو فروغ دینے کا واحد مقصد و منشا اردو داں طبقے تک عصری علوم کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے اردو کا دامن علمی مواد سے لگ بھگ خالی رہا ہے۔ کسی بھی کتب خانے یا کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ اس بات کی تصدیق کر دیتا ہے کہ اردو زبان سمٹ کر چند ”ادبی“ اصناف تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت اکثر رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اردو میں دستیاب تحریریں قاری کو کبھی عشق و محبت کی پُر پیچ راہوں کی سیر کراتی ہیں تو کبھی جذباتیت سے پُرساسی مسائل میں الجھاتی ہیں، کبھی مسلکی اور فکری پس منظر میں مذاہب کی توضیح کرتی ہیں تو کبھی شکوہ و شکایت سے ذہن کو گراں بار کرتی ہیں۔ تاہم اردو قاری اور اردو سماج دور حاضر کے اہم ترین علمی موضوعات سے نابلد ہیں۔ چاہے یہ خود ان کی صحت و بقا سے متعلق ہوں یا معاشی اور تجارتی نظام سے، یا مشینی آلات ہوں یا ان کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوں، عوامی سطح پر ان شعبہ جات سے متعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے عصری علوم کے تئیں ایک عدم دلچسپی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ یہی وہ مبارزات (Challenges) ہیں جن سے اردو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصابی مواد کی صورت حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اسکولی سطح پر اردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی سال کے شروع میں زیر بحث آتے ہیں۔ چوں کہ اردو یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو ہے اور اس میں عصری علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہذا ان تمام علوم کے لیے نصابی کتابوں کی تیاری اس یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ انہیں مقاصد کے حصول کے لیے اردو یونیورسٹی کا آغاز فاصلاتی تعلیم سے 1998 میں ہوا تھا۔

مجھے اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ اس کے ذمہ داران بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور ماہرین علم کے بھرپور تعاون کی بنا پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ بڑے پیمانے پر شروع ہو گیا ہے۔ فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے لیے کم سے کم وقت میں خود اکتسابی مواد اور خود اکتسابی کتب کی اشاعت کا کام عمل میں آ گیا ہے۔ پہلے سمسٹر کی کتب شائع ہو کر طلباء و طالبات تک پہنچ چکی ہیں۔ دوسرے سمسٹر کی کتابیں بھی جلد طلباء تک پہنچیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے ہم ایک بڑی اردو آبادی کی ضروریات کو پورا کر سکیں گے اور اس یونیورسٹی کے وجود اور اس میں اپنی موجودگی کا حق ادا کر سکیں گے۔

پروفیسر سید عین الحسن

وائس چانسلر

پیغام

فاصلاتی طریقہ تعلیم پوری دنیا میں ایک انتہائی کارگر اور مفید طریقہ تعلیم کی حیثیت سے تسلیم کیا جا چکا ہے اور اس طریقہ تعلیم سے بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں ہی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حال کو محسوس کرتے ہوئے اس طرز تعلیم کو اختیار کیا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغاز 1998 میں نظامت فاصلاتی تعلیم اور ٹرانسلیشن ڈویژن سے ہوا اور اس کے بعد 2004 میں باقاعدہ روایتی طرز تعلیم کا آغاز ہوا اور بعد ازاں متعدد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے۔ نو قائم کردہ شعبہ جات اور ٹرانسلیشن ڈویژن میں تقرریاں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مجاز کے بھرپور تعاون سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحریر و ترجمے کے ذریعے تیار کرائے گئے۔

گزشتہ کئی برسوں سے یو جی سی۔ ڈی ای ب UGC-DEB اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ فاصلاتی نظام تعلیم کے نصابات اور نظامات کو روایتی نظام تعلیم کے نصابات اور نظامات سے کما حقہ ہم آہنگ کر کے نظامت فاصلاتی تعلیم کے طلباء کے معیار کو بلند کیا جائے۔ چونکہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی فاصلاتی اور روایتی طرز تعلیم کی جامعہ ہے، لہذا اس مقصد کے حصول کے لیے یو جی سی۔ ڈی ای بی کے رہنمائی اصولوں کے مطابق نظامت فاصلاتی تعلیم اور روایتی نظام تعلیم کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند کر کے خود اکتسابی مواد SLM از سر نو بالترتیب یو جی اور پی جی طلباء کے لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر مشتمل نئے طرز کی ساخت پر تیار کرائے جا رہے ہیں۔

نظامت فاصلاتی تعلیم یو جی پی جی بی ایڈ ڈپلوما اور سرٹیفکیٹ کورسز پر مشتمل جملہ پندرہ کورسز چلا رہا ہے۔ بہت جلد تکنیکی ہنر پر مبنی کورسز بھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے 9 علاقائی مراکز بنگلور، بھوپال، در بھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگر اور 5 ذیلی علاقائی مراکز حیدرآباد، لکھنؤ، جموں، نوح اور امراتہ کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے۔ ان مراکز کے تحت سر دست 155 متعلم امدادی مراکز (Learner Support Centre) کام کر رہے ہیں، جو طلباء کو تعلیمی اور انتظامی مدد فراہم کرتے ہیں۔ نظامت فاصلاتی تعلیم نے اپنی تعلیمی اور انتظامی سرگرمیوں میں آئی سی ٹی کا استعمال شروع کر دیا ہے، نیز اپنے تمام پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے دے رہا ہے۔

نظامت فاصلاتی تعلیم کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں، نیز جلد ہی آڈیو۔ ویڈیو ریکارڈنگ کالنگ بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلوؤں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات، کونسلنگ، امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے۔

امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اور معاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت فاصلاتی تعلیم کا بھی نمایاں رول ہو

گا۔

پروفیسر محمد رضاء اللہ خان

ڈائریکٹر، انچارج، نظامت فاصلاتی تعلیم

حیدرآباد۔ 500032

کورس کا تعارف

زیر نظر کتاب تفرقی مساوات کے موضوعات سے متعلق ہے اور یہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے بی۔ ایس سی۔ کورس کے سال اول کے دوسرے سمسٹر کے نصاب پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں تفرقی مساوات کے بنیادی طریقہ کار کا تعارف، نظریات اور ان کے اطلاقات کو شامل کیا گیا ہے۔ تفرقی مساوات کی درجہ بندی دو اہم حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا معمولی تفرقی مساواتیں (Ordinary Differential Equations) اور دوسرا جزوی تفرقی مساواتیں (Partial Differential Equations)۔ اس کتاب کو سمجھنے لیے علم احصا کی بنیادی معلومات کا ہونا لازمی ہے۔ اس کتاب کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مواد کو سہل طریقے سے آسان زبان میں مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے تاکہ طلباء اپنے مضمون کو از خود سمجھ سکیں۔ کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جس میں پہلا حصہ نظریات (تھیوری) پر مبنی ہے اور دوسرا حصہ پریکٹکل (تجربوں) پر منحصر ہے۔

پہلا حصہ سولہ (16) اکائیوں اور 4 بلاک پر مشتمل ہے۔ پہلے بلاک میں تفرقی مساواتوں کی تشکیل، پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساواتیں، ٹھیک تفرقی مساواتیں اور پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساواتیں شامل ہیں۔

دوسرے بلاک میں "پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساواتیں" شامل کی گئی ہیں جس میں x, p اور y کے لیے حل کی جانے والی مساواتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ "لگرانج اور کلیرو کی مساواتیں" اور آخر میں "پہلے رتبے کی تفرقی مساواتوں کے اطلاقات عمومی ٹراجکٹری" کو بھی اس بلاک میں شامل کیا گیا ہے۔

طلباء کی تفہیم کو مد نظر رکھتے ہوئے تیسرے بلاک میں "مستقل ضریب کے متجانس اور غیر متجانس خطی تفرقی مساوات کو مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔" متغیر ضریب اور پیرامیٹرز کے تغیر کے طریقوں سے تفرقی مساوات کا حل پیش کیا گیا ہے۔

چوتھے بلاک میں "جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل"، "لگرانج اور چارپس" کے طریقے سے ان کے حل کو پیش کیا گیا ہے۔

طلباء کی مسئلہ حل صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے اکائی 17 سے اکائی 24 تک تجرباتی حصے (Practical Manual) کو شامل کیا گیا

ہے جس میں علم احصا کے مسائل اور ان کے حل کو تلاش کرنے کے طریقے پیش کیے گئے ہیں۔

اس کتاب کی تدوین میں مصنفین، مترجمین، تدریسی و غیر تدریسی و انتظامی عملے کے تعاون کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتاب کو معیاری اور قابل عمل و فہم بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے، تاہم کوئی بھی کوشش اپنے آپ میں مکمل نہیں ہوتی۔ اس ضمن میں اساتذہ کرام، ماہرین، طلباء کی آراء و مشوروں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔

ڈاکٹر خواجہ معین الدین

کورس کو آرڈی نیٹر

تفرقی مساوات

(Differential Equations)

اکائی 1۔ تفرقی مساوات کی تشکیل

(Formation of Differential Equations)

اکائی کے اجزا

تمہید	1.0
مقاصد	1.1
تفرقی مساوات کی تشکیل	1.2
تفرقی مساوات کا رتبہ اور درجہ	1.3
اکتسابی نتائج	1.4
کلیدی الفاظ	1.5
نمونہ امتحانی سوالات	1.6
معروضی جوابات کے حامل سوالات	1.6.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	1.6.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	1.6.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	1.7

1.0 تمہید (Introduction)

اگر $y = f(x)$ کوئی دیا گیا تفاعل ہے تب اس کا مشتق (Derivative) $\frac{dy}{dx}$ تبدیلی کی شرح کو ظاہر کرتا ہے۔ (متغیر y کی تابع x)۔ تفرقی مساوات کا نام خود اس بات کا غماز ہے کہ یہ وہ مساوات ہے جس میں نامعلوم مقدار میں مشتقات کے ذریعے جوڑے گئے ہیں۔

تفرقی مساوات دو قسم کے ہیں (i) معمولی تفرقی مساوات (Ordinary Differential Equations) (ii) جزوی تفرقی مساوات (Partial Differential Equations)۔ وہ مساوات جس میں نامعلوم تفاعل (Unknown Funct) اور اس کے معمولی مشتقات (Derivatives) شامل

ہوں، معمولی تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔ وہ مساوات جس میں نامعلوم تفاعل (Unknown Funct) اور اس کے جزوی مشتقات (Partial Derivatives) شامل ہوں، جزوی تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

تفرقی مساوات (Differential Equation): وہ مساوات جس میں کسی تابع متغیر کے مشتقات موجود ہوں پہلے درجے کی تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔ جیسے کہ:

$$\frac{dy}{dx} + 2x = 0 \quad \text{.....(1)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 7\frac{dy}{dx} + 9y = 0 \quad \text{.....(2)}$$

$$\sqrt{\frac{dy}{dx}} = 2x - \frac{dy}{dx} \quad \text{.....(3)}$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 4\left(\frac{dy}{dx}\right) + 4x \quad \text{.....(4)}$$

$$3y = 2x\frac{dy}{dx} + \frac{1}{dy/dx} \quad \text{.....(5)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2z \quad \text{.....(6)}$$

$$x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6z \quad \text{.....(7)}$$

$$\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^7 + 2y = e^x \quad \text{.....(8)}$$

مندرجہ بالا مساوات میں (1) تا (5) اور (8) معمولی تفرقی مساوات کہلاتی ہیں۔ چوں کہ ان میں ایک تابع متغیر "y" اور ایک غیر تابع متغیر "x" موجود ہیں۔ جب کہ (6) اور (7) جزوی تفرقی مساوات (Partial Differential Equations) کہلاتی ہیں، چوں کہ اس میں ایک تابع متغیر اور دو غیر تابع متغیر موجود ہیں۔

نوٹ: مساوات $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ ایک n درجے والی معمولی تفرقی مساوات (ODE) کو ظاہر کرتا ہے۔ تفرقی مساوات کے درجے اور رتبے کے بارے میں آگے بحث کی جائے گی۔ اس طرح کی تفرقی مساوات بہت زیادہ استعمال میں آتی ہیں اور بہت سے شعبوں میں جن میں ان مساوات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خصوصاً وہ تمام مسائل جن میں کوئی چیز وقت کے مطابق گھٹتی یا بڑھتی ہے اسے ہم تفرق کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً $\frac{ds}{dt}$ جہاں s فاصلہ اور t وقت ہے تب $\frac{ds}{dt}$ رفتار (Velocity) کو اور $\frac{d^2s}{dt^2}$ اسراع (Acceleration) ہے۔

کو ظاہر کرتا ہے۔ چنانچہ مختلف طبقات کے مسائل تفرقی مساوات میں ظاہر کر کے اور ان کے حل سے بہت سی نامعلوم چیزوں کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ریاضیاتی نمونہ سازی (Mathematical Modeling) ریاضی کی وہ شاخ ہے جو آج بہت سے طبعی نظاموں کو ریاضی کے مسائل میں تبدیل کر کے انہیں پھر حل کر کے مطلوبہ خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان ماڈلس میں تفرقی مساوات کا بہت بڑا کردار استعمال میں آتا ہے۔

تفرقی مساوات کا رتبہ (Order of Differential Equation): تفرقی مساوات کا رتبہ اس کے اعظم ترین مشتق (Highest Derivative) کا رتبہ ہوتا ہے جو اس میں شامل ہو۔

مثلاً: $\frac{dy}{dx} + 5y = 0$ کا رتبہ (Order) 1 ہے

$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{5dy}{dx} + 6y = e^{2x}$ کا رتبہ 2 ہے اور

$\frac{d^3y}{dx^3} - 2x \frac{d^2y}{dx^2} + 7y = 0$ کا رتبہ 3 ہے۔

تفرقی مساوات کا درجہ (Degree of Differential Equation): تفرقی مساوات کے اعظم ترین مشتق کی قوت (Power) اس مساوات کی ڈگری ہوتی ہے۔ مثلاً $\frac{dy}{dx} + 2x = 0$ کا درجہ 1 ہے۔ $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^3 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^4 + 7y = 0$ کا درجہ 3 ہے چونکہ اعظم ترین مشتق $\frac{d^2y}{dx^2}$ کی قوت 3 ہے۔

مثال: $\frac{d^2y}{dx^2} = \left[4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3\right]^{3/2}$ کا رتبہ اور درجہ معلوم کرو۔

حل: دی گئی مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} = \left[4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3\right]^{3/2}$ ہے۔ $3/2$ قوت کو صحیح بنانے پر حاصل ہوگا۔ یعنی دونوں جانب مربع لینے پر

$$\begin{aligned} \left[4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3\right]^3 &= \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 \\ &= \left(\frac{dy}{dx}\right)^9 + 48\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 12\left(\frac{dy}{dx}\right)^6 + 64 = \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2 \end{aligned}$$

اور اس مساوات میں اعظم ترین مشتق $\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2$ ہے جس کی قوت 2 ہے اس لیے تفرقی مساوات کا درجہ 2 اور رتبہ بھی 2 ہے۔

خطی اور غیر خطی تفرقی مساواتیں (Linear and Non-Linear Differential Equation): تفرقی مساوات خطی کہلاتی ہے، اگر تابع متغیر (Dependent Variable) اور ہر ایک شامل مشتق صرف پہلے درجے کا ہو اور تابع متغیر اور مشتقات کے حاصل ضرب شامل نہ ہوں۔ وہ مساوات جو خطی نہ ہو غیر خطی تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔ مثلاً مساوات $y = x^2$ اور $\frac{dy}{dx} + y = e^x$ خطی تفرقی مساواتیں ہیں اور $\cos x + 5y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ غیر خطی ہے۔

1.2 تفرقی مساواتوں کی تشکیل (Formation of Differential Equation)

ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ایک طبعی صورت حال کو متناظر ایک تفرقی مساوات میں ظاہر کیے جاتے ہیں۔ چند مثالیں:

1۔ آبادی کا مسئلہ وقت کے اعتبار سے بڑھتا ہے یا کم کا مسئلہ (Growth Problem) جیسے جراثیم کی پیداوار تابکار عنصر کا انحطاط وغیرہ کو ہم مندرجہ ذیل تفرقی مساواتوں میں ظاہر کر سکتے ہیں۔ فرض کرو کہ $x(t)$ افزائش ہے، وقت t پر اور یہ شرح افزائش $\frac{d}{dt}(x(t))$ کے متناسب ہوتی ہے یعنی:

$$\frac{d(x(t))}{dt} \propto x(t)$$

$$\Rightarrow \frac{d(x(t))}{dt} = kx(t)$$

جہاں k تناسب کا مستقل (Constant) ہے جو اضافہ (Growth) کی صورت میں مثبت اور انحطاط کی صورت (Decay) میں منفی ہوگا۔ چنانچہ $\frac{dx}{dt} = kx$ ایک پہلے درجے اور پہلے رتبے کی تفرقی مساوات ہے۔ جہاں x ایک t کا تابع متغیر ہے۔

منحنیوں کے خاندان (Families of Curves): $y = mx + c$ خطوط مستقیم کا نظام ہے جہاں m ڈھال (Slope) ہے اور c مقطوعہ (Intercept) ہے۔

$$y = mx + c \quad \dots (1)$$

مساوات (1) کو اگر بہ لحاظ x تفرق کریں تو ہمیں $\frac{dy}{dx} = m$ حاصل ہوگا۔

$$\Rightarrow y = \frac{dy}{dx} x + c$$

$$\Rightarrow x \frac{dy}{dx} - y + c = 0$$

دیے ہوئے نظام کے خاندان کی تفرقی مساوات ہے۔

ذیل میں ہم کسی دی ہوئی منحنی خاندان کے لیے تفرقی مساوات تشکیل دینے کا قاعدہ درج کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ $F(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0$ ایک منحنی کے خاندان کو ظاہر کرتا ہے جہاں $c_1, c_2, \dots, c_n$ اختیاری مستقلات ہیں۔

$$F(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کو مرتبہ تفرق کرنے پر۔

$$F'(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \quad \dots(2)$$

$$F''(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \quad \dots(3)$$

$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots$$

$$F^{(n)}(x, y, c_1, c_2, \dots, c_n) = 0 \quad \dots(n+1)$$

چنانچہ مساوات (1), (2), (3), (4), (n + 1) حاصل ہوں گے۔ مندرجہ بالا حاصل $n + 1$ مساوات میں سے n اختیاری مستقلات کو ساقط کرنے سے n تہے والا تفرقی مساوات حاصل ہو گا۔

مثال 1۔ منحنی $y^2 = 4ax$ سے تفرقی مساوات تشکیل کرو۔

حل: دی گئی مساوات

$$y^2 = 4ax \quad \dots(1)$$

جہاں a اختیاری مستقل (Arbitrary Constant) ہے۔

دونوں جانب بہ لحاظ x تفرق کرنے پر:

$$2y \frac{dy}{dx} = 4a$$

$$\Rightarrow y \frac{dy}{dx} = 2a$$

$$\Rightarrow a = \frac{y}{2} \frac{dy}{dx} \quad \dots\dots(2)$$

(1) اور (2) سے 'a' کو ساقط کرنے سے یعنی 'a' کی قدر مساوات (1) میں درج کرنے سے $y^2 = 4 \left(\frac{y}{2} \frac{dy}{dx} \right) x$ حاصل ہوگا۔

$$y = 2x \frac{dy}{dx}$$

$$یا 0 = y - 2x \frac{dy}{dx} \text{ دیے ہوئے خاندانوں کے تفرقی مساوات کو تعبیر کرتا ہے۔}$$

مثال 2۔ منحنیوں $y = ae^{2x} + be^{-2x}$ کی تفرقی مساوات معلوم کرو۔

حل۔ دیا گیا ہے کہ

$$y = ae^{2x} + be^{-2x} \quad \dots\dots(1)$$

مساوات (1) کو دونوں جانب بہ لحاظ x دوبار تفرق کرنے پر

$$y' = 2ae^{2x} - 2be^{-2x}$$

اور

$$y'' = 4ae^{2x} + 4be^{-2x}$$

$$= 4(ae^{2x} + be^{-2x})$$

مساوات (1) کا استعمال کرنے پر

$$y'' = 4y$$

اس طرح $y'' - 4y = 0$ دی گئی مساوات کی تفرقی مساوات ہے۔

متبادل طریقہ (Alternate Method)

دی گئی مساوات

$$y = ae^{2x} + be^{-2x} \quad \dots\dots(1)$$

سے حاصل شدہ مساواتیں

$$y' = 2ae^{2x} - 2be^{-2x} \quad \dots(2)$$

اور

$$y'' = 4ae^{2x} + 4be^{-2x} \quad \dots(3)$$

مساوات (1)، (2) اور (3) سے a اور b کو ساقط کرنے سے

$$\begin{vmatrix} y & e^{2x} & e^{-2x} \\ y' & 2e^{2x} & -2e^{-2x} \\ y'' & 4e^{2x} & 4e^{-2x} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow e^{2x} \begin{vmatrix} y & 1 & e^{-2x} \\ y' & 2 & -2e^{-2x} \\ y'' & 4 & 4e^{-2x} \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow e^{2x} \cdot e^{-2x} \begin{vmatrix} y & 1 & 1 \\ y' & 2 & -2 \\ y'' & 4 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow y(8 + 8) - y'(4 - 4) + y''(-2 - 2) = 0$$

$$\Rightarrow 16y - 4y'' = 0$$

$$\Rightarrow y'' - 4y = 0$$

جو کہ دیے گئے خاندانوں کے لیے تفرقی مساوات ہے۔

مثال 3- نصف قطر a' والے دائروں $(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2$ سے متعلق تفرقی مساوات معلوم کرو۔ یہاں h اور k مستقلات ہیں جن کو ساقط کرنا ہے۔

حل: دی گئی مساوات ہے

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = a^2 \quad \dots(1)$$

دوبارہ مساوات (1) کو تفرق کرنے پر

$$2(x - h) + 2(y - k) \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow (x - h) + (y - k) \frac{dy}{dx} = 0 \quad \dots\dots(2)$$

$$\Rightarrow 1 + (y - k) \frac{d^2y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0 \quad \dots\dots(3)$$

$$\Rightarrow (y - k) = -\frac{\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)^2}{\frac{d^2y}{dx^2}}$$

مساوات (2) سے

$$(x - h) = -(y - k) \frac{dy}{dx}$$

$$= \frac{\left(1 + \frac{dy}{dx}\right)^2}{\frac{d^2y}{dx^2}} \times \frac{dy}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$\Rightarrow \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^2}{\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2} + \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^2}{\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2} = a^2$$

$$\Rightarrow \frac{\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^2}{\left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2} \left\{\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 1\right\} = a^2$$

اس طرح جو تفرقی مساوات ہمیں چاہیے وہ ہے

$$\left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right] \left[1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2\right]^2 = a^2 \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^2$$

مثال 4۔ مستقلات A اور B کو ساقط کر کے دی گئی مساوات $y = e^x (A \cos x + B \sin x)$ سے تفرقی مساوات تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے۔

$$y = e^x(A \cos x + B \sin x) \quad \dots(1)$$

چوں کہ دو مستقلاات ہیں مساوات (1) کو دوبار تفرق کریں۔

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= e^x\{A(-\sin x) + B \cos x\} + (A \cos x + B \sin x)e^x \\ \frac{dy}{dx} &= e^x(-A \sin x + B \cos x) + y \quad \dots(2) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = e^x(-A \cos x - B \sin x) + (-A \sin x + B \cos x)e^x + \frac{dy}{dx}$$

مساوات (2) سے

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= -e^x(A \cos x + B \sin x) + \left(\frac{dy}{dx} - y\right) + \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} &= -y + \frac{dy}{dx} - y + \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} &= 2 \frac{dy}{dx} - 2y \end{aligned}$$

اس طرح مساوات (1) کی تفرقی مساوات $\frac{d^2x}{dx^2} = 2 \left(\frac{dy}{dx} - y\right)$ ہے۔

مثال 5۔ منحنیوں کے خاندان $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 + \lambda}$ سے اختیاری مستقل λ کو ساقط کر کے تفرقی مساوات حاصل کرو۔

حل: دی گئی منحنیوں کا خاندان کی مساوات ہے۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 + \lambda} = 1 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر حاصل ہے

$$\begin{aligned} \frac{2x}{a^2} + \frac{2y \frac{dy}{dx}}{a^2 + \lambda} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{x}{a^2} + \frac{y \frac{dy}{dx}}{a^2 + \lambda} &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{y \left(\frac{dy}{dx} \right)}{a^2 + \lambda} = -\frac{x}{a^2}$$

دونوں جانب y سے ضرب دینے پر

$$\frac{y^2}{a^2 + \lambda} = \frac{-xy}{a^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)} \quad \dots\dots(2)$$

مساوات (2) کی قدر مساوات (1) میں درج کرنے پر

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{(-xy)}{a^2 \left(\frac{dy}{dx} \right)} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a^2} \left[x^2 \frac{dy}{dx} - xy \right] = \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow x^2 \frac{dy}{dx} - xy = a^2 \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow (x^2 - a^2) \frac{dy}{dx} - xy = 0$$

جو کہ مساوات (1) کی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 6۔ مساوات $y = ae^x + be^{2x} + ce^{3x}$ جہاں a, b, c اختیاری مستقل ہیں، کی تفرقی مساوات حاصل کرو۔

حل: دی گئی مساوات ہے

$$y = ae^x + be^{2x} + ce^{3x} \quad \dots\dots(1)$$

$$\Rightarrow y' = ae^x + b2e^{2x} + c3e^{3x}$$

$$\Rightarrow y' = [ae^x + be^{2x} + ce^{3x}] + be^{2x} + 2ce^{3x}$$

$$\Rightarrow y' = y + be^{2x} + 2ce^{3x}$$

$$y' - y = be^{2x} + 2ce^{3x} \quad \dots\dots(2)$$

$$\Rightarrow y'' - y' = 2be^{2x} + 6ce^{3x}$$

$$= 2[be^{2x} + 2ce^{3x}] + 2ce^{3x}$$

$$y'' - y' = 2(y' - y) + 2ce^{3x} \quad \dots\dots(3)$$

مساوات (2) کی مدد سے

$$y'' - 3y' + 2y = 2ce^{3x} \quad \dots(4)$$

$$\Rightarrow y''' - 3y'' + 2y' = 6ce^{3x} = 3(2ce^{3x})$$

مساوات (3) سے $2ce^{3x}$ کی قدر درج کرنے پر

$$y''' - 3y'' + 2y' = 3(y'' - 3y' + 2y)$$

$$\Rightarrow y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$$

اس طرح مساوات (1) کی تفرقی مساوات ہے۔

$$\frac{d^3y}{dx^3} - 6\frac{d^2y}{dx^2} + 11\frac{dy}{dx} - 6y = 0$$

1.4 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی میں ہم جان چکے ہیں کہ کسی تفرقی مساوات کا رتبہ اس کے اعظم ترین مشتق کا رتبہ ہوتا ہے اور کسی تفرقی مساوات کا درجہ اس میں شامل اعظم ترین مشتق کی قوت ہے۔ جب n اختیاری مستقلات والا کوئی تفاعل دیا جائے تو ہم اسے n دفعہ تفرق کرتے ہیں تاکہ n زائد مساواتیں حاصل ہوں جن میں n اختیاری مستقلات اور مستقلات شامل ہوں ان n مساواتوں سے n اختیاری مستقلات کو ساقط کر کے n رتبہ والا تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔

1.5 کلیدی الفاظ (Key Words)

اختیاری مستقل، مشتق، اعظم ترین مشتق، درجہ، رتبہ

1.6 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

1.6.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. تفرقی مساوات $(x^2 + 1)\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x^2$ کا رتبہ اور درجہ ہے

1.1 .A 1,2 .B 2,1 .C ان میں سے کوئی نہیں .D

2. مساوات $y = x \frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$ کا رتبہ..... ہے۔

2 .A 3 .B 1 .C 4 .D

3. تفرقی مساوات جس کا رتبہ 2 اور درجہ 3 ہو اس کے حل میں کتنے اختیاری مستقلات ہوں گے؟

2 .A 1 .B 3 .C 4 .D

4. تفرقی مساوات جس کا حل $y = A \cos\left(\frac{n}{x} + \alpha\right)$ ہے..... ہوگی، یہاں α اور A اختیاری مستقلات ہیں۔

$x^3 y'' + n^2 y = 0$.A $x^4 y'' + n^2 y = 0$.B

$x^4 y'' - n^2 y = 0$.C ان میں سے کوئی نہیں .D

5. دائروں کے خاندان جن کے مراکز (0,0) پر ہیں کی تفرقی مساوات ہے

$x - yy' = 0$.A $y + xy' = 0$.B

$x + yy' = 0$.C ان میں سے کوئی نہیں .D

1.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

ذیل کے مساواتوں سے اختیاری مستقلات کو ساقط کرتے ہوئے تفرقی مساواتیں حاصل کرو:

1. $x^2 + y^2 - 2cy - c^2 = 0$

2. $y = ae^{bx}$

3. $y = ax + bx^2$

4. $y = a_1 x^2 + a_2 e^{-x}$

5. $y = a \sin(mx + b)$

6. $x^2 + y^2 + 2ax + 2by + c = 0$

1.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. خطوط کے خاندان $y = mx + \frac{a}{m}$ جہاں m پیرامیٹر ہے، کی تفرقی مساوات معلوم کرو۔

2. ثابت کرو $Ax^2 + By^2 = 1$ ، جہاں A اور B اختیاری مستقلات ہیں، کی تفرقی مساوات $x[yy'' + (y')^2] = yy'$ ہوگی۔

جوابات:

1.6.1 معروضی سوالات کے جوابات

1. A
2. C
3. A
4. B
5. C

1.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

1. $(x^2 - 2y^2) \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 4xy \frac{dy}{dx} - x^2 = 0$
2. $yy_2 - y_1^2 = 0$
3. $x^2y_2 - 2xy_1 + 2y = 0$
4. $(x^2 + 2x) \frac{d^2y}{dx^2} + (x^2 - 2) \frac{dy}{dx} - 2(x + 1)y = 0$
5. $\frac{d^2y}{dx^2} + m^2y = 0$
6. $y_3[1 + y_1^2] = 3y_1(y_2)^2$

1.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$x \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - y \frac{dy}{dx} + a = 0 \quad 1.$$

1.7 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhania, S. Chand & Co., New Delhi
3. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume –I, V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company

اکائی 2۔ پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساواتیں

(Differential Equations of First Order and First Degree)

اکائی کے اجزا

تمہید	2.0
مقاصد	2.1
متغیر جدا پذیر کا طریقہ	2.2
متجانس تفرقی مساواتیں	2.3
غیر متجانس مساواتیں جو متجانس مساواتوں میں تحویل پذیر ہوں	2.3.1
اکتسابی نتائج	2.4
کلیدی الفاظ	2.5
نمونہ امتحانی سوالات	2.6
معروضی جوابات کے حامل سوالات	2.6.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	2.6.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	2.6.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	2.7

2.0 تمہید (Introduction)

پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساواتوں کی عام شکل ہے۔

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \quad \text{.....(1)}$$

جس میں سے ہم y کے لیے حل کرتے ہیں۔ اس اکائی میں ہم مساوات (1) کے حل کے تین طریقے سیکھیں گے۔

1. متغیر جدا پذیر (Variable Separable) کا طریقہ

2. متجانس تفرقی مساواتیں (Homogeneous differential Equations)

3. غیر متجانس تحویل پذیر مساواتیں (Non-Homogeneous differential equations reducible to homogeneous equations)

2.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے کے بعد آپ مختلف قسم کی پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساواتوں سے واقف ہو جائیں گے جن کے حل کے تین طریقوں سے (متغیر جد اپزیر، متجانس تفرقی مساواتیں اور غیر متجانس تحویل پذیر مساوات) سے آگاہ ہو کر ان کا استعمال کر سکیں گے۔

2.2 متغیر جد اپزیر کا طریقہ (Method of Variables Separable)

اگر تفرقی مساوات (Differential Equation) $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ کو $\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)}$ یا $\frac{dy}{dx} = f(x) \cdot g(y)$ سے ظاہر کر سکیں جہاں $f(x)$ اور $g(y)$ مسلسل تفاعلات (Continuous Functions) ہوں، تو یہ طریقہ متغیر جد اپزیر (Variables Separable) کہلاتا ہے۔

طریقہ: دی گئی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ کو $\frac{dy}{dx} = \frac{f(x)}{g(y)}$ میں بدل لیں۔

پھر $f(x)dx = g(y)dy$ اور دونوں جانب تکمیل کر کے ہم مساوات کا حل درجہ ذیل شکل میں حاصل کر لیتے ہیں

$$\int f(x)dx = \int g(y)dy + C$$

جہاں C تکمیلی مستقل ہے۔

مثال 1- مساوات $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$ کا حل حاصل کرو۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$$

متغیر جد اپزیر کرنے پر

$$\frac{dy}{1+y^2} = \frac{dx}{1+x^2}$$

دونوں جانب تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\int \frac{dy}{1+y^2} = \int \frac{dx}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} y = \tan^{-1} x + C$$

مستقل C کو $\tan^{-1} C$ لینے پر

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = \tan^{-1} C$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \left(\frac{y-x}{1+yx} \right) = \tan^{-1} C$$

$$\Rightarrow y - x = C(1 + yx)$$

اس طرح $y - x = C(1 + yx)$ دی گئی مساوات کا حل ہوگا۔

$$\text{مثال 2۔ حل کرو: } \frac{dy}{dx} + \sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}} = 0$$

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + \sqrt{\frac{1-y^2}{1-x^2}} = 0$$

متغیر جد اپزیر کرنے پر

$$\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} + \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = 0$$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} + \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = C$$

$$\Rightarrow \sin^{-1} y + \sin^{-1} x = C$$

اس طرح $\sin^{-1} y + \sin^{-1} x = C$ دی گئی مساوات کا حل ہوگا۔

مثال 3- مساوات $\frac{dy}{dx} = \frac{x(2 \log x + 1)}{\sin y + y \cos y}$ کا حل حاصل کرو۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x(2 \log x + 1)}{\sin y + y \cos y}$$

متغیر جدا پزیر کرنے پر

$$(\sin y + y \cos y) dy = x(2 \log x + 1) dx$$

دونوں جانب تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\int (\sin y + y \cos y) dy = \int (2x \log x + x) dx$$

$$\Rightarrow \int \sin y dy + \int y \cos y dy = 2 \int x \log x dx + \int x dx$$

$$\Rightarrow -\cos y + y \sin y - \int \sin y dy = 2 \left[\log x \cdot \frac{x^2}{2} - \int \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} \right) dx \right] + \frac{x^2}{2} + C$$

$$\Rightarrow -\cos y + y \sin y + \cos y = 2 \left[\frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \int x dx \right] + \frac{x^2}{2} + C$$

$$\Rightarrow y \sin y = 2 \left[\frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right) \right] + \frac{x^2}{2} + C$$

$$\Rightarrow y \sin y = x^2 \log x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} + C$$

$$\Rightarrow y \sin y = x^2 \log x + C$$

اس طرح $y \sin y = x^2 \log x + C$ دی گئی مساوات کا حل ہوگا۔

مثال 4- حل کرو: $\frac{dy}{dx} = (4x + y + 1)^2$

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} = (4x + y + 1)^2$$

فرض کرو کہ $z = 4x + y + 1$ ہے۔ اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = z^2 \quad \dots\dots(1)$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = 4 + \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx} - 4$$

مساوات (1) سے

$$\frac{dz}{dx} - 4 = z^2$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = z^2 + 4$$

متغیر جدا کرنے پر

$$\frac{dz}{z^2 + 4} = dx$$

دونوں جانب تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\int \frac{dz}{z^2 + 4} = \int dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{z}{2} = x + \frac{C}{2}$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \frac{z}{2} = 2x + C$$

اس طرح $\tan^{-1} \left(\frac{4x+y+1}{2} \right) = 2x + C$ یا $(4x + y + 1) = 2 \tan^{-1}(2x + C)$ دی گئی مساوات کا حل ہوگا۔

مثال 5۔ تفرقی مساوات $(xy^2 + x)dx + (yx^2 + y)dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$(xy^2 + x)dx + (yx^2 + y)dy = 0$$

$$\Rightarrow x(y^2 + 1)dx + y(x^2 + 1)dy = 0 \quad \dots\dots(1)$$

متغیر جدا کرنے پر حاصل ہوگا

$$\frac{xdx}{x^2 + 1} + \frac{ydy}{y^2 + 1} = 0$$

دونوں جانب تکمیل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\int \frac{xdx}{x^2 + 1} + \int \frac{ydy}{y^2 + 1} = C$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \int \frac{2xdx}{x^2 + 1} + \frac{1}{2} \int \frac{2ydy}{y^2 + 1} = C$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \log(x^2 + 1) + \frac{1}{2} \log(y^2 + 1) = C$$

$$\Rightarrow \log\{(x^2 + 1)(y^2 + 1)\} = 2C = \log k \quad (\text{فرض کرو})$$

$$\Rightarrow (x^2 + 1)(y^2 + 1) = k$$

اس طرح $(x^2 + 1)(y^2 + 1) = k$ دی گئی تفرقی مساوات کا حل ہے۔

مثال 6- تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = e^{x-y} + x^2 e^{-y}$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} = e^{x-y} + x^2 e^{-y} \quad \dots\dots(1)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = (e^x + x^2)e^{-y}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{e^{-y}} = (e^x + x^2)dx$$

$$\Rightarrow e^y dy = (e^x + x^2)dx$$

دونوں جانب تکمیل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\int e^y dy = \int (e^x + x^2) dx$$

$$\Rightarrow e^y = e^x + \frac{x^3}{3} + C$$

اس طرح $e^y = e^x + \frac{x^3}{3} + C$ دی گئی مساوات کا حل ہو گا۔

2.3 متجانس تفرقی مساواتیں (Homogeneous Differential Equations)

تعریف: ایک تفاعل $f(x, y)$ درجہ n کا متجانس تفاعل کہلاتا ہے اگر کسی بھی λ کے لیے $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^n f(x, y)$ ہو۔ مثلاً $f(x, y) = y^2 + xy$ دو درجہ والا متجانس تفاعل ہے اس لیے کہ

$$\begin{aligned} f(\lambda x, \lambda y) &= (\lambda y)^2 + (\lambda x)(\lambda y) \\ &= \lambda^2 y^2 + \lambda^2 xy \\ &= \lambda^2 (y^2 + xy) \\ &= \lambda^2 f(x, y) \end{aligned}$$

اسی طرح $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{xy}$ درجہ صفر والا متجانس تفاعل ہے چوں کہ

$$\begin{aligned} f(\lambda x, \lambda y) &= \frac{(\lambda x)^2 + (\lambda y)^2}{(\lambda x)(\lambda y)} \\ &= \frac{\lambda^2 x^2 + \lambda^2 y^2}{\lambda^2 xy} \\ &= \lambda^0 \left(\frac{x^2 + y^2}{xy} \right) \\ &= \lambda^0 f(x, y) \end{aligned}$$

متجانس تفرقی مساواتیں (Homogeneous Differential Equations): تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ متجانس تفرقی مساوات کہلاتی ہے

اگر $f(x, y)$ صفر درجہ کا متجانس تفاعل ہو۔ مثلاً $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 - y^2}{xy}$

متجانس تفرقی مساوات کے حل کا طریقہ:

دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad \dots\dots\dots(1)$$

اگر $f(x, y)$ صفر درجہ والا متجانس تفاعل ہو، تب فرض کرو $y = vx$ اور $\frac{dy}{dx} = \phi\left(\frac{y}{x}\right)$ اس سے ہمیں $\frac{dy}{dx} = \phi(v) = v + x \frac{dv}{dx}$ حاصل ہو گا۔ تب،

$$x \frac{dv}{dx} = \phi(v) - v$$

متغیر جدا کرنے پر

$$\frac{dv}{\phi(v) - v} = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dv}{\phi(v) - v} + C = \int \frac{dx}{x}$$

متجانس مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ کا حل ہو گا۔

نوٹ: اگر متجانس مساوات $\frac{dx}{dy} = \psi\left(\frac{x}{y}\right)$ کے شکل کی ہو تب $x = vy$ لے کر اس تفرقی مساوات کا حل معلوم کریں۔

مثال 1۔ حل کرو: $x^2 y dx - (x^3 + y^3) dy = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x^2 y dx - (x^3 + y^3) dy = 0$$

$$x^2 y dx = (x^3 + y^3) dy$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3} \quad \dots\dots\dots(1)$$

چوں کہ $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}$ اور

$$f(kx, ky) = \frac{(kx)^2 (ky)}{(kx)^3 + (ky)^3}$$

$$= \frac{k^3(x^2y)}{k^3(x^3 + y^3)}$$

$$= \frac{x^2y}{x^3 + y^3}$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات متجانس ہے اور اس کا حل معلوم کرنے کے لیے فرض کرو $y = vx$ درج کرنا ہوگا اور اس سے ہمیں حاصل

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{x^2(vx)}{x^3 + (vx)^3}$$

$$= \frac{x^3(v)}{x^3(1 + v^3)} = \frac{v}{1 + v^3}$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{v}{1 + v^3} - v = \frac{-v^4}{1 + v^3}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + v^3}{v^4} dv = -\frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow v^{-4} dv + \frac{1}{v} dv = -\frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int v^{-4} dv + \int \frac{1}{v} dv = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{v^{-3}}{-3} + \log v = -\log x + C$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{3v^3} + \log v + \log x = C$$

$$v = \frac{y}{x} \text{ درج کرنے پر}$$

$$-\frac{1}{3\left(\frac{y}{x}\right)^3} + \log\left(\frac{y}{x}\right) + \log x = C$$

$$\Rightarrow -\frac{x^3}{3y^3} + \log y - \log x + \log x = C$$

$$\Rightarrow \log y - \frac{x^3}{3y^3} = C$$

جو کہ مساوات (1) کا حل ہے۔

مثال 2- $x \frac{dy}{dx} = y + x e^{\frac{y}{x}}$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x \frac{dy}{dx} = y + x e^{\frac{y}{x}} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y + x e^{\frac{y}{x}}}{x} = f(x, y)$$

$$\Rightarrow f(kx, ky) = \frac{ky + kx e^{\frac{ky}{kx}}}{kx}$$

$$= f(x, y)$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات متجانس ہے اور اس کا حل معلوم کرنے کے لیے فرض کرو $y = vx$ درج کرنے پر اور اس سے ہمیں حاصل

$$\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{vx + x e^{\frac{vx}{x}}}{x}$$

$$\Rightarrow v + x \frac{dv}{dx} = \frac{x(v + e^v)}{x} = v + e^v$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = e^v$$

متغیر جدا کرنے پر

$$e^{-v} dv = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int e^{-v} dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{e^{-v}}{-1} = \log x + \log C$$

$$\Rightarrow e^{-v} = -\log Cx = \log\left(\frac{1}{Cx}\right)$$

$v = \frac{y}{x}$ درج کرنے پر

$$e^{\left(-\frac{y}{x}\right)} = \log\left(\frac{1}{Cx}\right)$$

جو کہ مساوات (1) کا حل ہے۔

مثال 3۔ مساوات $(x + y)dy = (x - y)dx$ کو حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x + y)dy = (x - y)dx$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+y} = f(x, y) \quad \dots\dots\dots(1)$$

جو ایک متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب فرض کرو $y = vx$ جس سے ہمیں حاصل ہوگا $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$

اب مساوات (1) سے

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{x - vx}{x + vx}$$

$$= \frac{x(1 - v)}{x(1 + v)} = \frac{1 - v}{1 + v}$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1 - v}{1 + v} - v = \frac{1 - v - v - v^2}{1 + v}$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1 - 2v - v^2}{1 + v}$$

$$\Rightarrow \frac{1 + v}{1 - 2v - v^2} dv = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{-2} \left(\frac{-2 - 2v}{1 - 2v - v^2} \right) dv = \frac{dx}{x}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad & \frac{1}{-2} \int \left(\frac{-2-2v}{1-2v-v^2} \right) dv = \int \frac{dx}{x} \\
\Rightarrow \quad & \frac{1}{-2} \log(1-2v-v^2) = \log x + \log C \\
\Rightarrow \quad & \log(1-2v-v^2) = -2 \log Cx \\
\Rightarrow \quad & \log(1-2v-v^2) = \log \frac{1}{(Cx)^2} \\
\Rightarrow \quad & 1-2v-v^2 = \frac{1}{(Cx)^2}
\end{aligned}$$

$v = \frac{y}{x}$ درج کرنے پر

$$\begin{aligned}
& 1 - 2\left(\frac{y}{x}\right) - \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \frac{1}{(Cx)^2} \\
\Rightarrow \quad & x^2 - 2xy - y^2 = \frac{1}{C^2} = k
\end{aligned}$$

اس طرح مساوات (1) کا حل $x^2 - 2xy - y^2 = k$ ہو گا۔

مثال 4۔ مساوات $(x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\begin{aligned}
& (x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0 \\
\Rightarrow \quad & (x^2 + y^2)dx = 2xydy \\
\Rightarrow \quad & \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{2xy} \quad \dots\dots\dots (1)
\end{aligned}$$

یہ ایک متجانس تفرقی مساوات ہے۔ فرض کرو $y = vx$ جس سے ہمیں حاصل ہو گا $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$

مساوات (1) سے

$$\begin{aligned}
v + x \frac{dv}{dx} &= \frac{x^2 + (vx)^2}{2x(vx)} \\
&= \frac{x^2(1 + v^2)}{2x^2v} = \frac{1 + v^2}{2v}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{1+v^2}{2v} - v = \frac{1-v^2}{2v}$$

$$\Rightarrow \frac{2v}{1-v^2} dv = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{-2v}{1-v^2} dv = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \log(1-v^2) = -\log x + \log C$$

$$\Rightarrow \log(1-v^2) = \log \frac{C}{x}$$

$$\Rightarrow 1-v^2 = \frac{C}{x}$$

$v = \frac{y}{x}$ درج کرنے پر

$$1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2 = \frac{C}{x}$$

$$\Rightarrow x^2 - y^2 = Cx$$

اس طرح مساوات (1) کا حل $x^2 - y^2 = Cx$ ہو گا۔

مثال 5۔ مساوات $(x^3 - 2y^3)dx + 3xy^2dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x^3 - 2y^3)dx + 3xy^2dy = 0$$

$$\Rightarrow (x^3 - 2y^3)dx = -3xy^2dy$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x^3 - 2y^3}{3xy^2} \quad \dots\dots\dots (1)$$

یہ ایک متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب مان لو کہ $y = vx$ جس سے ہمیں حاصل ہو گا $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$

اب مساوات (1) سے

$$v + x \frac{dv}{dx} = -\frac{x^3 - 2(vx)^3}{3x(vx)^2}$$

$$= -\frac{x^3(1-2v^3)}{3x^3v^2} = -\left(\frac{1-2v^3}{3v^2}\right)$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{2v^3-1}{3v^2} - v = \frac{2v^3-1-3v^3}{3v^2}$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \frac{-1-v^3}{3v^2}$$

$$\Rightarrow \frac{3v^2}{1+v^3} dv = -\frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{3v^2}{1+v^3} dv = -\int \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \log(1+v^3) = -\log x + \log C$$

$$\Rightarrow \log(1+v^3) = \log \frac{C}{x}$$

$$\Rightarrow 1+v^3 = \frac{C}{x}$$

$v = \frac{y}{x}$ درج کرنے پر

$$1 + \left(\frac{y}{x}\right)^3 = \frac{C}{x}$$

$$\Rightarrow x^3 + y^3 = Cx^2$$

اس طرح مساوات (1) کا حل $x^3 + y^3 = Cx^2$ ہو گا۔

مثال 6۔ مساوات $(x^2 + xy + y^2)dx = x^2 dy$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x^2 + xy + y^2)dx = x^2 dy$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2} \quad \dots\dots\dots(1)$$

یہ ایک متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب مان لو کہ $y = vx$ جس سے ہمیں حاصل ہو گا $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$

اب مساوات (1) سے

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{x^2 + x(vx) + (vx)^2}{x^2}$$

$$= \frac{x^2(1 + v + v^2)}{x^2} = 1 + v + v^2$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = 1 + v + v^2 - v = 1 + v^2$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{1 + v^2} = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \int \frac{dv}{1 + v^2} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} v = \log x + \log C = \log Cx$$

$$v = \frac{y}{x} \text{ درج کرنے پر}$$

$$\tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \log Cx$$

اس طرح مساوات (1) کا حل $\tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = \log Cx$ ہو گا۔

2.3.1 غیر متجانس مساواتیں جو متجانس مساواتوں میں تحویل پذیر ہوں

(Non-Homogeneous Differential Equations Reducible to Homogeneous Equations)

اگر مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ ذیل شکل

$$(a_2x + b_2y + c_2) \frac{dy}{dx} = (a_1x + b_1y + c_1) \quad \dots\dots\dots(1)$$

میں ہو، جہاں a_1, b_1, c_1 اور a_2, b_2, c_2 مستقلات ہیں، جب کہ $a_2x + b_2y + c_2 \neq 0$ متجانس ہے اگر مساوات میں تحویل پذیر

ہے اگر $c_1 = c_2 = 0$

مساوات (1) کو ہم درجہ ذیل شکل میں ظاہر کر سکتے ہیں

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2} \quad \dots\dots\dots(2)$$

فرض کرو کہ h, k دو مستقلات اس طرح وجود رکھتے ہیں کہ $y = Y + k$ اور $x = X + h$

$$a_1h + b_1k + c_1 = 0$$

$$a_2h + b_2k + c_2 = 0$$

تب $dx = dX$ اور $dy = dY$ ہیں۔

⇒

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dX}$$

اور مساوات (2) ہوگی

$$\frac{dY}{dX} = \frac{a_1(X+h) + b_1(Y+k) + c_1}{a_2(X+h) + b_2(Y+k) + c_2}$$

چوں کہ $a_1h + b_1k + c_1 = a_2h + b_2k + c_2 = 0$ اس لیے

$$\frac{dY}{dX} = \frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y} \quad \dots\dots\dots(3)$$

اور مساوات (3) متجانس ہے جس کا ہم حل معلوم کر سکتے ہیں۔ آخر میں X اور Y کی قدر درج کرنے پر ہمیں مساوات (1) کا حل حاصل ہو گا۔

مثال 1۔ مساوات $(2x + y - 3) \frac{dy}{dx} = x + 2y - 3$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(2x + y - 3) \frac{dy}{dx} = x + 2y - 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+2y-3}{2x+y-3} \quad \dots\dots\dots(1)$$

مساوات (1) ایک غیر متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب فرض کرو کہ $x = X + h$ ، $y = Y + k$ جہاں h, k دو مستقلات اس طرح

وجود رکھتے ہیں کہ

$$h + 2k - 3 = 0 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$2h + k - 3 = 0 \quad \dots\dots\dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) کو حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $h = 1, k = 1$

اگر ہم $y = Y + 1, x = X + 1$ لیتے ہیں تب مساوات (1)

$$\frac{dY}{dX} = \frac{X+2Y}{2X+Y} \quad \dots\dots\dots(4)$$

میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

یہ ایک متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب اگر $Y = VX$ ہو، تب $\frac{dY}{dX} = V + X \frac{dV}{dX}$

اب مساوات (4) سے

$$V + X \frac{dV}{dX} = \frac{X + 2VX}{2X + VX}$$

$$= \frac{X(1 + 2V)}{X(2 + V)} = \frac{1 + 2V}{2 + V}$$

$$\Rightarrow X \frac{dV}{dX} = \frac{1 + 2V}{2 + V} - V = \frac{1 - V^2}{2 + V}$$

$$\Rightarrow \frac{2 + V}{1 - V^2} dV = \frac{dX}{X}$$

$$\Rightarrow \int \frac{2 + V}{1 - V^2} dV = \int \frac{dX}{X}$$

$$\Rightarrow \int \frac{2}{1 - V^2} dV + \frac{1}{-2} \int \frac{-2V}{1 - V^2} dV = \int \frac{dX}{X}$$

$$\Rightarrow 2 \times \frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + V}{1 - V} \right) - \frac{1}{2} \log(1 - V^2) = \log X + \log C$$

$$\Rightarrow 2 \log \left(\frac{1 + V}{1 - V} \right) - \log(1 - V^2) = 2 \log CX$$

$$\Rightarrow \log \left\{ \frac{(1 + V)^2}{(1 - V)^2} \times \frac{1}{(1 - V^2)} \right\} = \log(CX)^2$$

$$\Rightarrow \frac{1 + V}{(1 - V)^3} = (CX)^2$$

اب $V = \frac{Y}{X}$ درج کرنے پر

$$\frac{1 + \frac{Y}{X}}{\left(1 - \frac{Y}{X}\right)^3} = (CX)^2$$

$$\Rightarrow \frac{X + Y}{(X - Y)^3} \cdot X^2 = (CX)^2$$

$$\Rightarrow \frac{X + Y}{(X - Y)^3} = C^2 = k$$

اب ہم $Y = y - 1, X = x - 1$ درج کرتے ہیں

$$\Rightarrow \frac{x - 1 + y - 1}{(x - 1 - y + 1)^3} = k$$

$$\Rightarrow \frac{x+y-2}{(x-y)^3} = k$$

اس طرح مساوات (1) کا حل $x+y-2 = k(x-y)^3$ ہو گا۔

مثال 2۔ مساوات $(4x+3y+1)dx + (3x+2y+1)dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(4x+3y+1)dx + (3x+2y+1)dy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{4x+3y+1}{3x+2y+1} \quad \dots\dots\dots(1)$$

یہ مساوات غیر متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب فرض کرو کہ $x = X + h$ ، $y = Y + k$ جہاں h, k دو ایسے اعداد ہیں کہ

$$4h + 3k + 1 = 0 \quad \dots\dots\dots(2)$$

$$3h + 2k + 1 = 0 \quad \dots\dots\dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) کو حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $k = 1, h = -1$

اگر ہم $y = Y + 1, x = X - 1$ لیتے ہیں تب مساوات (1)

$$\frac{dY}{dX} = -\frac{4X+3Y}{3X+2Y} \quad \dots\dots\dots(4)$$

میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اب فرض کرو کہ $Y = VX$ ہے، تب $\frac{dY}{dX} = V + X \frac{dV}{dX}$

اب مساوات (4) سے

$$\begin{aligned} V + X \frac{dV}{dX} &= -\frac{4X+3VX}{3X+2VX} \\ &= -\frac{X(4+3V)}{X(3+2V)} = -\frac{4+3V}{3+2V} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X \frac{dV}{dX} = -\frac{4+3V}{3+2V} - V = -\frac{4+6V+2V^2}{3+2V}$$

$$\Rightarrow \frac{3+2V}{-2(2+3V+V^2)} dV = \frac{dX}{X}$$

$$\Rightarrow \frac{3+2V}{(2+3V+V^2)} dV = \frac{-2}{X} dX$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \int \frac{3+2V}{(2+3V+V^2)} dV &= -2 \int \frac{dX}{X} \\
\Rightarrow \log(2+3V+V^2) &= -2 \log X + \log C \\
\Rightarrow \log(2+3V+V^2) + \log X^2 &= \log C \\
\Rightarrow \log(2+3V+V^2)X^2 &= \log C \\
\Rightarrow (2+3V+V^2)X^2 &= C
\end{aligned}$$

$$V = \frac{Y}{X} \text{ درج کرنے پر}$$

$$\begin{aligned}
&\left(2 + \frac{3Y}{X} + \frac{Y^2}{X^2}\right)X^2 = C \\
\Rightarrow 2X^2 + 3XY + Y^2 &= C
\end{aligned}$$

$$\text{اب ہم } Y = y - 1, X = x + 1 \text{ درج کرتے ہیں}$$

$$\Rightarrow 2(x+1)^2 + 3(x+1)(y-1) + (y-1)^2 = C$$

$$\text{اس طرح مساوات (1) کا حل } 2(x+1)^2 + 3(x+1)(y-1) + (y-1)^2 = C \text{ ہو گا۔}$$

$$\text{مثال 3۔ مساوات } (x+2y-1)dx - (2x+4y+2)dy = 0 \text{ کا حل معلوم کرو۔}$$

$$\text{حل۔ دی گئی مساوات ہے}$$

$$(x+2y-1)dx - (2x+4y+2)dy = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+2y-1}{2(x+2y)+2} \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{اب فرض کرو کہ } v = x + 2y \text{ ہے، تب}$$

$$\frac{dv}{dx} = 1 + 2 \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left(\frac{dv}{dx} - 1 \right)$$

$$\text{اب مساوات (1) سے}$$

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dv}{dx} - 1 \right) = \frac{v-1}{2v+2}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} - 1 = \frac{v-1}{v+1}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} = \frac{v-1}{v+1} + 1 = \frac{2v}{v+1}$$

$$\Rightarrow \frac{v+1}{2v} dv = dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{v} \right) dv = dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \int \left(1 + \frac{1}{v} \right) dv = \int dx$$

$$\Rightarrow v + \log v = 2x + C$$

اس طرح مساوات $V = x + 2y$ درج کرنے پر

$$x + 2y + \log(x + 2y) = 2x + C$$

$$\Rightarrow \log(x + 2y) + (2y - x) = C$$

اس طرح مساوات (1) کا حل $\log(x + 2y) + (2y - x) = C$ ہو گا۔

2.4 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر مساوات $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ ذیل شکل $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ میں ہو تو ہم اس کا حل متغیر جدا پزیر کے طریقہ سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر x, y میں کوئی تفاعل $f(x, y)$ متجانس ہو تب ہم $y = vx$ کی مدد سے دی گئی تفرقی مساوات کو متغیر پزیر بنا کر حل کرتے ہیں اور غیر متجانس مساواتوں کو متجانس بنا کر ان کا حل حاصل کر لیتے ہیں۔

2.5 کلیدی الفاظ (Key Words)

متجانس تفاعل، متجانس تفرقی مساوات، غیر متجانس تفرقی مساوات، مستقلات، متغیر جدا پزیر

2.6 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

2.6.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. تفرقی مساوات $y \frac{dy}{dx} = x e^{x^2+y^2}$ کا حل ہے

A. $e^{x^2} + e^{y^2} = C$ B. $e^{-x^2} + e^{y^2} = C$

C. $e^{x^2} + e^{-y^2} = C$ D. ان میں سے کوئی نہیں

2. تفرقی مساوات $\log \frac{dy}{dx} = ax + b$ کا حل ہے۔

3. مساوات $\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{2x}$ کا حل ہے

A. $x = C(x - y)^2$ B. $(x - y)x = C$

C. $y = C(x - y)^2$ D. ان میں سے کوئی نہیں

2.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

1. متغیر جدا پزیر طریقہ سے مساوات $y^2 \cos \sqrt{x} dx - 2\sqrt{x} e^{\frac{1}{y}} dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

2. درجہ ذیل مساواتوں کو حل کرو:

(i) $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx}$

(ii) $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan\left(\frac{y}{x}\right)$

(iii) $(x^2 - 3xy)dy = (xy - 2y^2)dx$

3. ذیل کی تفرقی مساواتوں کو حل کریے:

(i) $(e^y + 1) \cos x dx + e^y \sin x dy = 0$

(ii) $(x + y)^2 \frac{dy}{dx} = a^2$

(iii) $dy = \tan^2(x + y)dx$

(iv) $\frac{dy}{dx} = \cos(x + y) + \sin(x + y)$

(v) $\frac{dy}{dx} = e^{x+y} + x^2 e^{x^3+y}$

(vi) $(e^x + 1)ydy + (y + 1)dx = 0$

$$\frac{dy}{dx} = xy + x + y + 1 \quad (\text{vii})$$

2.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. حل کرو:

$$(x - y - 2)dx + (x - 2y - 3)dy = 0 \quad (\text{i})$$

$$(x + 2y + 3)dx - (3x + 2y + 1)dy = 0 \quad (\text{ii})$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+1}{2x+2y+3} \quad (\text{iii})$$

جوابات:

2.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات

$$\sin \sqrt{x} + e^{\frac{1}{y}} = C \quad .1$$

$$\left(\frac{y}{x}\right) - \log\left(\frac{y}{x}\right) = \log x + C \quad (i) \quad .2$$

$$\sin\left(\frac{y}{x}\right) = Cx \quad (ii)$$

$$x^2 = Cy^3 e^{\frac{x}{y}} \quad (iii)$$

.3

$$(e^y + 1) \sin x = C \quad (\text{i})$$

$$y = a \tan^{-1} \frac{(x+y)}{a} + C \quad (\text{ii})$$

$$\sin(2x + 2y) = 2x - 2y + C \quad (\text{iii})$$

$$\log\left\{1 + \tan \frac{(x+y)}{2}\right\} = x + C \quad (\text{iv})$$

$$e^x + e^{-y} + \frac{x^3}{3} = C \quad (\text{v})$$

$$y - \log(1 + e^{-x}) - \log(y + 1) = C \quad (\text{vi})$$

$$C(y + 1) = e^{\left(\frac{x^2}{2} + x\right)} \quad (\text{vii})$$

2.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات

$$x^2 - 2y^2 - 2x4y - 2 = C \left(\frac{x-y\sqrt{2}-\sqrt{2}-1}{x+y\sqrt{2}+\sqrt{2}-1}\right)^{1/\sqrt{2}} \quad (\text{i})$$

$$(2y - x + 5)^4 = C^3(x + y + 1) \quad (\text{ii})$$

$$x + y + \frac{4}{3} = Ce^{3(x-2y)} \text{ (iii)}$$

2.7 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhanian, S.Chand & Co., New Delhi
3. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume –I , V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company

اکائی 3۔ ٹھیک تفرقی مساواتیں

(Exact Differential Equations)

اکائی کے اجزا

تمہید	3.0
مقاصد	3.1
ٹھیک تفرقی مساواتیں	3.2
ٹھیک تفرقی مساواتوں کے لیے ضروری اور کافی شرائط	3.2.1
مستعمل اجزاء ضربی	3.2.2
اکتسابی نتائج	3.3
کلیدی الفاظ	3.4
نمونہ امتحانی سوالات	3.5
معروضی جوابات کے حامل سوالات	3.5.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	3.5.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	3.5.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	3.6

3.0 تمہید (Introduction)

ذیل کی مساواتوں کو غور سے دیکھیے:

$$xdy + ydx = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = 0 \quad \dots\dots\dots(2)$$

مساوات (1) کا حل ہے

$$xy = c \quad \dots\dots\dots(3)$$

اور مساوات (2) کا حل ہے

$$\frac{x}{y} = c \quad \dots\dots\dots(4)$$

مساوات (3) کے سیدھے تفرق سے تفرقی مساوات (1) حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ

$$d(xy) = d(c)$$

⇒

$$xdy + ydx = 0$$

اور $d\left(\frac{x}{y}\right) = d(c)$ سے $\frac{ydx - xdy}{y^2} = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ ایسی مساواتیں جو کسی تعامل $f(x, y) = c$ کے سیدھے تفرق سے

حاصل ہوتی ہیں ٹھیک تفرقی مساواتیں (Exact Differential Equations) کہلاتی ہیں۔

3.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ

1. ٹھیک تفرقی مساوات کا حل حاصل کر سکیں۔

2. منکمل جزو ضربی (Integrating Factor) معلوم کر کے غیر ٹھیک مساوات کو ٹھیک مساوات میں تبدیل کر کے اس کا حل معلوم کرنے کا طریقہ سیکھ سکیں۔

3.2 ٹھیک تفرقی مساواتیں (Exact Differential Equations)

تعریف: اگر x, y کے دو تغايلات M اور N ہوں تو مساوات $Mdx + Ndy = 0$ ٹھیک مساوات یا ٹھیک تفرقی مساوات کہلاتی ہے اگر ایک ایسا تعامل $f(x, y)$ وجود رکھتا ہو کہ

$$d[f(x, y)] = Mdx + Ndy$$

مثلاً مساوات $y^2 dx + 2xy dy = 0$ ٹھیک مساوات ہے اس لیے کہ $d(xy^2) = y^2 dx + 2xy dy$ ۔ عملاً $f(x, y)$ کو اس قدر معلوم کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔

3.2.1 ٹھیک تفرقی مساواتوں کے لیے ضروری اور کافی شرائط (Necessary and Sufficient Condition for Exact Equations)

پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساوات $Mdx + Ndy = 0$ کے ٹھیک ہونے کی ضروری اور کافی شرط یہ ہے کہ $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ہو۔

ثبوت:

ضروری شرط: فرض کرو کہ مساوات

$$Mdx + Ndy = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

ٹھیک مساوات ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \dots\dots\dots(2)$$

ہو گا۔ ٹھیک تفرقی مساوات کی تعریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایسا تفاعل $f(x, y)$ وجود رکھتا ہو کہ

$$d[f(x, y)] = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = Mdx + Ndy \quad \dots\dots\dots(3)$$

جہاں

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M \quad \dots\dots\dots(4)$$

اور

$$\frac{\partial f}{\partial y} = N \quad \dots\dots\dots(5)$$

مساوات (4) کو بہ لحاظ y تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

اور مساوات (5) کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہو گا

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

چوں کہ $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ ہوتا ہے، اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے تفرقی مساوات $Mdx + Ndy = 0$ کے ٹھیک ہونے کی ضروری شرط یہ ہے کہ $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ہو۔

کافی شرط: فرض کرو کہ شرط $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ صحیح ہے۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ تفرقی مساوات $Mdx + Ndy = 0$ ٹھیک ہے۔ اس کے

لیے ہمیں ایک ایسا تفاعل $f(x, y)$ تلاش کرنا ہے کہ $d[f(x, y)] = Mdx + Ndy$ ہو۔

فرض کرو کہ $U = \int Mdx$ جس میں دورانِ مکمل مستقل مانا گیا ہے، تب

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\int Mdx \right) = \frac{\partial U}{\partial x}$$

چوں کہ $\frac{\partial}{\partial x} \left(\int Mdx \right) = M$ اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}$$

چوں کہ $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ اور $\frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 U}{\partial y \partial x}$ ہے، اس لیے

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial U}{\partial y} \right)$$

مکمل بہ لحاظ x کرنے پر ہمیں حاصل ہو گا

$$N = \frac{\partial U}{\partial y} + \phi(y)$$

جہاں $\phi(y)$ مستقل ہے۔ اب

$$\begin{aligned} Mdx + Ndy &= \frac{\partial U}{\partial x} dx + \left\{ \frac{\partial U}{\partial y} + \phi(y) \right\} dy \\ &= \left(\frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy \right) + \phi(y) dy \\ &= dU + \phi(y) dy \\ &= d \left(U + \int \phi(y) dy \right) \end{aligned}$$

جو ایک کامل تفرق (Total Differentiation) ہے۔ اس طرح $Mdx + Ndy = 0$ ایک ٹھیک تفرقی مساوات ہے۔

ٹھیک تفرقی مساوات کے حل کا عملی قاعدہ:

1. دی گئی مساوات کو $Mdx + Ndy = 0$ کی شکل میں لکھ کر M اور N معلوم کریں۔
 2. اگر $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ہو تب تفرقی مساوات ٹھیک ہے۔
 3. متغیر y کو مستقل مان کر M کو بہ لحاظ x تکمیل کریں۔
 4. متغیر x کو مستقل مان کر N کو بہ لحاظ y تکمیل کریں اور ان ار قام کو چھوڑ دو جو M کو بہ لحاظ x تکمیل کرنے پر حاصل ہوں۔
- تیسرے اور چوتھے مرحلے سے حاصل شدہ ار قام کو جمع کر کے ایک اختیاری مستقل کے برابر کرو۔ یہی ٹھیک مساوات کا حل ہو گا۔

مثال 1۔ حل کرو: $(ax + hy + g)dx + (hx + by + f)dy = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(ax + hy + g)dx + (hx + by + f)dy = 0$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = ax + hy + g$$

$$N = hx + by + f$$

اور

$$\frac{\partial M}{\partial y} = h, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = h$$

$\Rightarrow$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک ہے۔ ٹھیک مساوات کا حل درجہ ذیل طریقہ سے نکالا جاتا ہے

$$\int Mdx = \int (ax + hy + g)dx = a \frac{x^2}{2} + hyx + gx$$

$$\int Ndy = \int (hx + by + f)dy = hyx + b \frac{y^2}{2} + fy$$

چوں کہ hyx دونوں نکملات میں موجود ہے اس لیے اس کو چھوڑنے پر دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$a \frac{x^2}{2} + hyx + gx + b \frac{y^2}{2} + fy = c$$

$$ax^2 + 2hyx + 2gx + by^2 + 2fy = 2c = C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $ax^2 + 2hyx + 2gx + by^2 + 2fy = C$ ہو گا۔

مثال 2۔ حل کرو: $(e^y + 1) \cos x dx + e^y \sin x dy = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(e^y + 1) \cos x dx + e^y \sin x dy = 0$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = (e^y + 1) \cos x$$

$$N = e^y \sin x$$

اور

$$\frac{\partial M}{\partial y} = e^y \cos x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = e^y \cos x$$

$\Rightarrow$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک ہے۔ ٹھیک مساوات کا حل درجہ ذیل طریقہ سے نکالا جاتا ہے

$$\int Mdx = \int (e^y + 1) \cos x dx = (e^y + 1) \sin x$$

$$\int Ndy = \int e^y \sin x dy = e^y \sin x$$

چوں کہ $e^y \sin x$ دونوں تکملات میں موجود ہے اس لیے اس کو چھوڑنے پر دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$e^y \sin x + \sin x = C$$

$$(e^y + 1) \sin x = C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $(e^y + 1) \sin x = C$ ہو گا۔

مثال 3۔ حل کرو: $(x^2 - ay)dx = (ax - y^2)dy$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x^2 - ay)dx - (ax - y^2)dy = 0$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = x^2 - ay$$

$$N = -ax + y^2$$

اور

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -a, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -a$$

$\Rightarrow$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک تفرقی مساوات ہے۔ اس کا حل ہو گا

$$\int M dx = \int (x^2 - ay) dx = \frac{x^3}{3} - axy$$

$$\int N dy = \int (-ax + y^2) dy = -axy + \frac{y^3}{3}$$

چوں کہ $-axy$ دونوں تکریمات میں موجود ہے اس لیے اس کو چھوڑنے پر دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$\frac{x^3}{3} - axy + \frac{y^3}{3} = c$$

$$x^3 - 3axy + y^3 = 3c = C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $x^3 - 3axy + y^3 = C$ ہو گا۔

مثال 4۔ حل کرو: $(xy \cos xy + \sin xy) dx + x^2 \cos xy dy = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(xy \cos xy + \sin xy) dx + x^2 \cos xy dy = 0$$

اس مساوات کا تقابل $M dx + N dy = 0$ سے کرنے پر

$$M = xy \cos xy + \sin xy$$

$$N = x^2 \cos xy$$

اور

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x \cos xy - x^2 y \sin xy$$

$$\frac{\partial N}{\partial x} = 2x \cos xy - x^2 y \sin xy$$

اور

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک ہے۔ اس کا حل ہو گا

$$\begin{aligned} \int M dx &= \int (xy \cos xy + \sin xy) dx \\ &= xy \frac{\sin xy}{y} - \int 1 \cdot y \frac{\sin xy}{y} dx - \frac{\cos xy}{y} \\ &= x \sin xy - \int \sin xy dx - \frac{\cos xy}{y} \\ &= x \sin xy + \frac{\cos xy}{y} - \frac{\cos xy}{y} \\ &= x \sin xy \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned}\int N dy &= \int x^2 \cos xy \, dy \\ &= x^2 \frac{\sin xy}{x} \\ &= x \sin xy\end{aligned}$$

چوں کہ $x \sin xy$ دونوں تکملات میں موجود ہے۔ اس لیے اس کو چھوڑنے پر دی گئی مساوات کا حل ہو گا
 $x \sin xy = C$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $x \sin xy = C$ ہو گا۔

مثال 5۔ حل کرو: $(x^4 - 2xy^2 + y^4)dx + (4xy^3 - 2x^2y - \sin y)dy = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x^4 - 2xy^2 + y^4)dx + (4xy^3 - 2x^2y - \sin y)dy = 0$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = x^4 - 2xy^2 + y^4$$

$$N = 4xy^3 - 2x^2y - \sin y$$

اور

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -4xy + 4y^3, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -4xy + 4y^3$$

$\Rightarrow$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک تفرقی مساوات ہے۔ اس کا حل ہو گا

$$\begin{aligned}\int M dx &= \int (x^4 - 2xy^2 + y^4) dx \\ &= \frac{x^5}{5} - \frac{2x^2y^2}{2} + xy^4 \\ &= \frac{x^5}{5} - x^2y^2 + xy^4\end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned}\int N dy &= \int (4xy^3 - 2x^2y - \sin y) dy \\ &= \frac{4xy^4}{4} - \frac{2x^2y^2}{2} + \cos y \\ &= xy^4 - x^2y^2 + \cos y\end{aligned}$$

چونکہ $xy^4 - x^2y^2 + \cos y$ دونوں تکملات میں موجود ہے اس لیے اس کو چھوڑنے پر دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$\frac{x^5}{5} + xy^4 - x^2y^2 + \cos y = C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $\frac{x^5}{5} + xy^4 - x^2y^2 + \cos y = C$ ہو گا۔

3.2.2 متکمل اجزاء ضربی (Integrating Factors)

1. مساواتیں جو ٹھیک نہ ہوں لیکن ٹھیک بنائی جاسکتی ہوں

(Non Exact Differential Equations which can be Reduced to Exact)

فرض کرو کہ

$$Mdx + Ndy = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

ٹھیک مساوات نہیں ہے اور ایک تفاعل $f(x, y) \neq 0$ اس طرح وجود رکھتا ہے کہ اگر مساوات (1) کو $f(x, y)$ سے ضرب دیا جائے تو محصلہ مساوات $f(x, y)[Mdx + Ndy] = 0$ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسے تفاعل $f(x, y)$ کو دی ہوئی مساوات (1) کا متکمل اجزاء ضربی کہتے ہیں۔

2. تنقیدی جائزہ سے معلوم کیے گئے متکمل اجزاء ضربی (Integrating Factors found by Inspection):

ذیل کے ٹھیک مشتقات (Exact Differentials) کو یاد رکھیں:

$$\begin{aligned} d\left(\frac{x}{y}\right) &= \frac{ydx - xdy}{y^2} \quad (i) \\ d\left(\frac{y}{x}\right) &= \frac{xdy - ydx}{x^2} \quad (ii) \\ d\left(\log \frac{x}{y}\right) &= \frac{ydx - xdy}{xy} \quad (iii) \\ d\left(\log \frac{y}{x}\right) &= \frac{xdy - ydx}{xy} \quad (iv) \\ d(xy) &= xdy + ydx \quad (v) \\ d\left(\tan^{-1} \frac{x}{y}\right) &= \frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} \quad (vi) \\ d\left(\tan^{-1} \frac{y}{x}\right) &= \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \quad (vii) \\ d\left(\frac{1}{xy}\right) &= \frac{xdy + ydx}{x^2 y^2} \quad (viii) \\ d\left(\frac{x^2}{y^2}\right) &= \frac{2xy^2 dx - 2yx^2 dy}{y^4} \quad (ix) \\ d\left(\frac{y^2}{x^2}\right) &= \frac{2yx^2 dy - 2xy^2 dx}{x^4} \quad (x) \end{aligned}$$

مثال 1۔ حل کرو: $xdy - ydx + 2x^3 dx = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$xdy - ydx + 2x^3 dx = 0$$

یہ مساوات غیر ٹھیک (Non Exact) مساوات ہے، لیکن اس مساوات کو x^2 سے تقسیم دینے پر

$$\frac{xdy - ydx}{x^2} + 2xdx = 0$$

$$\Rightarrow d\left(\frac{y}{x}\right) + 2xdx = 0$$

$$\Rightarrow \int \left[d\left(\frac{y}{x}\right) + 2xdx \right] = C$$

$$\Rightarrow \frac{y}{x} + 2 \frac{x^2}{2} = C$$

$$\Rightarrow y + x^3 = Cx$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $y + x^3 = Cx$ ہو گا۔

مثال 2۔ مساوات $(x^2 + y^2 + x)dx - (2x^2 + 2y^2 - y)dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔
حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\Rightarrow (x^2 + y^2 + x)dx - (2x^2 + 2y^2 - y)dy = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2)dx - (2x^2 + 2y^2)dy + xdx + ydy = 0$$

$$\Rightarrow (x^2 + y^2)(dx - 2dy) + xdx + ydy = 0$$

$$\Rightarrow 2(dx - 2dy) + \frac{2xdx + 2ydy}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\Rightarrow 2dx - 4dy + d[\log(x^2 + y^2)] = 0$$

$$\Rightarrow \int [2dx - 4dy] + \int d[\log(x^2 + y^2)] = C$$

$$\Rightarrow 2x - 4y + \log(x^2 + y^2) = C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $2x - 4y + \log(x^2 + y^2) = C$ ہو گا۔

3. غیر ٹھیک مساوات کو ٹھیک بنانے کے لیے چند قوانین اور متکمل اجزا ضربی معلوم کرنے کے طریقے

(Some Rules to find Integrating Factors of Non Exact Equation to make it Exact)

پہلا قاعدہ: اگر $Mdx + Ndy = 0$ غیر ٹھیک ہے، $Mx + Ny \neq 0$ اور مساوات متجانس (Homogeneous) ہو تب
مساوات کا متکمل جزو ضربی ہو گا۔ اس لیے ٹھیک مساوات درجہ ذیل ہوگی جس کا حل حاصل کیا جاسکتا ہے

$$\frac{1}{Mx + Ny} [Mdx + Ndy] = 0$$

دوسرا قاعدہ: اگر مساوات $Mdx + Ndy = 0$ ٹھیک نہ ہو اور اس کی شکل $f(xy)ydx + g(xy)xdy = 0$ کی ہو تب
مساوات $Mdx + Ndy = 0$ کا متکمل جزو ضربی اور اس طرح ٹھیک مساوات ہوگی

$$\frac{1}{Mx - Ny} [Mdx + Ndy] = 0, (Mx - Ny \neq 0)$$

تیسرا قاعدہ: اگر مساوات $Mdx + Ndy = 0$ ٹھیک نہ ہو اور اس کی شکل $f(x) = \frac{1}{N} \left[\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right]$ کی ہو تب $e^{\int f(x)dx}$ مساوات
 $Mdx + Ndy = 0$ کا متکمل جزو ضربی اور اس طرح ٹھیک مساوات درجہ ذیل ہوگی جس کا حل حاصل کیا جاسکتا ہے

$$e^{\int f(x)dx} [Mdx + Ndy] = 0$$

چوتھا قاعدہ: اگر $g(y) = \frac{1}{M} \left[\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right]$ کی ہو تب $e^{\int g(y)dy}$ مساوات $Mdx + Ndy = 0$ کا متکمل جزو ضربی اور اس طرح
ٹھیک مساوات درجہ ذیل ہوگی جس کا حل حاصل کیا جاسکتا ہے

$$e^{\int g(y)dy} [Mdx + Ndy] = 0$$

پہلے قائمہ کے چند مسائل:

مثال 1۔ حل کرو: $(x^2y - 2xy^2)dx - (x^3 - 3x^2y)dy = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x^2y - 2xy^2)dx - (x^3 - 3x^2y)dy = 0$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = x^2y - 2xy^2$$

$$N = 3x^2y - x^3$$

اور

یہاں M اور N متجانس ہیں۔ اور

$$\begin{aligned} Mx + Ny &= (x^2y - 2xy^2)x + (3x^2y - x^3)y \\ &= x^3y - 2x^2y^2 + 3x^2y^2 - x^3y \\ &= x^2y^2 \neq 0 \end{aligned}$$

$\frac{1}{x^2y^2}$ دی گئی مساوات کا مکمل جزو ضربی ہے۔ اس لیے ٹھیک مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{1}{x^2y^2} [(x^2y - 2xy^2)dx - (x^3 - 3x^2y)dy] = 0$$

$\Rightarrow$

$$\left(\frac{1}{y} - \frac{2}{x}\right)dx - \left(\frac{x}{y^2} - \frac{3}{y}\right)dy = 0$$

اس مساوات کا حل دی گئی مساوات کے حل کے برابر ہوگا۔ اب اس مساوات کا تقابل $M'dx + N'dy = 0$ سے کرنے پر ہمیں حاصل

ہوتا ہے

$$\begin{aligned} M' &= \frac{1}{y} - \frac{2}{x}, & N' &= \frac{3}{y} - \frac{x}{y^2} \\ \Rightarrow \frac{\partial M'}{\partial y} &= -\frac{1}{y^2}, & \frac{\partial N'}{\partial x} &= -\frac{1}{y^2} \end{aligned}$$

اس لیے

$$\frac{\partial M'}{\partial y} = \frac{\partial N'}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک تفرقی مساوات ہے۔ اس کا حل درجہ ذیل طریقہ سے نکالا جاتا ہے

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{1}{y} - \frac{2}{x}\right)dx + \int \left(\frac{3}{y}\right)dy &= C \\ \frac{x}{y} - 2 \log x + 3 \log y &= C \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $C = \frac{x}{y} + \log \left(\frac{y^3}{x^2}\right)$ ہوگا۔

مثال 2۔ حل کرو: $x^2ydx - (x^3 + y^3)dy = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x^2ydx - (x^3 + y^3)dy = 0$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = x^2y$$

$$N = -(x^3 + y^3)$$

اور

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -3x^2$$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک مساوات نہیں ہے۔ اب

$$\begin{aligned} Mx + Ny &= x^3y - (x^3 + y^3)y \\ &= x^3y - x^3y - y^4 \\ &= -y^4 \neq 0 \end{aligned}$$

$\frac{1}{-y^4}$ دی گئی مساوات کا متکمل جزو ضربی ہے۔ اس لیے ٹھیک مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{1}{-y^4} [x^2ydx - (x^3 + y^3)dy] = 0$$

$$\Rightarrow \left[\frac{x^2}{-y^3} dx + \left(\frac{x^3}{y^4} + \frac{1}{y} \right) dy \right] = 0$$

اس کا حل درجہ ذیل طریقہ سے نکالا جاتا ہے جو کہ دی گئی مساوات کے حل کے برابر ہوگا

$$\int \left(\frac{x^2}{-y^3} \right) dx + \int \left(\frac{1}{y} \right) dy = C$$

$$\Rightarrow \frac{x^3}{-3y^3} + \log y = C = \log K$$

$$\Rightarrow \log \frac{y}{K} = \frac{x^3}{3y^3}$$

$$\Rightarrow y = K e^{\frac{x^3}{3y^3}}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $y = K e^{\frac{x^3}{3y^3}}$ ہوگا۔

مثال 3۔ حل کرو: $xydx - (x^2 + 2y^2)dy = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$xydx - (x^2 + 2y^2)dy = 0$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = xy$$

$$N = -(x^2 + 2y^2)$$

اور

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = x, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = -2x$$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک مساوات نہیں ہے اور M, N متجانس ہیں۔ اس لیے

$$\begin{aligned} Mx + Ny &= x^2y - (x^2 + 2y^2)y \\ &= x^2y - x^2y - 2y^3 \\ &= -2y^3 \neq 0 \end{aligned}$$

$\frac{1}{-2y^3}$ دی گئی مساوات کا مکمل جزو ضربی ہے۔ اس لیے ٹھیک مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{1}{-2y^3} [xydx - (x^2 + 2y^2)dy] = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-x}{2y^2} dx + \left(\frac{x^2}{2y^3} + \frac{1}{y} \right) dy = 0$$

اس مساوات کا حل دی گئی مساوات کے حل کے برابر ہوگا۔ اس لیے اس مساوات کا حل ہے

$$\int \left(\frac{-x}{2y^2} \right) dx + \int \left(\frac{1}{y} \right) dy = C$$

$$\Rightarrow \frac{-x^2}{4y^2} + \log y = C = \log K$$

$$\Rightarrow \log \frac{y}{K} = \frac{x^2}{4y^2}$$

$$\Rightarrow y = K e^{\frac{x^2}{4y^2}}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $y = K e^{\frac{x^2}{4y^2}}$ ہوگا۔

دوسرے قاعدے کے چند مسائل:

مثال 1۔ مساوات $y(xy + 2x^2y^2)dx + x(xy - x^2y^2)dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$y(xy + 2x^2y^2)dx + x(xy - x^2y^2)dy = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = y(xy + 2x^2y^2)$$

$$N = x(xy - x^2y^2)$$

اور

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 2xy + 6x^2y^2, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy - 3x^2y^2$$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک مساوات نہیں ہے اور اس کی شکل $yf(xy)dx + xg(xy)dy = 0$ ہے اور

$$\begin{aligned} Mx - Ny &= y(xy + 2x^2y^2)x - x(xy - x^2y^2)y \\ &= x^2y^2 + 2x^3y^3 - x^2y^2 + x^3y^3 \\ &= 3x^3y^3 \neq 0 \end{aligned}$$

دی گئی مساوات کا متکمل جزو ضربی ہے۔ اس لیے ٹھیک مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{1}{3x^3y^3} [y(xy + 2x^2y^2)dx + x(xy - x^2y^2)dy] = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{xy^2 + 2x^2y^3}{3x^3y^3} \right) dx + \left(\frac{x^2y - x^3y^2}{3x^3y^3} \right) dy = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{3x^2y} + \frac{2}{3x} \right) dx + \left(\frac{1}{3xy^2} - \frac{1}{3y} \right) dy = 0$$

اس مساوات کا حل دی گئی مساوات کے حل کے برابر ہو گا۔ اس لیے اس مساوات کا حل ہے

$$\int \left(\frac{1}{3x^2y} + \frac{2}{3x} \right) dx - \int \left(\frac{1}{3y} \right) dy = C$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{3xy} + \frac{2}{3} \log x - \frac{1}{3} \log y = C$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{xy} + \log x^2 - \log y = 3C = K$$

$$\Rightarrow \log \left(\frac{x^2}{y} \right) - \frac{1}{xy} = K$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $\log \left(\frac{x^2}{y} \right) - \frac{1}{xy} = K$ ہو گا۔

مثال 2۔ مساوات $y(1 - xy)dx + x(1 + xy)dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$y(1 - xy)dx + x(1 + xy)dy = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

اس مساوات کا تقابلی $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = y(1 - xy), N = x(1 + xy)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 1 - 2xy, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 1 + 2xy$$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک مساوات نہیں ہے اور اس کی شکل $yf(xy)dx + xg(xy)dy = 0$ ہے اور

$$\begin{aligned} Mx - Ny &= y(1 - xy)x - x(1 + xy)y \\ &= xy - x^2y^2 - xy - x^2y^2 \end{aligned}$$

$$= -2x^2y^2 \neq 0$$

دی گئی مساوات کا مکمل جزو ضربی ہے۔ اس لیے ٹھیک مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{1}{-2x^2y^2} [y(1 - xy)dx + x(1 + xy)dy] = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{y - xy^2}{-2x^2y^2} \right) dx + \left(\frac{x + x^2y}{-2x^2y^2} \right) dy = 0$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{1}{2x^2y} + \frac{1}{2x} \right) dx + \left(-\frac{1}{2xy^2} - \frac{1}{2y} \right) dy = 0$$

اس مساوات کا حل دی گئی مساوات کے حل کے برابر ہوگا۔ اس لیے اس مساوات کا حل ہے

$$\int \left(-\frac{1}{2x^2y} + \frac{1}{2x} \right) dx - \int \left(\frac{1}{2y} \right) dy = C$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2xy} + \frac{1}{2} \log x - \frac{1}{2} \log y = C$$

$$\Rightarrow \frac{1}{xy} + \log x - \log y = 2C = K$$

$$\Rightarrow \log \left(\frac{x}{y} \right) + \frac{1}{xy} = K$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $\log \left(\frac{x}{y} \right) + \frac{1}{xy} = K$ ہوگا۔

تیسرے اور چوتھے قاعدے کے چند مسائل:-

مثال 1- مساوات $(y + y^2)dx + xydy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(y + y^2)dx + xydy = 0 \quad \dots\dots(1)$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$\begin{aligned} M &= y + y^2, & N &= xy \\ \frac{\partial M}{\partial y} &= 1 + 2y, & \frac{\partial N}{\partial x} &= y \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک مساوات نہیں ہے اور

$$\begin{aligned} \frac{1}{M} \left[\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right] &= \frac{1}{y(1 + y)} (y - 1 - 2y) \\ &= -\frac{1}{y(1 + y)} (1 + y) \\ &= -\frac{1}{y} = g(y) \end{aligned}$$

اس لیے $\frac{1}{y}$ سے ضرب دینے پر

$$\frac{1}{y}[(y + y^2)dx + xydy] = 0$$

$$\Rightarrow (1 + y)dx + xdy = 0$$

ٹھیک مساوات ہے۔

اس مساوات کا حل دی گئی مساوات کے حل کے برابر ہو گا۔ اس لیے اس مساوات کا حل ہے

$$dx + ydx + xdy = 0$$

$$\Rightarrow dx + d(xy) = 0$$

$$\Rightarrow d(x + xy) = 0$$

$$\Rightarrow x + xy = C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $x + xy = C$ ہو گا۔

مثال 2۔ مساوات $y(x + y)dx + x(x + 3y + 2)dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$y(x + y + 1)dx + x(x + 3y + 2)dy = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = y(x + y + 1), N = x(x + 3y + 2)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = x + 2y + 1, \frac{\partial N}{\partial x} = 2x + 3y + 2$$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک مساوات نہیں ہے اور

$$\frac{1}{M} \left[\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} \right] = \frac{1}{y(x + y + 1)} (2x + 3y + 2 - x - 2y - 1)$$

$$= \frac{1}{y(x + y + 1)} (x + y + 1)$$

$$= \frac{1}{y} = g(y)$$

اس لیے $\frac{1}{y}$ سے ضرب دینے پر

$$y[y(x + y + 1)dx + x(x + 3y + 2)dy] = 0$$

$$\Rightarrow y^2(x + y + 1)dx + xy(x + 3y + 2)dy = 0$$

ٹھیک مساوات ہے۔ اس مساوات کا تقابل $M'dx + N'dy = 0$ سے کرنے پر

$$M' = y^2(x + y + 1) = y^2x + y^3 + y^2,$$

$$N' = xy(x + 3y + 2) = x^2y + 3xy^2 + 2xy$$

اس لیے مساوات کا حل ہے

$$\int M' dx + \int (N', \text{ بغیر } x \text{ کے ارکان}) dy = C$$

$$\Rightarrow \int (y^2x + y^3 + y^2) dx + \int 0 dy = C$$

$$\Rightarrow \frac{y^2x^2}{2} + xy^3 + xy^2 = C$$

$$\Rightarrow y^2x^2 + 2xy^3 + 2xy^2 = 2C = K$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $y^2x^2 + 2xy^3 + 2xy^2 = 2C = K$ ہو گا۔

مثال 3۔ مساوات $(y + \frac{y^3}{3} + \frac{x^2}{2}) dx + \frac{1}{4}(x + xy^2) dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(y + \frac{y^3}{3} + \frac{x^2}{2}) dx + \frac{1}{4}(x + xy^2) dy = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$M = y + \frac{y^3}{3} + \frac{x^2}{2}, N = \frac{1}{4}(x + xy^2)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = 1 + y^2, \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{1}{4}(1 + y^2)$$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک مساوات نہیں ہے اور

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \left[\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right] &= \frac{4}{x + xy^2} \left(1 + y^2 - \frac{1}{4}(1 + y^2) \right) \\ &= \frac{4}{x(1 + y^2)} \times \frac{3}{4}(1 + y^2) \\ &= \frac{3}{x} = f(x) \end{aligned}$$

اس لیے $e^{\int f(x) dx} = e^{\int (\frac{3}{x}) dx} = e^{3 \log x} = x^3$ کو x^3 سے ضرب

دینے پر

$$x^3 \left[\left(y + \frac{y^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right) dx + \frac{1}{4}(x + xy^2) dy \right] = 0$$

$$\Rightarrow \left(x^3y + \frac{x^3y^3}{3} + \frac{x^5}{2} \right) dx + \frac{1}{4}x^4(1 + y^2) dy = 0$$

اب یہ ایک ٹھیک تفرقی مساوات ہے۔ اس مساوات کا تقابل $M' dx + N' dy = 0$ سے کرنے پر

$$M' = x^3y + \frac{x^3y^3}{3} + \frac{x^5}{2},$$

$$N' = \frac{1}{4}x^4(1 + y^2)$$

اس لیے مساوات کا حل ہے

$$\Rightarrow \int M' dx + \int (N' \text{ کے } x \text{ کے ارکان}) dy = C$$

$$\Rightarrow \int \left(x^3y + \frac{x^3y^3}{3} + \frac{x^5}{2} \right) dx + \int (0) dy = C$$

$$\Rightarrow \frac{yx^4}{4} + \frac{x^4y^3}{4 \times 3} + \frac{x^6}{6 \times 2} = C$$

$$\Rightarrow 3yx^4 + x^4y^3 + x^6 = 12C = K$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $3yx^4 + x^4y^3 + x^6 = K$ ہے۔

مثال 4۔ مساوات $(2y^3 + 2)dx + 3xy^2dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(2y^3 + 2)dx + 3xy^2dy = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

اس مساوات کا تقابل $Mdx + Ndy = 0$ سے کرنے پر

$$\Rightarrow \begin{aligned} M &= 2y^3 + 2, N = 3xy^2 \\ \frac{\partial M}{\partial y} &= 6y^2, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 3y^2 \end{aligned}$$

اس لیے

$$\frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے دی گئی مساوات ٹھیک مساوات نہیں ہے اور

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \left[\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right] &= \frac{1}{3xy^2} (6y^2 - 3y^2) \\ &= \frac{1}{3xy^2} \times 3y^2 \\ &= \frac{1}{x} = f(x) \end{aligned}$$

اس لیے $e^{\int f(x)dx} = e^{\int \left(\frac{1}{x}\right)dx} = e^{\log x} = x$ دی گئی مساوات کا مکمل جزو ضربی ہے۔ اب مساوات (1) کو x سے ضرب دینے پر

$$\Rightarrow \begin{aligned} x[(2y^3 + 2)dx + 3xy^2dy] &= 0 \\ (2xy^3 + 2x)dx + 3x^2y^2dy &= 0 \end{aligned}$$

اب یہ ایک ٹھیک تفرقی مساوات ہے۔ اس مساوات کا تقابل $M' dx + N' dy = 0$ سے کرنے پر

$$M' = 2xy^3 + 2x,$$

$$N' = 3x^2y^2$$

اس لیے مساوات کا حل ہے

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int M' dx + \int (N' \text{ کے } x \text{ کے ارکان}) dy &= C \\ \Rightarrow \int (2xy^3 + 2x) dx + \int (0) dy &= C \\ \Rightarrow \frac{2x^2y^3}{2} + 2 \times \frac{x^2}{2} &= C \\ \Rightarrow x^2y^3 + x^2 &= C \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $x^2y^3 + x^2 = C$ ہے۔

3.4 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

1. مساوات $Mdx + Ndy = 0$ ٹھیک مساوات کہلاتی ہے اگر $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ ہو اور اس کا حل درجہ ذیل ہو گا

$$\int Mdx + \int (N - \text{مقام } x \text{ کے } x) dy = C$$
2. اگر مساوات $Mdx + Ndy = 0$ ٹھیک مساوات نہ ہو، تب اس مساوات کو حل کرنے کے لیے چار قاعدے دیے گئے ہیں جس کی مدد سے مساوات کو ٹھیک مساوات میں تبدیل کر کے اس کا حل معلوم کر سکتے ہیں۔

3.5 کلیدی الفاظ (Key Words)

ٹھیک مساوات، غیر ٹھیک مساوات، متجانس تفاعل، متکمل جزو ضربی

3.6 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

3.6.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. مساوات $\frac{dy}{dx} + \frac{ax+hy+g}{hx+by+f} = 0$ ہے
A. متجانس B. متغیر جدا پزیر C. ٹھیک D. ان میں سے کوئی نہیں
2. ذیل میں سے کون ٹھیک مساوات ہے
A. $2xydx + (x^2 + y^2)dy = 0$ B. $(y \sin 2x)dx - (\cos^2 x + y^2)dy = 0$
C. $(a^2 - 2xy - y^2)dx - (x - y)^2dy = 0$ D. ان میں سے کوئی نہیں

3. اگر $Mdx + Ndy = 0$ متجانس مساوات ہے اور $Mx + Ny = 0$ تب اس مساوات کا I.F. ہے

A $Mx + Ny$ B $Mx - Ny$ C $\frac{1}{Mx+Ny}$ D $\frac{1}{Mx-Ny}$

3.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

ذیل کی مساواتوں کو حل کریے:

1. $y \sin 2x dx - (y^2 + \cos^2 x) dy = 0$

2. $(1 + e^{x/y}) dx + e^{x/y} \left(1 - \frac{x}{y}\right) dy = 0$

3. $(x^2 - 2xy - y^2) dx - (x + y)^2 dy = 0$

4. $(r + \sin \theta - \cos \theta) dr + r(\sin \theta + \cos \theta) d\theta = 0$

5. $(xe^{xy} + 2y) \frac{dy}{dx} + ye^{xy} = 0$

3.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

ثابت کرو کہ ذیل کی مساواتیں ٹھیک مساواتیں ہیں۔ اگر ٹھیک ہیں تو ان کا حل دریافت کریں:

1. $(x^2 - 4xy - 2y^2) dx + (y^2 - 4xy - 2x^2) dy = 0$

2. $(x^2 + y^2)(x dx + y dy) = a^2(x dy - y dx) = 0$

3. $[\cos x \tan y + \cos(x + y)] dx + [\sin x \sec^2 y + \cos(x + y)] dy = 0$

ذیل کی مساواتوں کو حل کرو:

4. $y - x \frac{dy}{dx} = x + y \frac{dy}{dx}$

5. $(3xy^2 - y^3) dx - (2x^2y - xy^2) dy = 0$

6. $y^2 dx + (x^2 - xy - y^2) dy = 0$

ذیل کی مساواتوں کا حل معلوم کرو:

7. $(x^3y^3 + x^2y^2 + xy + 1)y dx + (x^3y^3 - x^2y^2 - xy + 1)x dy = 0$

8. $(x^4y^4 + x^2y^2 + xy)y dx + (x^4y^4 - x^2y^2 + xy)x dy = 0$

ذیل کی مساواتوں کے حل معلوم کرو:

9. $(x^2 + y^2 + 2x) dx + 2y dy = 0$

10. $(x^3 - 2y^2) dx + 2xy dy = 0$

11. $(2x^2y - 3y^2) dx + (2x^3 - 12xy + \log y) dy = 0$

12. $(3x^2y^4 + 2xy) dx + (2x^3y^3 - x^2) dy = 0$

13. مساوات $(xy^2 - e^{\frac{1}{x^3}}) dx - x^2y dy = 0$ کا حل دریافت کرو۔

14. مساوات $(2xy^4e^y + 2xy^3 + y) dx + (x^2y^4e^y - x^2y^2 - 3x) dy = 0$ کو حل کرو۔

جوابات:

3.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$3y \cos 2x + 2y^3 = C \quad .1$$

$$x + ye^{\left(\frac{x}{y}\right)} = C \quad .2$$

$$x^3 - 3x^2y - 3y^2x - y^3 = C \quad .3$$

$$r^2 + 2r(\sin \theta - \cos \theta)d\theta = C \quad .4$$

$$e^{xy} + y^2 = C \quad .5$$

3.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$x^3 - 6x^2y - 6y^2x + y^3 = C \quad .1$$

$$x^2 + y^2 + 2a^2 \tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right) = 2C \quad .2$$

$$\sin x \tan y + \sin(x + y) = C \quad .3$$

$$\log \sqrt{x^2 + y^2} - \tan^{-1} \left(\frac{x}{y} \right) = C \quad .4$$

$$\log \left(\frac{x^3}{y^2} \right) + \frac{y}{x} = C \quad .5$$

$$y^2(x - y) = C^2(x + y) \quad .6$$

$$xy - \frac{1}{xy} - \log y^2 = 2C \quad .7$$

$$\frac{x^2y^2}{2} - \frac{1}{xy} + \log \left(\frac{x}{y} \right) = C \quad .8$$

$$(x^2 + y^2)e^x = C \quad .9$$

$$x^3 + y^2 = Cx^2 \quad .10$$

$$6x^3y^3 - 27xy^4 + 3y^3 \log y = C \quad .11$$

$$x^3y^3 + x^2 = Cy \quad .12$$

$$2e^{\frac{1}{x^3}} - 3\frac{y^2}{x^2} = C \quad .13$$

$$x^2e^y + \frac{x^2}{y} + \frac{x}{y^3} = C \quad .14$$

3.7 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhania, S.Chand & Co., New Delhi
3. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume –I , V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company

اکائی 4۔ پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساواتیں

(Linear Differential Equations of First Order and First Degree)

اکائی کے اجزا

تمہید	4.0
مقاصد	4.1
پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساواتیں	4.2
تحویل پزیر خطی تفرقی مساواتیں	4.2.1
اکتسابی نتائج	4.3
کلیدی الفاظ	4.4
نمونہ امتحانی سوالات	4.5
معروضی جوابات کے حامل سوالات	4.5.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	4.5.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	4.5.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	4.6

4.0 تمہید (Introduction)

خطی مساواتیں (Linear Equations) بہت ہی خاص شکل کی مساواتیں ہیں اور متناظر حل کرنے کے طریقے مختلف تکنیکیوں پر مشتمل ہیں۔ پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساوات کی شکل $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ ہے اور تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + Py = Qy^n$ کو برنولی مساوات (Bernoulli's Equation) کہتے ہیں۔ جس کو ہم خطی بنا کر حل کریں گے۔

4.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے پر آپ مختلف قسم کی پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساواتوں سے واقف ہو جائیں گے اور ان کا حل حاصل کر سکیں گے نیز برنولی مساوات کے حل کے طریقے سے بھی واقف ہو جائیں گے۔ اس اکائی میں ہم خطی تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ کو ٹھیک مساوات کی مدد سے حل کر کے اس کے استعمال سے برنولی کی مساوات $\frac{dy}{dx} + Py = Qy^n$ کے حل کے طریقے کو بیان کریں گے۔

4.2 پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساواتیں

(Linear Differential Equations of First Order and First Degree)

پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساواتوں کی معیاری شکل

$$\frac{dy}{dx} + Py = Q \quad \text{.....(1)}$$

ہے، جہاں P اور Q کوئی دو مستقلات یا x کے مسلسل تفاعل ہیں۔

نظریہ: اگر P اور Q کسی وقفہ I پر x کے تفرق پذیر تفاعلات ہوں، تب مساوات (1) کا عام حل (General Solution)

$$ye^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

ہوگا۔

ثبوت: دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + Py = Q \quad \text{.....(1)}$$

جہاں P اور Q کوئی دو x کے تفاعلات ہیں۔ مساوات (1) کو $Mdx + Ndy = 0$ کی شکل میں لکھنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$(Py - Q)dx + dy = 0 \quad \text{.....(2)}$$

یہاں $M = Py - Q$ اور $N = 1$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = P, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} \neq \frac{\partial N}{\partial x}$$

اس لیے مساوات (2) ٹھیک مساوات نہیں ہے، لیکن

$$\frac{1}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) = 1(P - 0) = P = f(x)$$

اس لیے مساوات (2) کا مکمل جزو ضربی (Integrating Factor) $I.F. = e^{\int P dx}$ ہے۔ مساوات (1) کو $e^{\int P dx}$ سے ضرب دینے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$e^{\int P dx} \frac{dy}{dx} + P e^{\int P dx} \cdot y = Q e^{\int P dx}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} (y e^{\int P dx}) = Q e^{\int P dx}$$

$$\Rightarrow \int \frac{d}{dx} (y e^{\int P dx}) dx = \int [Q e^{\int P dx}] dx$$

$$y e^{\int P dx} = \int [Q e^{\int P dx}] dx + C$$

اس طرح مساوات (1) کا حل $y e^{\int P dx} = \int [Q e^{\int P dx}] dx + C$ جہاں C ایک مستقل ہے۔

$$\text{مثال 1۔ حل کرو: } (x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + 4xy = \frac{1}{x^2 + 1}$$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + 4xy = \frac{1}{x^2 + 1}$$

اس مساوات کو $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ کی شکل میں لانے پر

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{4x}{x^2 + 1} \right) y = \frac{1}{(x^2 + 1)^2} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$\text{یہاں } P = \frac{4x}{x^2 + 1} \text{ اور } Q = \frac{1}{(x^2 + 1)^2} \text{ ہیں۔}$$

چوں کہ مساوات (1) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$y e^{\int P dx} = \int [Q e^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے $e^{\int P dx}$ حاصل کریں گے۔ اس لیے

$$\begin{aligned}\int P dx &= \int \left(\frac{4x}{x^2 + 1} \right) dx \\ &= 2 \int \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right) dx \\ &= 2 \log(x^2 + 1) \\ &= \log(x^2 + 1)^2\end{aligned}$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{\log(x^2 + 1)^2} = (x^2 + 1)^2$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہو گا

$$\begin{aligned}y(x^2 + 1)^2 &= \int \left[\frac{1}{(x^2 + 1)^2} \times (x^2 + 1)^2 \right] dx + C \\ &= \int 1 dx + C \\ &= x + C\end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $y(x^2 + 1)^2 = x + C$ ہے۔

مثال 2۔ حل کرو: $x \frac{dy}{dx} + 2y - x^2 \log x = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x \frac{dy}{dx} + 2y - x^2 \log x = 0$$

اس مساوات کو $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ کی شکل میں لانے پر

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{2}{x} \right) y = x \log x \quad \dots\dots\dots (1)$$

یہاں $P = \frac{2}{x}$ اور $Q = x \log x$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (1) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ye^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے $e^{\int P dx}$ حاصل کریں گے۔ اس لیے

$$\begin{aligned}\int P dx &= \int \left(\frac{2}{x}\right) dx \\ &= 2 \log x \\ &= \log x^2\end{aligned}$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{\log x^2} = x^2$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہو گا

$$\begin{aligned}yx^2 &= \int [x \log x] x^2 dx + C \\ &= \int x^3 \log x dx + C \\ &= \log x \int x^3 dx - \int \left[\frac{d}{dx} (\log x) \int x^3 dx \right] dx + C \\ &= \frac{x^4}{4} \log x - \int \left[\frac{1}{x} \times \frac{x^4}{4} \right] dx + C \\ &= \frac{x^4}{4} \log x - \frac{1}{4} \int x^3 dx + C \\ &= \frac{x^4}{4} \log x - \frac{x^4}{16} + C\end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $x^2 y = \frac{x^4}{4} \log x - \frac{x^4}{16} + C$ ہے۔

تبصرہ (Remark): بعض اوقات خطی تفرقی مساوات کی شکل $Q_1 \frac{dx}{dy} + P_1 x = Q_2$ ہوتی ہے، جہاں P_1 اور Q_1 کوئی دو y کے تفاعلات ہیں۔

اب اس مساوات کا حل ذیل کی طرح ہو گا

$$xe^{\int P_1 dy} = \int [Q_1 e^{\int P_1 dy}] dy + C$$

مثال 3- مساوات $y \frac{dy}{dx} = (x + 2y^3)$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x + 2y^3) \frac{dy}{dx} = y$$

اس مساوات کو خطی تفرقی مساوات کی معیاری شکل میں بدلنے پر

$$\frac{dx}{dy} + \left(-\frac{1}{y}\right)x = 2y^2 \quad \text{.....(1)}$$

یہاں $P_1 = -\frac{1}{y}$ اور $Q_1 = 2y^2$ ہیں۔

اس کا حل ہے

$$x e^{\int P_1 dy} = \int \left[Q_1 e^{\int P_1 dy} \right] dy + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے $e^{\int P_1 dy}$ حاصل کریں گے۔ اس لیے

$$\int P_1 dy = \int \left(-\frac{1}{y}\right) dy$$

$$= -\log y$$

$$= \log\left(\frac{1}{y}\right)$$

اس لیے

$$e^{\int P_1 dy} = e^{\log\left(\frac{1}{y}\right)} = \frac{1}{y}$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہوگا

$$x \frac{1}{y} = \int \left[2y^2 \times \frac{1}{y} \right] dy + C$$

$$= \int 2y dy + C$$

$$= y^2 + C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $x = y^3 + Cy$ ہے۔

مثال 4- مساوات $(1 + y^2)dx = (\tan^{-1} y - x)dy$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(1 + y^2)dx = (\tan^{-1} y - x)dy$$

اس مساوات کو خطی تفرقی مساوات کی معیاری شکل میں بدلنے پر

$$\frac{dx}{dy} + \left(\frac{1}{1+y^2}\right)x = \frac{\tan^{-1} y}{1+y^2} \quad \dots\dots\dots(1)$$

$$\text{یہاں } P_1 = \frac{1}{1+y^2} \text{ اور } Q_1 = \frac{\tan^{-1} y}{1+y^2} \text{ ہیں۔}$$

اس کا حل ہے

$$xe^{\int P_1 dy} = \int \left[Q_1 e^{\int P_1 dy} \right] dy + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے $e^{\int P_1 dy}$ حاصل کریں گے۔ اس لیے

$$\begin{aligned} \int P_1 dy &= \int \left(\frac{1}{1+y^2} \right) dy \\ &= \tan^{-1} y \end{aligned}$$

اس لیے

$$e^{\int P_1 dy} = e^{\tan^{-1} y}$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہوگا

$$xe^{\tan^{-1} y} = \int \left[\frac{\tan^{-1} y}{1+y^2} \times e^{\tan^{-1} y} \right] dy + C$$

$$z = \tan^{-1} y \Rightarrow dz = \frac{1}{1+y^2} dy \text{ فرض کرو کہ}$$

$$\begin{aligned} xe^{\tan^{-1} y} &= \int ze^z dz + C \\ &= (z - 1)e^z + C \end{aligned}$$

$$= (\tan^{-1} y - 1)e^{\tan^{-1} y} + C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $x = (\tan^{-1} y - 1) + Ce^{\tan^{-1} y}$ ہے۔

مثال 5۔ منحنی کی مساوات معلوم کرو جس کی تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + 2y \tan x = \sin x$ ہے، جب کہ دیا گیا ہے کہ $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + (2 \tan x)y = \sin x \quad \dots\dots\dots(1)$$

یہاں $P = 2 \tan x$ اور $Q = \sin x$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (1) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ye^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس کے لیے ہم پہلے $e^{\int P dx}$ حاصل کریں گے۔ اس لیے

$$\begin{aligned} \int P dx &= \int (2 \tan x) dx \\ &= 2 \log \sec x \\ &= \log(\sec^2 x) \end{aligned}$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{\log(\sec^2 x)} = \sec^2 x$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہو گا

$$\begin{aligned} y \sec^2 x &= \int [\sin x \cdot \sec^2 x] dx + C \\ &= \int [\sec x \cdot \tan x] dx + C \\ &= \sec x + C \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $y \sec^2 x = \sec x + C$ ہے۔

دیا گیا ہے $y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$ اس لیے

$$(0)\sec^2 \frac{\pi}{3} = \sec \frac{\pi}{3} + C$$

$$0 = 2 + C \Rightarrow C = -2$$

اس طرح $y\sec^2 x = \sec x - 2$ اس منحنی کی مساوات ہے جس کی تفرقی مساوات $\sin x + 2y \tan x = \frac{dy}{dx}$ ہے۔

4.2.1 تحویل پذیر خطی مساواتیں (Equations Reducible to Linear Differential Equations)

تعریف: وہ مساوات جو درجہ ذیل شکل میں ہو

$$\frac{dy}{dx} + Py = Qy^n \quad \text{.....(1)}$$

جہاں P اور Q حقیقی اعداد یا x کے تفاعل ہیں برنولی تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

اس کو حل کرنے کے لیے مساوات (1) کو خطی مساوات بنانے کے لیے y^{-n} سے مساوات (1) کو ضرب دیتے ہیں۔ اس لیے

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} + Py^{1-n} = Q \quad \text{.....(2)}$$

فرض کرو کہ $z = y^{1-n}$ تب

$$(1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}$$

$$y^{-n} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{(1-n)} \frac{dz}{dx}$$

مساوات (2) سے

$$\frac{1}{(1-n)} \frac{dz}{dx} + Pz = Q$$

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)Pz = (1-n)Q$$

$$\frac{dz}{dx} + P'z = Q' \quad \text{.....(3)}$$

جہاں $Q' = (1-n)Q$ اور $P' = (1-n)P$ ہیں۔ مساوات (3) خطی ہے جس کا حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال 1- حل کرو: $\frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{x}\right)y = x^2y^6$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{x}\right)y = x^2y^6 \quad \dots\dots\dots(1)$$

y^{-6} سے مساوات (1) کو ضرب دینے پر

$$y^{-6} \frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{x}\right)y^{-5} = x^2 \quad \dots\dots\dots(2)$$

فرض کرو کہ $z = y^{-5}$ تب

$$-5y^{-6} \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}$$

$$y^{-6} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{-5} \frac{dz}{dx}$$

مساوات (2) سے

$$\frac{1}{-5} \frac{dz}{dx} + \left(\frac{1}{x}\right)z = x^2$$

$$\frac{dz}{dx} - \left(\frac{5}{x}\right)z = -5x^2 \quad \dots\dots\dots(3)$$

یہاں $P = -\frac{5}{x}$ اور $Q = -5x^2$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (3) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ze^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس لیے

$$\int P dx = -5 \int \left(\frac{1}{x}\right) dx$$

$$= -5 \log x$$

$$= \log x^{-5}$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{\log x^{-5}} = x^{-5}$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہوگا

$$zx^{-5} = \int [-5x^2 \cdot x^{-5}] dx + C$$

$$= -5 \int x^{-3} dx + C$$

$$= -5 \left(\frac{x^{-2}}{-2} \right) + C$$

$$zx^{-5} = \frac{5}{2x^2} + C$$

$$\Rightarrow z = \frac{5}{2}x^3 + Cx^5$$

$$\Rightarrow y^{-5} = \frac{5}{2}x^3 + Cx^5$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $y^{-5} = \frac{5}{2}x^3 + Cx^5$ ہے۔

مثال 2۔ حل کرو: $x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \log x$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x \frac{dy}{dx} + y = y^2 \log x$$

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{x} \right) y = \left(\frac{\log x}{x} \right) y^2 \quad \dots\dots\dots (1)$$

y^{-2} سے مساوات (1) کو ضرب دینے پر

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{x} \right) y^{-1} = \left(\frac{\log x}{x} \right) \quad \dots\dots\dots (2)$$

فرض کرو کہ $y^{-1} = z$ تب

$$-y^{-2} \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}$$

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} = -\frac{dz}{dx}$$

مساوات (2) سے

$$-\frac{dz}{dx} + \left(\frac{1}{x}\right)z = x^2$$

$$\frac{dz}{dx} - \left(\frac{1}{x}\right)z = \left(-\frac{\log x}{x}\right) \quad \dots\dots\dots (3)$$

یہاں $P = -\frac{1}{x}$ اور $Q = -\frac{\log x}{x}$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (3) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ze^{\int P dx} = \int [Q e^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس لیے

$$\begin{aligned} \int P dx &= -\int \left(\frac{1}{x}\right) dx \\ &= -\log x \\ &= \log x^{-1} \end{aligned}$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{\log x^{-1}} = \frac{1}{x}$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہو گا

$$\begin{aligned} z \frac{1}{x} &= \int \left[-\frac{\log x}{x} \cdot \frac{1}{x} \right] dx + C \\ &= -\int \frac{\log x}{x^2} dx + C \\ &= -\log x \int \frac{1}{x^2} dx + \int \left[\frac{d}{dx} (\log x) \int \frac{1}{x^2} dx \right] dx + C \\ z \frac{1}{x} &= \frac{1}{x} \log x + \int \left[\frac{d}{dx} (\log x) \int \frac{1}{x^2} dx \right] dx + C \\ \Rightarrow \quad \frac{z}{x} &= \frac{1}{x} \log x + \int \left[\frac{1}{x} \times \frac{-1}{x} \right] dx + C \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{z}{x} = \frac{1}{x} \log x - \int \frac{1}{x^2} dx + C$$

$$\Rightarrow \frac{1}{xy} = \frac{1}{x} \log x + \frac{1}{x} + C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $-\frac{1}{y} = \log x + 1 + Cx$ ہے۔

مثال 3- حل کرو: $\frac{dy}{dx} - xy = -e^{-x^2} y^3$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} - xy = -e^{-x^2} y^3 \quad \dots\dots\dots(1)$$

y^3 سے مساوات (1) کو تقسیم دینے پر

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} - xy^{-2} = -e^{-x^2} \quad \dots\dots\dots(2)$$

فرض کرو کہ $z = y^{-2}$ تب

$$-2y^{-3} \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}$$

$$y^{-3} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{-2} \frac{dz}{dx}$$

مساوات (2) سے

$$-\frac{1}{2} \frac{dz}{dx} - xz = -e^{-x^2}$$

$$\frac{dz}{dx} + 2xz = 2e^{-x^2} \quad \dots\dots\dots(3)$$

یہاں $P = 2x$ اور $Q = 2e^{-x^2}$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (3) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ze^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس لیے

$$\int P dx = \int 2x dx$$

$$= x^2$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{x^2}$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہوگا

$$ze^{x^2} = \int [2e^{-x^2} \cdot e^{x^2}] dx + C$$

$$= 2 \int 1 dx + C$$

$$= 2x + C$$

$$ze^{x^2} = 2x + C$$

⇒

$$z = e^{-x^2} (2x + C)$$

⇒

$$y^{-2} = e^{-x^2} (2x + C)$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $y^{-2} = e^{-x^2} (2x + C)$ ہے۔

مثال 4۔ حل کرو: $\frac{dy}{dx} = 2y \tan x + y^2 \tan^2 x$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} = 2y \tan x + y^2 \tan^2 x$$

$$\frac{dy}{dx} - (2 \tan x)y = (\tan^2 x)y^2 \quad \dots\dots\dots(1)$$

y^2 سے مساوات (1) کو تقسیم دینے پر

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} - (2 \tan x)y^{-1} = \tan^2 x \quad \dots\dots\dots(2)$$

فرض کرو کہ $y^{-1} = z$ تب

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} = \frac{dz}{dx}$$

مساوات (2) سے

$$\frac{dz}{dx} + (2 \tan x)z = \tan^2 x$$

$$\frac{dz}{dx} + 2xz = 2e^{-x^2} \quad \dots\dots\dots (3)$$

یہاں $P = 2 \tan x$ اور $Q = \tan^2 x$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (3) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ze^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس لیے

$$\begin{aligned} \int P dx &= \int 2 \tan x dx \\ &= \log \sec^2 x \end{aligned}$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{\log \sec^2 x} = \sec^2 x$$

اس طرح مساوات (1) کا حل ہوگا

$$z \sec^2 x = \int [\tan^2 x \cdot \sec^2 x] dx + C$$

اگر $\tan x = t$ ہو، تب $dt = \sec^2 x dx$ اس لیے

$$\begin{aligned} z \sec^2 x &= \int t^2 dt + C \\ &= \frac{t^3}{3} + C \end{aligned}$$

$$\Rightarrow z \sec^2 x = \frac{\tan^3 x}{3} + C$$

$$\Rightarrow -\frac{\sec^2 x}{y} = \frac{\tan^3 x}{3} + C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $C + \frac{\tan^3 x}{3} = \frac{\sec^2 x}{-y}$ ہے۔

مثال 5۔ حل کرو: $xye^x \log y + y \frac{dy}{dx} = 0$

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$xye^x \log y + y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} + \left(\frac{1}{x}\right) \log y = -e^x \quad (1) \dots\dots\dots$$

فرض کرو کہ $u = \log y$ تب

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$\frac{du}{dx} + \left(\frac{1}{x}\right) u = -e^x \quad (2) \dots\dots\dots$$

یہاں $P = \frac{1}{x}$ اور $Q = -e^x$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (2) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ue^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس لیے

$$\begin{aligned} \int P dx &= \int \frac{1}{x} dx \\ &= \log x \end{aligned}$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{\log x} = x$$

اس طرح دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$ux = \int [xe^x] dx + C$$

$$= (x - 1)e^x + C$$

$$\Rightarrow x \log y = (x - 1)e^x + C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $x \log y = (x - 1)e^x + C$ ہے۔

مثال 6- مساوات $y^2 \sin^2 x \cos^2 x + y \cot x = \frac{dy}{dx}$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + y \cot x = y^2 \sin^2 x \cos^2 x$$

$$\Rightarrow y^{-2} \frac{dy}{dx} + y^{-1} \cot x = \sin^2 x \cos^2 x \quad \dots\dots\dots(1)$$

فرض کرو کہ $u = y^{-1}$ تب

$$y^{-2} \frac{dy}{dx} = -\frac{du}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$-\frac{du}{dx} + u \cot x = \sin^2 x \cos^2 x$$

$$\frac{du}{dx} - u \cot x = -\sin^2 x \cos^2 x \quad \dots\dots\dots(2)$$

یہاں $P = -\cot x$ اور $Q = -\sin^2 x \cos^2 x$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (2) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ue^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس لیے

$$\int P dx = -\int \cot x dx$$

$$= -\log \sin x$$

اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{-\log \sin x} = \frac{1}{\sin x}$$

اس طرح دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$\begin{aligned} u \frac{1}{\sin x} &= \int \left[-\sin^2 x \cos^2 x \left(\frac{1}{\sin x} \right) \right] dx + C \\ &= \int [\cos^2 x (-\sin x)] dx + C \end{aligned}$$

اگر $\cos x = t$ ہو، تب $dt = -\sin x dx$ اس لیے

$$u \frac{1}{\sin x} = \int [t^2] dt + C$$

$$\frac{1}{y \sin x} = \frac{t^3}{3} + C$$

$$\frac{1}{y \sin x} = \frac{\cos^3 x}{3} + C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $\frac{1}{y \sin x} = \frac{\cos^3 x}{3} + C$ ہے۔

مثال 7۔ مساوات $x \sin 2y = x^3 \cos^2 y$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + x \sin 2y = x^3 \cos^2 y$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\cos^2 y} \frac{dy}{dx} + x \left(\frac{2 \sin y \cos y}{\cos^2 y} \right) = x^3$$

$$\Rightarrow \sec^2 y \frac{dy}{dx} + 2x(\tan y) = x^3 \quad \dots\dots\dots(1)$$

فرض کرو کہ $u = \tan y$ تب

$$\sec^2 y \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$\frac{du}{dx} + 2xu = x^3 \quad \dots\dots\dots (2)$$

یہاں $P = 2x$ اور $Q = x^3$ ہیں۔

چوں کہ مساوات (2) ایک خطی تفرقی مساوات ہے اس لیے اس کا حل ہے

$$ue^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$$

جہاں C ایک مستقل ہے۔ اس لیے

$$e^{\int P dx} = e^{\int 2x dx} = e^{x^2}$$

اس طرح دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$ue^{x^2} = \int [x^3(e^{x^2})] dx + C$$

اگر $x^2 = t$ ہو، تب $2x dx = dt$ اس لیے

$$ue^{x^2} = \frac{1}{2} \int [te^t] dt + C$$

$$\Rightarrow e^{x^2} \tan y = \frac{1}{2} (t - 1)e^t + C$$

$$\Rightarrow 2e^{x^2} \tan y = (x^2 - 1)e^{x^2} + C$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $2e^{x^2} \tan y = (x^2 - 1)e^{x^2} + C$ ہے۔

4.3 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

تفرقی مساوات

$\frac{dy}{dx} + Py = Q$ ، جہاں P اور Q کوئی دو مستقل یا x کے مسلسل تفاعل ہیں، پہلے رتبے اور پہلے درجے کی خطی تفرقی مساوات کہلاتی ہے اور اس کا عام حل (General Solution) $ye^{\int P dx} = \int [Qe^{\int P dx}] dx + C$ ہو گا۔ نیز $Py = Qy^n$ برنولی کی مساوات کہلاتی ہے جس کا حل اس مساوات کو خطی بنا کر حاصل کرتے ہیں۔

4.4 کلیدی الفاظ (Key Words)

خطی تفرقی مساوات، مسلسل تفاعل، برنولی کی مساوات

4.5 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

4.5.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. مساوات $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}$ کا I.F. ہے

A. x B. $\frac{1}{x}$ C. $-\frac{1}{x}$ D. ان میں سے کوئی نہیں

2. مساوات $x^2 \frac{dy}{dx} + y = 1$ کا عام حل ہے

A. $y = 1 + Ce^{\frac{1}{x}}$ B. $y = 1 + Ce^x$ C. $y = Ce^x$ D. ان میں سے کوئی نہیں

3. مساوات $(1 - x^2) \frac{dy}{dx} + xy = Cx$ کا I.F. ہے

A. $\frac{1}{x^2 - 1}$ B. $\frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}}$ C. $\frac{1}{1 - x^2}$ D. ان میں سے کوئی نہیں

4.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

حل کرو:

1. $(1 + x) \frac{dy}{dx} - xy = 1 - x$

2. $(1 - x^2) \frac{dy}{dx} + 2xy = x\sqrt{1 - x^2}$

3. $x^2 \frac{dy}{dx} + (x - 2)y = x^2 e^{\frac{-2}{x}}$

4. $\frac{dy}{dx} - \frac{2}{x}y = x + \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x^2}$

5. $x \log x \frac{dy}{dx} + y = 2 \log x$

6. تفرقی مساوات $(1 - x^2) \frac{dy}{dx} + xy = ax$ کو حل کرو۔

4.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. حل کرو: $\frac{dy}{dx} + \frac{3}{x}y = \frac{1}{x^2}$ جب کہ دیا گیا ہے $x = 1$ کے لیے $y = 2$ ہو گا۔

2. حل کرو: $\frac{dy}{dx} = 1 - x(y - x) - x^3(y - x)^3$

3. مساوات $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin x \cos x - \sin y \cos x}{\cos y}$ کا حل معلوم کرو۔

4. حل کرو: $\frac{dy}{dx} + xy = y^2 e^{\frac{x^2}{2}} \log x$

5. حل کرو: $\frac{dy}{dx} + y \cos x = y^n \sin 2x$

جوابات:

4.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

1. $(1 + x)y = x + Ce^x$

2. $y = \sqrt{1 - x^2} + C(1 - x^2)$

3. $xye^{\frac{x^2}{2}} = \frac{x^2}{2} + C$

4. $\frac{y}{x^2} = \log x + \frac{1}{2} \cos \frac{1}{x^2} + C$

5. $y \log x = (\log x)^2 + C$

6. $y = ax + Cx\sqrt{1 - x^2}$

4.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

1. $2x^3y = x^2 + 3$

2. $\frac{1}{(y-x)^2} + (1 + x^2) = Ce^{x^2}$

3. $e^{\sin x} \sin y = e^{\sin x} (\sin x - 1) + C$

4. $e^{-\frac{x^2}{2}} = xy(1 - \log x) + Cy$

5. $(1 - n)y^{1-n} = 2[(1 - n) \sin x - 1] + C(1 - n)e^{(n-1) \sin x}$

4.6 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhania, S.Chand & Company, New Delhi
3. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume -I, V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company New Delhi

اکائی 5۔ پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساواتیں

(p کے لیے حل کی جانے والی مساواتیں)

(Differential Equations of First Order and Higher Degree: Solvable for p)

اکائی کے اجزا

تمہید	5.0
مقاصد	5.1
p کے لیے حل کی جانے والی مساوات	5.2
اکتسابی نتائج	5.3
کلیدی الفاظ	5.4
نمونہ امتحانی سوالات	5.5
معروضی جوابات کے حامل سوالات	5.5.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	5.5.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	5.5.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	5.10

5.0 تمہید (Introduction)

پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی عام تفرقی مساوات درجہ ذیل شکل میں لکھی جاسکتی ہے

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^n + f_1(x, y) \left(\frac{dy}{dx}\right)^{n-1} + f_2(x, y) \left(\frac{dy}{dx}\right)^{n-2} + \cdots + f_{n-1}(x, y) \frac{dy}{dx} + f_n(x, y) = 0$$

اس طرح کی مساواتوں کا حل حاصل کرنے کے لیے ہم $\frac{dy}{dx}$ کو p سے ظاہر کریں گے۔

تمام تفرقی مساواتوں کو ان کی عام شکل میں حل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ مساواتوں کو p کے لیے حل کیا جاتا ہے اور پھر دی گئی مساوات کو دو یا زیادہ مساواتوں کی مدد سے تعبیر کرتے ہیں جن میں ہر ایک مساوات کا آرڈر (رتبہ) ایک ہوتا ہے۔ ان سبھی مساواتوں کو حل کرنے کے بعد دی ہوئی تفرقی مساوات کا حل معلوم کر لیتے ہیں۔

5.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے کے بعد آپ ان تفرقی مساوات کی معلومات حاصل کریں گے جو p کے لیے آسانی کے ساتھ حل ہو سکتی ہیں اور پھر ان کا حل حاصل کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔

5.3 p کے لیے حل کی جانے والی مساوات (Equations Solvable for p)

پہلے رتبے اور 'n' درجہ کی تفرقی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھا جاتا ہے۔

$$p^n + f_1(x, y)p^{n-1} + f_2(x, y)p^{n-2} + \dots + f_{n-1}(x, y)p + f_n(x, y) = 0 \quad \dots (1)$$

ہم اس مساوات کو p کے لیے حل کر سکتے ہیں۔ فرض کرو کہ مساوات (1) سے درجہ ذیل طریقے سے جزو معلوم کئے گئے ہیں۔

$$(p - \phi_1(x, y))(p - \phi_2(x, y)) \dots (p - \phi_n(x, y)) = 0 \quad \dots (2)$$

مساوات (2) کے ہر ایک جزو ضربی (Factor) کو صفر کے برابر رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سبھی مساواتیں پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساواتیں ہیں جن کو ہم پہلے بلاک میں دیے گئے طریقوں سے حل کر سکتے ہیں۔ مان لیجیے کہ ان کا حل درجہ ذیل ہے:

$$F_1(x, y, C_1) = 0, F_2(x, y, C_2) = 0, \dots, F_n(x, y, C_n) = 0 \quad \dots (3)$$

اس لیے مساوات (1) کے حل کو درجہ ذیل طریقے سے لکھا جاسکتا ہے۔

$$F_1(x, y, C_1) \cdot F_2(x, y, C_2) \dots F_n(x, y, C_n) = 0 \quad \dots (4)$$

تبصرہ (Remark): چونکہ مساوات (3) کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہر ایک خاص حل (Particular Solution) مساوات (4) کے ذریعے سے تمام C کی مناسب قیمت رکھ کر بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے $C_1, C_2, \dots, C_n$ کی جگہ ایک آر بٹیری کانسنٹنٹ C رکھنے پر حاصل حل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

اب ہم کچھ مثالوں کے ذریعے سے پورے طریقے کو سمجھیں گے۔

مثال 1۔ مساوات $p^2 - 5p + 6 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات کو درج ذیل شکل میں بدلنے پر

$$(p - 3)(p - 2) = 0$$

یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ

$$p - 3 = 0 \text{ یا } p - 2 = 0$$

اب اگر

$$p - 3 = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = 3$$

$$dy = 3dx$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y = 3x + c_1$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$p - 2 = 0$$

یا

$$dy = 2dx$$

اس کا تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y = 2x + c_2$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(y - 3x - c_1)(y - 2x - c_2) = 0$$

مثال 2۔ مساوات $p^2 - 9p + 18 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات کو درج ذیل شکل میں بدلنے پر

$$(p - 6)(p - 3) = 0$$

یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ

$$p - 3 = 0 \text{ یا } p - 6 = 0$$

اب اگر

$$p - 3 = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = 3$$

$$dy = 3dx$$

تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y = 3x + c_1$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$p - 6 = 0$$

یا

$$dy = 6dx$$

اس کا تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y = 6x + c_2$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(y - 3x - c_1)(y - 6x - c_2) = 0$$

مثال 3- مساوات $0 = x(y - 1) - p(x^2 - 1 - y) + xp^2$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات کو درج ذیل شکل میں بدلنے پر

$$(xp + y - 1)(p - x) = 0$$

یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ

$$xp + y - 1 = 0 \text{ یا } p - x = 0$$

اب اگر

$$p - x = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = x$$

$$dy = xdx$$

تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2y - x^2 - c_1 = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$xp + y - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y-1} = -\frac{dx}{x}$$

اس کا تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log(y-1) = -\log x + \log C_2$$

$$\Rightarrow \log(y-1) + \log x = \log C_2$$

$$\Rightarrow \log\{x(y-1)\} = \log C_2$$

$$\Rightarrow x(y-1) = C_2$$

$$\Rightarrow xy - x - C_2 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(2y - x^2 - c_1)(xy - x - c_2) = 0$$

مثال 4- مساوات $4y^2p^2 + 2xy(3x+1)p + 3x^3 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$4y^2p^2 + 2xy(3x+1)p + 3x^3 = 0$$

$$\Rightarrow 4y^2p^2 + 2pxy + 6px^2y + 3x^3 = 0$$

$$\Rightarrow 2py(2py + x) + 3x^2(2py + x) = 0$$

$$\Rightarrow (2py + x)(2py + 3x^2) = 0$$

اب

$$2py + 3x^2 = 0 \text{ یا } 2py + x = 0$$

اب اگر

$$2py + 3x^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2y \frac{dy}{dx} + 3x^2 = 0$$

$$\Rightarrow 2ydy + 3x^2dx = 0$$

تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y^2 + x^3 - c_1 = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$2py + x = 0$$

$$\Rightarrow 2ydy + xdx = 0$$

اس کا تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2y^2 + x^2 - c_2 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(y^2 + x^3 - c_1)(2y^2 + x^2 - c_2) = 0$$

مثال 5- مساوات $x^2p^2 - xyp - y^2 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x^2p^2 - xyp - y^2 = 0$$

$$\Rightarrow p = \frac{xy \pm \sqrt{x^2y^2 + 4x^2y^2}}{2x^2}$$

$$\Rightarrow p = \frac{xy \pm xy\sqrt{5}}{2x^2}$$

$$\Rightarrow p = \frac{xy(1 \pm \sqrt{5})}{2x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y(1 \pm \sqrt{5})}{2x}$$

$$\Rightarrow 2 \frac{dy}{y} = (1 \pm \sqrt{5}) \frac{dx}{x}$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2 \log y = (1 \pm \sqrt{5}) \log x + \log C$$

$$\Rightarrow \log y^2 = \log C x^{(1 \pm \sqrt{5})}$$

$$\Rightarrow y^2 = C x^{(1 \pm \sqrt{5})}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$y^2 = C x^{(1 \pm \sqrt{5})}$$

مثال 6- مساوات $0 = 2y^2 + 3xy \frac{dy}{dx} + x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 3xy \frac{dy}{dx} + 2y^2 = 0$$

دی گئی مساوات میں $p = \frac{dy}{dx}$ رکھنے پر درجہ ذیل شکل حاصل ہوتی ہے

$$x^2 p^2 + 3xyp + 2y^2 = 0$$

یا

$$(xp - y)(xp + 2y) = 0$$

یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ

$$xp + y = 0 \text{ یا } xp + 2y = 0$$

اب اگر

$$xp + 2y = 0$$

$$\Rightarrow x \frac{dy}{dx} = -2y$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} + 2 \frac{dx}{x} = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log y + 2 \log x = \log c_1$$

$$\Rightarrow x^2 y = c_1$$

$$\Rightarrow x^2 y - c_1 = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$xp + y = 0$$

$$\Rightarrow x \frac{dy}{dx} = -y$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0$$

اس کا تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log y + \log x = \log C_2$$

$$\Rightarrow \log xy = \log C_2$$

$$\Rightarrow xy = C_2$$

$$\Rightarrow xy - C_2 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(x^2 y - c_1)(xy - C_2) = 0$$

مثال 7۔ مساوات $p^2 + xp + py + xy = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$p^2 + xp + py + xy = 0$$

⇒

$$(p + x)(p + y) = 0$$

اب

$$p + x = 0 \text{ یا } p + y = 0$$

اب اگر

$$p + x = 0$$

⇒

$$\frac{dy}{dx} + x = 0$$

⇒

$$dy + xdx = 0$$

تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2y + x^2 - c_1 = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$p + y = 0$$

⇒

$$\frac{dy}{dx} + y = 0$$

⇒

$$\frac{dy}{y} + dx = 0$$

اس کا تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log y + x - c_2 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(2y + x^2 - c_1)(\log y + x - c_2) = 0$$

مثال 8۔ مساوات $p^2 + 2xp - 3x^2 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$p^2 + 2xp - 3x^2 = 0$$

$$\Rightarrow (p - x)(p + 3x) = 0$$

اب

$$p - x = 0 \text{ یا } p + 3x = 0$$

اب اگر

$$p - x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} - x = 0$$

$$\Rightarrow dy - xdx = 0$$

تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2y - x^2 - c_1 = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$p + 3x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} + 3x = 0$$

$$\Rightarrow dy + 3xdx = 0$$

اس کا تکامل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2y + 3x^2 - c_2 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(2y - x^2 - c_1)(2y + 3x^2 - c_2) = 0$$

مثال 9- مساوات $0 = x + (x - y) \frac{dy}{dx} + y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + (x - y) \frac{dy}{dx} - x = 0$$

دی گئی مساوات میں $p = \frac{dy}{dx}$ رکھنے پر درجہ ذیل شکل حاصل ہوتی ہے

$$yp^2 + (x - y)p - x = 0$$

یا

$$(yp + x)(p - 1) = 0$$

یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ

$$yp + x = 0 \text{ یا } p - 1 = 0$$

اب اگر

$$yp + x = 0$$

$$\Rightarrow y \frac{dy}{dx} + x = 0$$

$$\Rightarrow ydy + xdx = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y^2 + x^2 = c_1$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$p - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = 1$$

$$\Rightarrow dy = dx$$

اس کا تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y = x + c_2$$

$$\Rightarrow \log xy = \log c_2$$

$$\Rightarrow x - y + c_2 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(y^2 + x^2 - c_1)(x - y + c_2) = 0$$

مثال 10۔ مساوات $xyp^2 + (x + y)p + 1 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$xyp^2 + (x + y)p + 1 = 0$$

یا

$$(xp + 1)(yp + 1) = 0$$

یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ

$$xp + 1 = 0 \text{ یا } yp + 1 = 0$$

اب اگر

$$xp + 1 = 0$$

$$\Rightarrow x \frac{dy}{dx} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow dy + \frac{dx}{x} = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y + \log x - c_1 = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$yp + 1 = 0$$

$$\Rightarrow y \frac{dy}{dx} + 1 = 0$$

$$\Rightarrow ydy + dx = 0$$

اس کا تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y^2 + 2x - c_2 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(y + \log x - c_1)(y^2 + 2x - c_2) = 0$$

مثال 11۔ مساوات $p^2 - 2xp - 8x^2 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$p^2 - 2xp - 8x^2 = 0$$

یا

$$(p - 4x)(p + 2x) = 0$$

یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ

$$p - 4x = 0 \text{ یا } p + 2x = 0$$

اب اگر

$$p + 2x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} + 2x = 0$$

$$\Rightarrow dy + 2xdx = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y + x^2 - c_1 = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$p - 4x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} - 4x = 0$$

$$\Rightarrow dy - 4xdx = 0$$

اس کا تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y - 2x^2 - c_2 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$(y + x^2 - c_1)(y - 2x^2 - c_2) = 0$$

مثال 12۔ مساوات $x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2xy \frac{dy}{dx} - x^2 y^2 - x^4 + y^2 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x^2 \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2xy \frac{dy}{dx} - x^2 y^2 - x^4 + y^2 = 0$$

اس مساوات میں $p = \frac{dy}{dx}$ رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$x^2 p^2 - 2xyp - x^2 y^2 - x^4 + y^2 = 0$$

$$\Rightarrow p = \frac{2xy \pm \sqrt{4x^2 y^2 - 4x^2 (-x^2 y^2 - x^4 + y^2)}}{2x^2}$$

$$= \frac{2xy \pm \sqrt{4x^2 \{y^2 - (-x^2 y^2 - x^4 + y^2)\}}}{2x^2}$$

$$= \frac{2xy \pm \sqrt{4x^2 (x^2 y^2 + x^4)}}{2x^2}$$

$$= \frac{2xy \pm 2x^2 \sqrt{x^2 + y^2}}{2x^2}$$

$$\Rightarrow p = \frac{y \pm x \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y \pm x \sqrt{x^2 + y^2}}{x}$$

یہ ایک متجانس تفرقی مساوات (Homogenous Differential Equation) ہے۔ اس لیے یہاں $y = vx$ اور $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ رکھنے پر ہمیں ملتا ہے

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{vx \pm x \sqrt{x^2 + v^2 x^2}}{x}$$

$$\Rightarrow v + x \frac{dv}{dx} = v \pm x \sqrt{1 + v^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} = \pm \sqrt{1 + v^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{\sqrt{1 + v^2}} = \pm dx$$

اب اگر

$$\frac{dv}{\sqrt{1+v^2}} = dx$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\sinh^{-1} v = x + c_1$$

$$v = \frac{y}{x}$$

$$\sinh^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = x + c_1$$

$$\Rightarrow \frac{y}{x} = \sinh(x + c_1)$$

$$\Rightarrow y - x \sinh(x + c_1) = 0$$

اور اگر

$$\frac{dv}{\sqrt{1+v^2}} = -dx$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\sinh^{-1} v = -x + c_2$$

$$v = \frac{y}{x}$$

$$\sinh^{-1} \left(\frac{y}{x} \right) = -(x + c_2)$$

$$\Rightarrow \frac{y}{x} = \sinh\{-(x + c_2)\} = -\sinh(x + c_2)$$

$$\Rightarrow y + x \sinh(x + c_2) = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$[y - x \sinh(x + c_1)][y + x \sinh(x + c_2)] = 0$$

مثال 13۔ مساوات $p^2 - (2y \cot x)p - y^2 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$p^2 - (2y \cot x)p - y^2 = 0$$

$$\Rightarrow p = \frac{-2y \cot x \pm \sqrt{4y^2 \cot^2 x + 4y^2}}{2}$$

$$\Rightarrow p = -y \cot x \pm y \sqrt{\cot^2 x + 1}$$

$$\Rightarrow p = -y \cot x \pm y \operatorname{cosec} x$$

یا

$$p + y \cot x = \pm y \operatorname{cosec} x$$

اس لیے

$$(p + y \cot x - y \operatorname{cosec} x)(p + y \cot x + y \operatorname{cosec} x) = 0$$

یہ اس وقت ممکن ہے جب کہ

$$p + y \cot x - y \operatorname{cosec} x = 0 \text{ یا } p + y \cot x + y \operatorname{cosec} x = 0$$

اب اگر

$$p + y \cot x - y \operatorname{cosec} x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} + y(\cot x - \operatorname{cosec} x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} + (\cot x - \operatorname{cosec} x)dx = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = -(\cot x - \operatorname{cosec} x)dx$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = \left(\frac{1 - \cos x}{\sin x} \right) dx$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = \tan \frac{x}{2} dx$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log y = 2 \log \sec \left(\frac{x}{2} \right) + \log c_1$$

$$\Rightarrow \log y = \log c_1 \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

$$\Rightarrow y = c_1 \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

$$\Rightarrow y - c_1 \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right) = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$p + y \cot x + y \operatorname{cosec} x = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} + y(\cot x + \operatorname{cosec} x) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = -\cot \left(\frac{x}{2} \right) dx$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log y = -2 \log \sin \left(\frac{x}{2} \right) + \log c_2$$

$$= \log \operatorname{cosec}^2 \left(\frac{x}{2} \right) + \log c_2$$

$$\Rightarrow \log y = \log c_2 \operatorname{cosec}^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

$$\Rightarrow y = c_2 \operatorname{cosec}^2 \left(\frac{x}{2} \right)$$

$$\Rightarrow y - c_2 \operatorname{cosec}^2 \left(\frac{x}{2} \right) = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل ہوگا

$$\left(y - c_1 \sec^2 \left(\frac{x}{2} \right) \right) \left(y - c_2 \operatorname{cosec}^2 \left(\frac{x}{2} \right) \right) = 0$$

مثال 14۔ مساوات $x^2 p^2 - 2xyp + 2y^2 - x^2 = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x^2 p^2 - 2xyp + 2y^2 - x^2 = 0$$

$$\Rightarrow p = \frac{2xy \pm \sqrt{4y^2x^2 - 4x^2(2y^2 - x^2)}}{2x^2}$$

$$= \frac{2xy \pm 2x\sqrt{y^2 - 2y^2 + x^2}}{2x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y \pm \sqrt{x^2 - y^2}}{x}$$

جو کہ ایک متجانس تفرقی مساوات (Homogenous Differential Equation) ہے۔ اس طرح کی مساوات کو حل کرنے کے لیے $y = vx$

اور $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ رکھتے ہیں

$$v + x \frac{dv}{dx} = \frac{vx \pm \sqrt{x^2 - v^2x^2}}{x}$$

$$\Rightarrow v + x \frac{dv}{dx} = v \pm \sqrt{1 - v^2}$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} = \pm \sqrt{1 - v^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{\sqrt{1 - v^2}} = \pm \frac{dx}{x}$$

اب اگر

$$\frac{dv}{\sqrt{1 - v^2}} = \frac{dx}{x}$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\sin^{-1} v = \log x - \log c_1$$

$$\Rightarrow \sin^{-1} v = \log \frac{x}{c_1}$$

$$\Rightarrow x = c_1 e^{\sin^{-1} v}$$

$$v = \frac{y}{x}$$

$$x = c_1 e^{\sin^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)}$$

جو کہ دی گئی مساوات کا حل ہے۔

مثال 15۔ مساوات $p^2 + yp - x(x + y) = 0$ کو حل کیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\begin{aligned} p^2 + yp - x(x + y) &= 0 \\ \Rightarrow (p^2 - x^2) + y(p - x) &= 0 \\ \Rightarrow (p - x)(p + x) + y(p - x) &= 0 \\ \Rightarrow (p - x)(p + x + y) &= 0 \end{aligned}$$

اب

$$p - x = 0 \text{ یا } p + x + y = 0$$

اب اگر

$$\begin{aligned} p - x &= 0 \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} - x &= 0 \\ \Rightarrow dy - xdx &= 0 \end{aligned}$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2y - x^2 - c_1 = 0$$

اسی طرح دوسرے جزو سے

$$\begin{aligned} p + x + y &= 0 \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} + y &= -x \end{aligned}$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ ہے۔ اس لیے اب ہم اس مساوات کے لیے متکمل جزو ضربی (Integrating Factor) کو درجہ ذیل طریقہ سے حاصل کریں گے

$$I.F. = e^{\int dx} = e^x$$

اب خطی تفرقی مساوات کا حل ہوگا

$$y \cdot (I.F.) = \int (I.F.)Q dx + c_2$$

اس لیے

$$ye^x = \int e^x(-x) dx + c_2$$

$$\Rightarrow ye^x = e^x(1-x) + c_2$$

$$\Rightarrow y - (1-x) - c_2e^{-x} = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا حل $(2y - x^2 - c_1)(y + x - 1 + c_2e^{-x}) = 0$ ہے۔

5.3 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی میں ہم نے ان تفرقی مساوات کے بارے میں پڑھا جو p کے لیے آسانی سے حل کی جاسکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ان مساوات کو حل کرنے کا طریقہ سیکھا۔

5.4 کلیدی الفاظ (Key Words)

رتبہ، درجہ، متجانس تفرقی مساوات، خطی تفرقی مساوات، جزو ضربی

5.5 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

5.5.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. مساوات $p^2 - 5p + 6 = 0$ کو جزو ضربی میں تحویل کریے۔
2. مساوات $p^2 - 3p + 2 = 0$ کو جزو ضربی میں تحویل کریے۔
3. مساوات $p^3 - 6p^2 + 11p - 6 = 0$ کو جزو ضربی میں تحویل کریے۔
4. مساوات $2p^2 + p - 1 = 0$ کو جزو ضربی میں تحویل کریے۔

5.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

1. مساوات $p^2 + (2y \cot x)p - y^2 = 0$ کو حل کریے۔

$$2. \text{ مساوات } x^2p^3 + yp^2 + x^2y^2p^2 + y^3p = 0 \text{ کو حل کریے۔}$$

$$3. \text{ مساوات } x + yp^2 = p + xyp \text{ کو حل کریے۔}$$

$$4. \text{ مساوات } xp^2 + (y - x)p - y = 0 \text{ کو حل کریے۔}$$

$$5. \text{ مساوات } x^2p^2 + xyp - 6y^2 = 0 \text{ کو حل کریے۔}$$

5.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

$$1. \text{ مساوات } p^2 + (2 \cosh x)p + 1 = 0 \text{ کو حل کریے۔}$$

$$2. \text{ مساوات } xyp^2 - (x^2 - y^2)p - xy = 0 \text{ کو حل کریے۔}$$

$$3. \text{ مساوات } p^3 + 2xp^2 - y^2p^2 - 2xy^2p = 0 \text{ کو حل کریے۔}$$

$$4. \text{ مساوات } p^2 + (x - e^x)p - xe^x = 0 \text{ کو حل کریے۔}$$

$$5. \text{ مساوات } xyp^2 + (x^2 + xy + y^2)p + x^2 + xy = 0 \text{ کو حل کریے۔}$$

جوابات

5.5.1 معروضی سوالات کے جوابات

$$1. (p - 2)(p - 3) = 0$$

$$2. (p - 1)(p - 2) = 0$$

$$3. (p - 1)(p - 2)(p - 3) = 0$$

$$4. (p + 1)\left(p - \frac{1}{2}\right) = 0$$

5.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$1. y(1 \pm \cos x) = C$$

$$2. (y - c)(xy + cy)\left(y - ce^{\frac{1}{x}}\right) = 0$$

$$3. (2y - x^2 - c)(2x - y^2 - c) = 0$$

$$4. (y - x + c)(xy + c) = 0$$

$$5. (y - cx^2)(yx^3 - c) = 0$$

5.5.3 طویل سوالات کے جوابات

$$1. (y - e^x - c)(y + e^{-x} - c) = 0$$

$$2. (y^2 - x^2 - c)(xy - c) = 0$$

$$3. (y - c)(y + x^2 - c)(xy + cy + 1) = 0$$

$$4. (y - e^x + c)\left(y + \frac{x^2}{2} + c\right) = 0$$

$$(2xy + x^2 - c)(x^2 + y^2 - c) = 0 \quad .5$$

5.10 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Differential Calculus, K. Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations, Rai Singhanian, S. Chand & Co., New Delhi

اکائی 6۔ پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساوات (x اور y کے لیے حل کی جانے والی مساواتیں)

(First Order and Higher Degree Differential Equations: Solvable for x and y)

اکائی کے اجزاء

تمہید	6.0
مقاصد	6.1
x کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات	6.2
y کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات	6.3
مساوات جن میں x موجود نہ ہو	6.4
مساوات جن میں y موجود نہ ہو	6.5
مساوات جو x اور y میں متجانس ہو	6.6
اکتسابی نتائج	6.7
کلیدی الفاظ	6.8
نمونہ امتحانی سوالات	6.9
معروضی جوابات کے حامل سوالات	6.9.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	6.9.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	6.9.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	6.10

6.0 تمہید (Introduction)

اس اکائی میں ہم پہلے رتبے اور اعلیٰ درجہ کی تفرقی مساوات کے بارے میں پڑھیں گے۔ ان مساوات کو درجہ ذیل حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

1. x کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات
2. y کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات
3. مساوات جن میں x موجود نہ ہو
4. مساوات جن میں y موجود نہ ہو
5. مساوات جو x اور y میں متجانس ہو

6.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائیں گے کہ:

1. x کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات کو حل کر سکیں
2. y کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات کو حل کر سکیں
3. ان مساوات کو جن میں x موجود نہ ہو، حل کر سکیں
4. ان مساوات کو جن میں y موجود نہ ہو، حل کر سکیں
5. مساوات جو x اور y میں متجانس ہو، کو حل کر سکیں

6.2 x کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات (Differential Equations Solvable for x)

اگر کوئی مساوات x کے لیے حل ہو سکتی ہو، تب اسے درجہ ذیل شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے

$$x = f(y, p) \quad \dots\dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ y تفرق کرنے پر

$$\frac{1}{p} = \frac{df}{dy} + \frac{df}{dp} \frac{dp}{dy} = \varphi \left(y, p, \frac{dp}{dy} \right)$$

یہ مساوات دو متغیروں p اور y میں ایک تفرقی مساوات ہے۔ مان لیجیے کہ اس مساوات کا ممکنہ حل

$$F(y, p, c) = 0 \quad \text{.....(2)}$$

ہے۔

مساوات (1) اور (2) سے p کو ہٹا کر ضروری حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ:

1. یہ طریقہ ان تفرقی مساواتوں کے لیے ہی مفید ہے جن میں y پوری طرح سے موجود نہ ہو۔

2. اگر مساوات (1) اور (2) سے p کو آسانی کے ساتھ ہٹانا ممکن نہ ہو تب ضروری حل x اور y کو p کی رکن میں ظاہر کر کے

حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اب کچھ مثالوں کے ذریعہ سے ہم اوپر دیے گئے طریقہ کو سمجھیں گے۔

مثال 1- مساوات $x = y + p^2$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات ہے

$$x = y + p^2$$

اس مساوات کو y لحاظ y تفرق کرنے پر ہمیں ملتا ہے

$$\frac{1}{p} = 1 + 2p \frac{dp}{dy}$$

$$\Rightarrow dy = \frac{2p^2}{1-p} dp$$

$$\Rightarrow dy = -2 \left(1 + p + \frac{1}{p-1} \right) dp$$

اس مساوات کو دونوں طرف تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y = -2 \left[p + \frac{p^2}{2} + \log(p-1) \right] + c \quad \text{.....(1)}$$

جہاں c ایک تکملی مستقل ہے۔

ی کی اس قیمت کو دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$x = -2 \left[p + \frac{p^2}{2} + \log(p-1) \right] + c + p^2 \quad \dots(2)$$

مساوات (1) اور (2) دونوں سے ضروری حل دیتے ہیں۔

مثال 2- مساوات $y = (1+p)x + p^2$ کو حل کرو۔

حل - دی گئی مساوات ہے

$$y = (1+p)x + p^2$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$p = 1 + p + x \frac{dp}{dx} + 2p \frac{dp}{dx}$$

$\Rightarrow$

$$0 = 1 + (x + 2p) \frac{dp}{dx}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{dx}{dp} + x = -2p$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس لیے

$$I.F. = e^{\int dp} = e^p$$

اب اوپر حاصل کردہ خطی تفرقی مساوات کا حل ہوگا

$$x(e^p) = \int e^p(-2p) dp + c$$

$\Rightarrow$

$$x(e^p) = 2e^p(1-p) + c$$

$$x = 2(1-p) + ce^{-p} \quad \dots(1)$$

جہاں c ایک تکمیلی مستقل ہے۔

x کی اس قیمت کو دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$y = (1+p)(2(1-p) + ce^{-p}) + p^2$$

$$y = c(1+p)e^{-p} + 2 - p^2 \quad \dots(2)$$

مساوات (1) اور (2) دونوں مل کر ضروری عام حل دیتے ہیں۔

مثال 3- مساوات $x = py + ap^2$ کو حل کرو۔

حل - دی گئی مساوات ہے

$$x = py + ap^2$$

اس مساوات کو بہ لحاظ y تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} \frac{1}{p} &= p + y \frac{dp}{dy} + 2ap \frac{dp}{dy} \\ \Rightarrow \frac{1}{p} - p &= (y + 2ap) \frac{dp}{dy} \\ \Rightarrow \frac{1 - p^2}{p} &= (y + 2ap) \frac{dp}{dy} \\ \Rightarrow \frac{p}{1 - p^2} &= \left(\frac{1}{y + 2ap} \right) \frac{dy}{dp} \end{aligned}$$

یا

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dp} &= \frac{py + 2ap^2}{1 - p^2} = \left(\frac{p}{1 - p^2} \right) y + \frac{2ap^2}{1 - p^2} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dp} - \left(\frac{p}{1 - p^2} \right) y &= \frac{2ap^2}{1 - p^2} \end{aligned}$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس لیے

$$I.F. = e^{-\int \left(\frac{p}{1-p^2} \right) dp}$$

اب پہلے ہم $\int \left(\frac{p}{1-p^2} \right) dp$ کی قیمت حاصل کریں گے۔

مان لو کہ $1 - p^2 = m$ تب $-2p dp = dm$ اس لیے

$$\begin{aligned} \int \left(\frac{p}{1-p^2} \right) dp &= -\frac{1}{2} \int \left(\frac{1}{m} \right) dm \\ &= -\frac{1}{2} \log m \end{aligned}$$

اس لیے

$$\int \left(\frac{p}{1-p^2} \right) dp = -\log(1 - p^2)^{\frac{1}{2}}$$

اب

$$\begin{aligned} I.F. &= e^{-\int \left(\frac{p}{1-p^2} \right) dp} = e^{\log(1-p^2)^{\frac{1}{2}}} \\ &= e^{\log(1-p^2)^{\frac{1}{2}}} \\ \Rightarrow I.F. &= (1 - p^2)^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

اس لیے مندرجہ بالا حاصل کردہ خطی تفرقی مساوات کا حل ہوگا

$$\begin{aligned}
y(1-p^2)^{\frac{1}{2}} &= \int (1-p^2)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{2ap^2}{1-p^2} \right) dp + c \\
\Rightarrow y(1-p^2)^{\frac{1}{2}} &= \int \frac{2ap^2}{(1-p^2)^{\frac{1}{2}}} dp + c \\
&= 2a \int \frac{1-(1-p^2)}{(1-p^2)^{\frac{1}{2}}} dp + c \\
&= 2a \int \left[\frac{1}{\sqrt{1-p^2}} - \frac{(1-p^2)}{\sqrt{1-p^2}} \right] dp + c \\
&= 2a \int \left[\frac{1}{\sqrt{1-p^2}} - \sqrt{1-p^2} \right] dp + c \\
&= 2a \left[\sin^{-1} p - \left\{ \frac{p}{2} \sqrt{1-p^2} + \frac{1}{2} \sin^{-1} p \right\} \right] + c \\
&\text{جہاں } c \text{ ایک تکملی مستقل ہے۔}
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow y\sqrt{1-p^2} = a \sin^{-1} p - ap\sqrt{1-p^2} + c$$

اس لیے

$$y = \frac{a \sin^{-1} p + c}{\sqrt{1-p^2}} - ap \quad \dots(1)$$

دی گئی مساوات میں y کی یہ قیمت رکھنے پر

$$\begin{aligned}
x &= p \left[\frac{a \sin^{-1} p + c}{\sqrt{1-p^2}} - ap \right] + ap^2 \\
\Rightarrow x &= \frac{p}{\sqrt{1-p^2}} (a \sin^{-1} p + c) \quad \dots(2)
\end{aligned}$$

جہاں c ایک تکملی مستقل ہے۔

مساوات (1) اور (2) سے دی گئی مساوات کا عام حل حاصل ہو گا۔

6.3 y کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات (Differential Equations Solvable for y)

اگر کوئی تفرقی مساوات y کے لیے آسانی کے ساتھ حل کی جاسکتی ہو، تب اسے درجہ ذیل شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے

$$y = f(x, p) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر

$$\frac{dy}{dx} = p = \frac{df}{dx} + \frac{df}{dp} \frac{dp}{dx} = \varphi \left(x, p, \frac{dp}{dx} \right)$$

یہ مساوات دو متغیروں p اور x میں ایک تفرقی مساوات ہے۔ مان لیجیے کہ اس کا ممکنہ حل

$$F(x, p, c) = 0 \quad \text{.....(2)}$$

ہے۔

اب مساوات (1) اور (2) سے p کو حذف کر کے ہمیں دی گئی مساوات کا عام حل حاصل ہو جائیے گا۔

نوٹ:

1. یہ طریقہ خاص طور پر ان تفرقی مساواتوں کے لیے مفید ہے جن میں x پوری طرح سے موجود نہ ہو۔

2. اگر مساوات (1) اور (2) سے p کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو ضروری حل x اور y کو p کی رکن میں ظاہر کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔

اب کچھ مثالوں سے ہم اوپر دیے گئے طریقہ کو سمجھتے ہیں۔

مثال 1- مساوات $y = -px + x^4 p^2$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات ہے

$$y = -px + x^4 p^2$$

اس مساوات کو x لحاظ تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{dy}{dx} = p = -p - x \frac{dp}{dx} + 2x^4 p \frac{dp}{dx} + 4x^3 p^2$$

$$-2p - x \frac{dp}{dx} + 2x^4 p \frac{dp}{dx} + 4x^3 p^2 = 0$$

$$-\left(2p + x \frac{dp}{dx}\right) + 2x^3 p \left(2p + x \frac{dp}{dx}\right) = 0$$

$$(2x^3 p - 1) \left(2p + x \frac{dp}{dx}\right) = 0$$

اب

$$2p + x \frac{dp}{dx} = 0$$

$$2 \frac{dx}{x} + \frac{dp}{p} = 0$$

$\Rightarrow$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} 2 \log x + \log p &= \log c \\ \Rightarrow p x^2 &= c \\ \Rightarrow p &= \frac{c}{x^2} \end{aligned}$$

p کی یہ قیمت دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$\begin{aligned} y &= -\left(\frac{c}{x^2}\right)x + x^4 \left(\frac{c}{x^2}\right)^2 \\ \Rightarrow y &= c^2 - \left(\frac{c}{x}\right) \end{aligned}$$

جو کہ دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

مثال 2- مساوات $y = x + p^2$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات ہے

$$y = x + p^2$$

اس مساوات کو p کے لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} p &= 1 + 2p \frac{dp}{dx} \\ \Rightarrow \frac{p-1}{2p} &= \frac{dp}{dx} \\ \Rightarrow \frac{2p}{p-1} dp &= dx \\ \Rightarrow \left(2 + \frac{2}{p-1}\right) dp &= dx \end{aligned}$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2p + 2 \log(p-1) + c = x$$

x کی یہ قیمت دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$\begin{aligned} y &= 2p + 2 \log(p-1) + c + p^2 \\ \Rightarrow y &= p^2 + 2p + 2 \log(p-1) + c \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل $x = 2p + 2 \log(p-1) + c$, $y = p^2 + 2p + 2 \log(p-1) + c$ ہے۔

مثال 3- مساوات $y = p \sin p + \cos p$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات ہے

$$y = p \sin p + \cos p$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$p = p \cos p \frac{dp}{dx} + \frac{dp}{dx} \sin p - \sin p \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow 1 = \cos p \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow dx = \cos p dp$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$x = \sin p + c$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل $x = \sin p + c, y = p \sin p + \cos p$ ہے۔

مثال 4- مساوات $y = A + Bp + Cp^2$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات ہے

$$y = A + Bp + Cp^2$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$p = B \frac{dp}{dx} + 2Cp \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow p = (B + 2Cp) \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow dx = \frac{(B + 2Cp)}{p} dp$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$x = B \log p + 2Cp + c$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل $x = B \log p + 2Cp + c, y = A + Bp + Cp^2$ ہے۔

مثال 5- مساوات $y = p \tan p + \log \cos p$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات ہے

$$y = p \tan p + \log \cos p$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$p = p \sec^2 p \frac{dp}{dx} + \frac{dp}{dx} \tan p - \frac{\sin p}{\cos p} \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow p = p \sec^2 p \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow dx = \sec^2 p dp$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$x = \tan p + c$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل $x = \tan p + c$, $y = p \tan p + \log \cos p$ ہے۔

6.4 مساوات جن میں x موجود نہ ہو (Equations not Containing x)

اگر کسی تفرقی مساوات میں x موجود نہ ہو تب مان لو کہ وہ درجہ ذیل شکل کا ہو گا

$$\varphi(y, p) = 0$$

اگر یہ مساوات y کے لیے حل کی جاسکتی ہو تب وہ درجہ ذیل شکل میں تبدیل کی جاسکتی ہے

$$y = \phi(p)$$

اس طرح کی مساوات کو پچھلے حصہ میں ذکر کیے گئے طریقہ سے حل کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح حل کرنا ممکن نہ ہو تب اس مساوات کو درجہ ذیل شکل میں تبدیل کر کے حل کرتے ہیں

$$p = f(y)$$

اس مساوات کو تکمل کرنے پر ہمیں ضروری عام حل حاصل ہو جاتا ہے۔

اب ہم کچھ مثالوں کے ذریعہ اوپر بتائیے گئے طریقہ کو سمجھیں گے۔

مثال 1- مساوات $y = 2p + 3p^2$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات ہے

$$y = 2p + 3p^2$$

اس مساوات کو p لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$p = 2 \frac{dp}{dx} + 6p \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow p = (2 + 6p) \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow dx = \frac{(2 + 6p)}{p} dp$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$x = 2 \log p + 6p + c$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل $x = 2 \log p + 6p + c$, $y = 2p + 3p^2$ ہے۔

مثال 2- مساوات $y = p - \log(p^2 - 1)$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات ہے

$$y = p - \log(p^2 - 1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$p = \frac{dp}{dx} - \frac{2p}{p^2 - 1} \frac{dp}{dx}$$

$\Rightarrow$

$$p = \left(1 - \frac{2p}{p^2 - 1}\right) \frac{dp}{dx}$$

$\Rightarrow$

$$dx = \left(\frac{1}{p} - \frac{2}{p^2 - 1}\right) dp$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$x = \log p + \log\left(\frac{p+1}{p-1}\right) + c$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل $x = \log p + \log\left(\frac{p+1}{p-1}\right) + c$, $y = p - \log(p^2 - 1)$ ہے۔

6.5 مساوات جن میں y موجود نہ ہو (Equations not Containing y)

اگر کسی تفرقی مساوات میں y موجود نہ ہو تب مان لیجیے کہ وہ درجہ ذیل شکل کی ہوگی

$$\varphi(x, p) = 0$$

اگر یہ مساوات x کے لیے حل کی جاسکتی ہو تب وہ درجہ ذیل شکل میں تبدیل کی جاسکتی ہے

$$x = \phi(p)$$

اس طرح کی مساوات کو پچھلے حصہ میں ذکر کیے گئے طریقہ سے حل کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس طرح حل کرنا ممکن نہ ہو تب اس مساوات کو درجہ ذیل شکل میں تبدیل کر کے حل کرتے ہیں

$$p = f(x)$$

اس مساوات کو تکمل کرنے پر ہمیں ضروری عام حل حاصل ہو جاتا ہے۔

اب ہم ایک مثال کی مدد سے اوپر بتائیے گئے طریقہ کو سمجھیں گے۔

مثال 1- مساوات $x(1 + p^2) = 1$ کو حل کرو۔

حل- دی گئی مساوات کو ہم درجہ ذیل شکل میں لکھ سکتے ہیں

$$x = \frac{1}{1 + p^2}$$

اس مساوات کو بہ لحاظ y تفریق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{p} = -\frac{2p}{(1 + p^2)^2} \times \frac{dp}{dy}$$

$\Rightarrow$

$$dy = -\frac{2p^2}{(1 + p^2)^2} dp$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y = c - \int \frac{2p^2}{(1 + p^2)^2} dp$$

مان لو کہ $p = \tan t$ ، تب $dp = \sec^2 t dt$ ، اس لیے

$$y = c - \int \frac{2\tan^2 t}{(1 + \tan^2 t)^2} \sec^2 t dt$$

$$= c - 2 \int \frac{\tan^2 t}{(\sec^2 t)^2} \sec^2 t dt$$

$$= c - 2 \int \frac{\tan^2 t}{\sec^2 t} dt$$

$$= c - \int 2\sin^2 t dt$$

$$= c - \int (1 - \cos 2t) dt$$

$\Rightarrow$

$$y = c - t + \frac{\sin 2t}{2}$$

اور پھر $t = \tan^{-1} p$ رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y = c - \tan^{-1} p + \frac{p}{1 + p^2}$$

دی گئی تفریق مساوات کا عام حل $y = c - \tan^{-1} p + \frac{p}{1 + p^2}$ ، $x = \frac{1}{1 + p^2}$ ہے۔

6.6 مساوات جو x اور y میں ہو متجانس ہو (Equations Homogeneous in x and y)

اگر کسی تفرقی مساوات میں x اور y ہو متجانس ہوں، تب مان لیجیے کہ دی گئی مساوات درجہ ذیل شکل کی ہوگی

$$\phi\left(\frac{y}{x}, p\right) = 0$$

اب اگر یہ مساوات p کے لیے حل کی جاسکتی ہو تب اسے درجہ ذیل شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے

$$p = \phi\left(\frac{y}{x}\right)$$

اس طرح کی مساوات کو آسانی کے ساتھ مکمل کر کے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر یہ مساوات $\frac{y}{x}$ کے لیے حل کی جاسکتی ہو تب اسے درجہ ذیل شکل میں تبدیل کیا جاسکتا ہے

$$y = xf(p)$$

اس طرح کی مساوات کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرتے ہیں۔ اس لیے

$$p = xf'(p) \frac{dp}{dx} + f(p)$$

$$\Rightarrow \frac{p - f(p)}{xf'(p)} = \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{f'(p)}{p - f(p)} dp$$

اس مساوات کو آسانی کے ساتھ مکمل کر کے دی گئی مساوات کا حل حاصل کر لیتے ہیں۔

اب ہم ایک مثال کی مدد سے اوپر بتائیے گئے طریقہ کو سمجھیں گے۔

مثال 1- مساوات $xyp^2 + p(3x^2 - 2y^2) - 6xy = 0$ کو حل کرو۔

حل - دی گئی مساوات ہے

$$xyp^2 + p(3x^2 - 2y^2) - 6xy = 0$$

$$\Rightarrow xp yp + 3x^2 - 2y^2 yp + 3x^2 - 6xy = 0$$

$$\Rightarrow (xp - 2y)(yp + 3x) = 0$$

اب اگر

$$yp + 3x = 0$$

$$p = \frac{dy}{dx} = -3 \left(\frac{x}{y} \right)$$

⇒

$$ydy + 3xdx = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{y^2}{2} + 3 \frac{x^2}{2} = \frac{A}{2}$$

⇒

$$y^2 + 3x^2 = A$$

اسی طرح

$$xp - 2y = 0$$

⇒

$$p = \frac{dy}{dx} = 2 \left(\frac{y}{x} \right)$$

⇒

$$\frac{dy}{y} = 2 \left(\frac{dx}{x} \right)$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log y = 2 \log x + \log B$$

⇒

$$y = Bx^2$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل $0 = (y^2 + 3x^2 - A)(y - Bx^2)$ ہے۔

6.7 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی میں طالب علم نے درجہ ذیل صورتوں والی تفرقی مساوات کو حل کرنا سیکھا:

1. x کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات
2. y کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساوات
3. وہ تفرقی مساوات جن میں x موجود نہ ہو
4. وہ تفرقی مساوات جن میں x موجود نہ ہو
5. وہ تفرقی مساوات جو x اور y میں ہو متجانس ہوں

6.8 کلیدی الفاظ (Key Words)

رطبہ، درجہ، تکملی مستقل، متجانس تفرقی مساوات

6.9 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

6.9.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. تفرقی مساوات $x = a \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + y \frac{dy}{dx}$ کا رتبہ ہے
 (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
2. تفرقی مساوات $y = x^4 \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - x \frac{dy}{dx}$ کا درجہ ہے
 (a) 0 (b) 1 (c) 2 (d) 3
3. تفرقی مساوات $y = p \tan p + \log \cos p$ کا رتبہ اور درجہ ہے
 (a) 0, 0 (b) 1, 1 (c) 2, 2 (d) ان میں سے کوئی نہیں

6.9.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

درجہ ذیل تفرقی مساوات کو حل کریے:

$$y = \sin p - p \cos p \quad .1$$

$$y = \frac{xp^2 + 9x^2}{3p} \quad .2$$

$$y = ap^2 + bp^3 \quad .3$$

$$p^3 + p = e^y \quad .4$$

$$y = 3px + 4p^2 \quad .5$$

$$y = \frac{x}{p} - Ap \quad .6$$

$$y = p \log p \quad .7$$

$$y = xp^2 + p \quad .8$$

$$p^2 - 1 = e^{p-y} \quad .9$$

$$y = p(1 + p \cos p) \quad .10$$

6.9.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

درجہ ذیل تفرقی مساوات کو حل کریے:

$$y^2 \log y = xyp + p^2, y > 0 \quad .1$$

$$xp^3 - p^2 - 1 = 0 \quad .2$$

$$y = 3px + x^2p^2 \quad .3$$

$$p^3 + x = p(y + 3) \quad .4$$

جوابات:

6.9.1 معروضی سوالات کے جوابات

b .1

c .2

b .3

6.9.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$\cos\left[\frac{\sqrt{1-c^2+2cx-x^2}-y}{c-x}\right] = (c-x) \quad .1$$

$$3cy = c^2x^3 + 9 \quad .2$$

$$x = 2ap + \frac{3}{2}bp^2, y = ap^2 + bp^3 \quad .3$$

$$x = 2\tan^{-1}p - \frac{1}{p}, y = \log(p^3 + p) \quad .4$$

$$x = -\frac{8}{5}p + cp^{-3/2}, y = 3cp^{-1/2} - \frac{4}{5}p^2 \quad .5$$

$$x = \frac{p}{\sqrt{1-p^2}}(c + A\sin^{-1}p), y = \frac{1}{\sqrt{1-p^2}}(c + A\sin^{-1}p) - Ap \quad .6$$

$$x = \frac{1}{2}(\log p + 1)^2 + c, y = p \log p \quad .7$$

$$x = (p-1)^{-1}(\log p - p + c), y = xp^2 + p \quad .8$$

$$x = \log \frac{p+1}{p-1} + \log p + c, y = p - \log(p^2 - 1) \quad .9$$

$$x = \log p + \sin p + p \cos p + c, y = p + p^2 \cos p \quad .10$$

6.9.3 طویل سوالات کے جوابات

$$\log y = cx + c^2 \quad .1$$

$$x = \frac{1}{p} + \frac{1}{p^3}, y = \frac{2}{3p^2} - \log p + c \quad .2$$

$$y^3 = 3cx + c^2 \quad .3$$

$$p^3 - p(y+3) + x = 0, y(1-p^2)^{1/2} + (1-p^2)^{3/2} = c \quad .4$$

6.10 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhania, S.Chand & Co., New Delhi

اکائی 7۔ پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساواتیں (لگرانج اور کلیرو کی مساواتیں)

(Differential Equations of First Order and Higher Degree: Lagrange and Clairaut's Equations)

اکائی کے اجزا

تمہید	7.0
مقاصد	7.1
لگرانج کی مساوات	7.2
کلیرو کی مساوات	7.3
کلیرو کی شکل میں تبدیل کی جانے والی مساواتیں	7.3.1
اکتسابی نتائج	7.4
کلیدی الفاظ	7.5
نمونہ امتحانی سوالات	7.6
معروضی جوابات کے حامل سوالات	7.6.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	7.6.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	7.6.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	7.7

7.0 تمہید (Introduction)

پچھلی اکائی کے نصاب میں ہم پہلے رتبے اور اعلیٰ درجے کی تفرقی مساوات (Differential Equations) میں p کے لیے x کے لیے اور y کے لیے حل کی جانے والی تفرقی مساواتوں کی جانکاری حاصل کر چکے ہیں۔ اس اکائی میں ہم دو خاص شکل کی تفرقی مساواتوں جو کہ

لگرانج اور کلیرو کے نام سے متعارف ہیں، کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور پھر ان کا حل حاصل کرنے کے طریقوں کو بھی سمجھیں گے۔

7.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دی گئی لگرانج اور کلیرو کی تفرقی مساوات کو پہچان کر اس کا حل حاصل کر سکیں۔ نیز ایسی مساوات جو کلیرو کی شکل میں تبدیل کی جاسکتی ہیں ان کا حل بھی حاصل کر سکیں گے۔

7.2 لگرانج کی مساوات (Lagrange's Equation)

تعریف: وہ تفرقی مساوات جسے درجہ ذیل شکل میں لکھا جاسکتا ہو

$$y = x\phi(p) + \psi(p) \quad \dots(1)$$

لگرانج مساوات کہلاتی ہے۔

اس مساوات کو حل کرنے کے لیے اس کو بہ لحاظ x تفرق کرتے ہیں۔ جس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= p = x \frac{d}{dx} \phi(p) + \phi(p) + \frac{d}{dx} \psi(p) \frac{dp}{dx} \\ \Rightarrow p - \phi(p) &= \left[x \frac{d}{dx} \phi(p) + \frac{d}{dx} \psi(p) \right] \frac{dp}{dx} \\ \Rightarrow \frac{dp}{dx} &= \frac{p - \phi(p)}{x \frac{d}{dx} \phi(p) + \frac{d}{dx} \psi(p)} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dp} &= \frac{x \frac{d}{dx} \phi(p) + \frac{d}{dx} \psi(p)}{p - \phi(p)} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dp} - \frac{x \frac{d}{dx} \phi(p)}{p - \phi(p)} &= \frac{\frac{d}{dx} \psi(p)}{p - \phi(p)} \end{aligned}$$

یہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کو حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$x = f(p, c)$$

اس لیے مساوات (1) کا عام حل پیرامٹرک شکل میں درجہ ذیل ہو گا

$$x = f(p, c), y = f(p, c)\phi(p) + \psi(p)$$

جہاں p ایک پیرامیٹر ہے۔

مثالیں۔ درجہ ذیل مساوات کو حل کیجیے:

$$y = xp^2 - \frac{1}{p} \quad (a)$$

$$y = axp + bp^3 \quad (b)$$

$$y = xp^2 + p^4 \quad (c)$$

$$y = 2xp + p^n \quad (d)$$

حل۔

(a) دی گئی مساوات ہے

$$y = xp^2 - \frac{1}{p} \quad \dots(1)$$

یہ لگراج مساوات ہے۔

اس مساوات کو حل کرنے کے لیے اس کو بہ لحاظ x تفرق کرتے ہیں۔ جس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{dy}{dx} = p = x \frac{d}{dx}(p^2) \frac{dp}{dx} + p^2 - \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{p}\right) \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow p - p^2 = 2px \frac{dp}{dx} - \left(\frac{-1}{p^2}\right) \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow p - p^2 = \left(2px + \frac{1}{p^2}\right) \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{p - p^2}{2px + \frac{1}{p^2}} = \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dp} = \frac{2p^3x + 1}{p^3(1 - p)}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dp} = \frac{2x}{(1 - p)} + \frac{1}{p^3(1 - p)}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dp} - \frac{2x}{(1 - p)} = \frac{1}{p^3(1 - p)}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dp} + \frac{2x}{(p - 1)} = \frac{1}{p^3(1 - p)}$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کا حل حاصل کرنے کے لیے ہم مکملی جزو I.F. (Integrating Factor) حاصل کرتے ہیں، تب ہم

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل طریقہ سے حاصل کریں گے

$$x(I.F.) = \int Q(I.F.) dp + c$$

$$\text{جہاں } P = \frac{2}{(p-1)} \text{ اور } Q = \frac{1}{p^3(1-p)} \text{ ہے۔}$$

اس لیے

$$I.F. = e^{\int P dp} = e^{\int \left(\frac{2}{(p-1)}\right) dp} = e^{\log(p-1)^2} = (p-1)^2$$

اب دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$\begin{aligned}
x(p-1)^2 &= \int \frac{1}{p^3(1-p)} \times (p-1)^2 dp + c \\
\Rightarrow x(p-1)^2 &= \int \frac{p-1}{-p^3} dp + c \\
\Rightarrow x(p-1)^2 &= \int \frac{1}{-p^2} + \frac{1}{p^3} dp + c \\
\Rightarrow x(p-1)^2 &= \frac{1}{p} - \frac{1}{2p^2} + c \\
\Rightarrow x &= \frac{1}{(p-1)^2} \left\{ \frac{1}{p} - \frac{1}{2p^2} + c \right\}
\end{aligned}$$

مساوات (1) سے

$$y = \frac{p^2}{(p-1)^2} \left\{ \frac{1}{p} - \frac{1}{2p^2} + c \right\} - \frac{1}{p}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہو گا

$$x = \frac{1}{(p-1)^2} \left\{ \frac{1}{p} - \frac{1}{2p^2} + c \right\}, y = \frac{p^2}{(p-1)^2} \left\{ \frac{1}{p} - \frac{1}{2p^2} + c \right\} - \frac{1}{p}$$

(b) دی گئی مساوات ہے

$$y = axp + bp^3 \quad \dots(1)$$

یہ لگرائج مساوات ہے۔

مساوات (1) کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= p = a \left(x \frac{dp}{dx} \right) + ap + b(3p^2) \frac{dp}{dx} \\
\Rightarrow p - ap &= (ax + 3bp^2) \frac{dp}{dx} \\
\Rightarrow \frac{dp}{dx} &= \frac{p - ap}{ax + 3bp^2} \\
\Rightarrow \frac{dp}{dx} &= \frac{p - ap}{ax + 3bp^2} \\
\Rightarrow \frac{dp}{dx} &= \frac{p - ap}{ax} \\
\Rightarrow \frac{dp}{dx} &= \frac{p(1-a)}{ax} + \frac{3bp}{(1-a)} \\
\Rightarrow \frac{dx}{dp} - \frac{ax}{p(1-a)} &= \frac{3bp}{(1-a)}
\end{aligned}$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے، جہاں $P = -\frac{a}{p(1-a)}$ اور $Q = \frac{3bp}{(1-a)}$ ہے۔ اب ہم دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل طریقہ سے حاصل کریں گے

$$x(I.F.) = \int Q(I.F.) dp + c$$

اس لیے

$$I.F. = e^{\int P dp} = e^{\int \left(\frac{-a}{p(1-a)}\right) dp} = e^{\log(p)^{\frac{-a}{(1-a)}}} = (p)^{\frac{a}{(a-1)}}$$

اب دی گئی مساوات کا حل ہوگا

$$\begin{aligned} x(p)^{\frac{a}{(a-1)}} &= \int \frac{3bp}{(1-a)} \times (p)^{\frac{a}{(a-1)}} dp + c \\ \Rightarrow x(p)^{\frac{a}{(a-1)}} &= \frac{3b}{(1-a)} \int (p)^{\frac{a}{(a-1)}+1} dp + c \\ \Rightarrow x(p)^{\frac{a}{(a-1)}} &= \frac{3b}{(1-a)} \frac{(p)^{\frac{a}{(a-1)}+2}}{\frac{a}{(a-1)}+2} + c \\ \Rightarrow x(p)^{\frac{a}{(a-1)}} &= \frac{3b}{2-3a} (p)^{\frac{a}{(a-1)}+2} + c \\ \Rightarrow x &= \frac{3b}{2-3a} (p)^{\frac{a}{(a-1)}-\frac{a}{(a-1)}+2} + c(p)^{\frac{-a}{(a-1)}} \\ \Rightarrow x &= \frac{3b}{2-3a} (p)^2 + c(p)^{\frac{a}{(1-a)}} \end{aligned}$$

مساوات (1) سے

$$\begin{aligned} y &= ap \left\{ \frac{3bp^2}{2-3a} + c(p)^{\frac{a}{(1-a)}} \right\} + bp^3 \\ \Rightarrow y &= \frac{3abp^3}{2-3a} + c(p)^{\frac{1}{(1-a)}} + bp^3 \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = \frac{3b}{2-3a} (p)^2 + c(p)^{\frac{a}{(1-a)}}, y = \frac{3abp^3}{2-3a} + c(p)^{\frac{1}{(1-a)}} + bp^3$$

(c) دی گئی مساوات ہے

$$y = xp^2 + p^4$$

.....(1)

یہ لگرائج مساوات ہے۔

اس مساوات کو حل کرنے کے لیے بہ لحاظ x تفرق کرتے ہیں۔ جس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} = p &= 2px \frac{dp}{dx} + p^2 + 4p^3 \frac{dp}{dx} \\ \Rightarrow p - p^2 &= (2px + 4p^3) \frac{dp}{dx} \\ \Rightarrow \frac{p - p^2}{2px + 4p^3} &= \frac{dp}{dx} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dp} &= \frac{p(2x + 4p^2)}{p(1-p)} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dp} &= \frac{2x}{(1-p)} + \frac{4p^2}{(1-p)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dp} + \frac{2x}{(p-1)} = \frac{4p^2}{(1-p)}$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے، جہاں $P = \frac{2}{(p-1)}$ اور $Q = \frac{4p^2}{(1-p)}$ ہے۔ اب ہم دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل طریقہ سے حاصل کریں گے

$$x(I.F.) = \int Q(I.F.) dp + c$$

اس لیے

$$I.F. = e^{\int P dp} = e^{\int \left(\frac{2}{(p-1)}\right) dp} = e^{\log(p-1)^2} = (p-1)^2$$

اب دی گئی مساوات کا حل ہوگا

$$x(p-1)^2 = \int \frac{4p^2}{(1-p)} \times (p-1)^2 dp + c$$

$$\Rightarrow x(p-1)^2 = - \int 4p^2(p-1) dp + c$$

$$\Rightarrow x(p-1)^2 = \int 4(p^2 - p^3) dp + c$$

$$\Rightarrow x(p-1)^2 = 4 \left(\frac{p^3}{3} - \frac{p^4}{4} \right) + c$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{(p-1)^2} \left\{ 4 \left(\frac{p^3}{3} - \frac{p^4}{4} \right) + c \right\}$$

مساوات (1) سے

$$y = \left[\frac{1}{(p-1)^2} \left\{ 4 \left(\frac{p^3}{3} - \frac{p^4}{4} \right) + c \right\} \right] p^2 + p^4$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = \frac{1}{(p-1)^2} \left\{ 4 \left(\frac{p^3}{3} - \frac{p^4}{4} \right) + c \right\},$$

$$y = \left[\frac{1}{(p-1)^2} \left\{ 4 \left(\frac{p^3}{3} - \frac{p^4}{4} \right) + c \right\} \right] p^2 + p^4$$

(d) دی گئی مساوات ہے

$$y = 2xp + p^n$$

.....(1)

یہ لگرائج مساوات ہے۔

اس مساوات کو حل کرنے کے لیے اس کو بہ لحاظ x تفریق کرتے ہیں۔ جس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{dy}{dx} = p = 2x \frac{dp}{dx} + 2p + np^{n-1} \frac{dp}{dx}$$

$$\Rightarrow -p = (2x + np^{n-1}) \frac{dp}{dx}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad \frac{dp}{dx} &= \frac{-p}{2x + np^{n-1}} \\
\Rightarrow \quad \frac{dx}{dp} &= \frac{2x + np^{n-1}}{-p} \\
\Rightarrow \quad \frac{dx}{dp} &= -\frac{2x}{p} - np^{n-2} \\
\Rightarrow \quad \frac{dx}{dp} + \frac{2x}{p} &= -np^{n-2}
\end{aligned}$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے، جہاں $P = \frac{2}{p}$ اور $Q = -np^{n-2}$ ہے۔ اب ہم دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل طریقہ سے حاصل کریں گے

$$x(I.F.) = \int Q(I.F.) dp + c$$

اس لیے

$$I.F. = e^{\int P dp} = e^{\int (\frac{2}{p}) dp} = e^{\log p^2} = p^2$$

اب دی گئی مساوات کا حل ہوگا

$$\begin{aligned}
xp^2 &= \int (-np^{n-2}) \times p^2 dp + c \\
\Rightarrow \quad xp^2 &= - \int (np^n) dp + c \\
\Rightarrow \quad xp^2 &= -\frac{np^{n+1}}{n+1} + c \\
\Rightarrow \quad x &= -\frac{np^{n-1}}{n+1} + cp^{-2}
\end{aligned}$$

مساوات (1) سے

$$\begin{aligned}
y &= 2p \left(-\frac{np^{n-1}}{n+1} + cp^{-2} \right) + p^n \\
\Rightarrow \quad y &= \left(-\frac{2np^n}{n+1} + 2cp^{-1} \right) + p^n
\end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = -\frac{np^{n-1}}{n+1} + cp^{-2}, y = \left(-\frac{2np^n}{n+1} + 2cp^{-1} \right) + p^n$$

7.3 کلیرو کی مساوات (Clairaut's Equation)

وہ تفرقی مساوات جسے درجہ ذیل شکل میں لکھا جاسکتا ہو

$$y = xp + \varphi(p) \quad \dots(1)$$

کلیرو کی مساوات کہلاتی ہے۔

اس مساوات کو حل کرنے کے لیے اس کو بہ لحاظ x تفرق کرتے ہیں۔ جس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{dy}{dx} = p = x \frac{dp}{dx} + p + \frac{d}{dx} \varphi(p) \frac{dp}{dx}$$

$$0 = \left[x + \frac{d}{dx} \varphi(p) \right] \frac{dp}{dx}$$

اب

$$\frac{dp}{dx} = 0, \quad \left[x + \frac{d}{dx} \varphi(p) \right] = 0$$

یہاں جزو $x + \frac{d}{dx} \varphi(p)$ میں $\frac{dp}{dx}$ نہیں ہے اس لیے

$$\frac{dp}{dx} = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$p = c$$

جہاں c ایک اختیاری مستقل ہے۔

p کی یہ قیمت مساوات (1) میں رکھنے پر

$$y = xc + \varphi(c)$$

جو کہ کلیرو کی مساوات کا عام حل ہے۔

اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کلیرو کی مساوات کا حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھنے پر مطلوبہ عام حل حاصل ہو جاتا ہے۔

مثالیں۔ درجہ ذیل مساواتوں کو حل کریے:

$$y = xp + \log p \quad (a)$$

$$y = xp + \frac{a}{2p} \quad (b)$$

$$y = xp + (1 + p^2)^{3/2} \quad (c)$$

$$y = xp + p^2 \quad (d)$$

$$y = xp + \sin^{-1} p \quad (e)$$

$$yp = 1 - p + xp^2 \quad (f)$$

$$p = \cos px \cos y + \sin px \sin y \quad (g)$$

$$yp = a + xp^2 \quad (h)$$

$$(y - px)(p - 1) = p \quad (i)$$

حل۔

(a) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$y = xp + \log p \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc + \log c$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(b) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$y = xp + \frac{a}{2p} \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc + \frac{a}{2c}$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(c) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$y = xp + (1 + p^2)^{3/2} \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc + (1 + c^2)^{3/2}$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(d) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$y = xp + p^2 \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc + c^2$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(e) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$y = xp + \sin^{-1} p \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc + \sin^{-1} c$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(f) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\begin{aligned} yp &= 1 - p + xp^2 \\ y &= xp + \left(1 - \frac{1}{p}\right) \end{aligned} \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc + \left(1 - \frac{1}{c}\right)$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(g) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\begin{aligned} p &= \cos px \cos y + \sin px \sin y \\ p &= \cos(px - y) \\ xp - y &= \cos^{-1} p \end{aligned}$$

⇒

⇒

اس لیے

$$y = xp - \cos^{-1} p \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc - \cos^{-1} c$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(h) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\begin{aligned} yp &= a + xp^2 \\ y &= xp + \frac{a}{p} \end{aligned} \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc + \frac{a}{c}$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(i) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$\begin{aligned} (y - px)(p - 1) &= p \\ y - px &= \frac{p}{p - 1} \\ y &= xp + \frac{p}{p - 1} \end{aligned} \quad \dots(1)$$

یہ مساوات کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$y = xc + \frac{c}{c-1}$$

دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

7.3.1 کلیرو کی شکل میں تبدیل کی جانے والی مساواتیں (Equations Reducible to Clairaut's form)

اب ہم ان مساوات کے بارے میں جائزہ حاصل کریں گے جو کلیرو کی مساوات کی شکل میں نہیں ہوتی ہیں لیکن کچھ مناسب متبادل کا استعمال کر کے ان مساوات کو کلیرو کی مساوات میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ کس تفرقی مساوات میں کیا متبادل رکھا جائے اور کونسا نہیں اس کے لیے کوئی عام طریقہ موجود نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ متبادل ایسے ہیں جن کو زیادہ تر مساوات میں استعمال کر کے ہم دی گئی تفرقی مساوات کو کلیرو کی مساوات میں بدل سکتے ہیں اور پھر پہلے بتائے طریقہ سے عام حل حاصل کر سکتے ہیں۔ ان متبادل کو ہم مثالوں کی مدد سے سمجھیں گے۔

مثالیں۔ درجہ ذیل مساوات کو حل کریے:

$$(py + x)(xp - y) = h^2 p \quad (a)$$

$$xy(y - xp) = x + yp \quad (b)$$

$$y = 2xp + ayp^2 \quad (c)$$

$$y - 2xp + yp^2 = 0 \quad (d)$$

$$e^{4x}p + e^{2y}p^2 - e^{4x} = 0 \quad (e)$$

$$p^2 \cos^2 y + p \sin x \cos x \cos y - \sin y \cos^2 x = 0 \quad (f)$$

حل۔

(a) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$(py + x)(xp - y) = h^2 p \quad \dots(1)$$

مان لو کہ

$$y^2 = v \Rightarrow 2ydy = dv$$

اور

$$\begin{aligned} x^2 = u &\Rightarrow 2xdx = du \\ \Rightarrow \frac{2ydy}{2xdx} &= \frac{dv}{du} \\ \Rightarrow \frac{y}{x}p &= \frac{dv}{du} \\ \Rightarrow p &= \sqrt{\frac{u}{v}} \times \frac{dv}{du} \end{aligned}$$

اب مساوات (1) سے

$$\begin{aligned}
& \left(\sqrt{\frac{u}{v}} \times \frac{dv}{du} \sqrt{v} + \sqrt{u} \right) \left(\sqrt{u} \sqrt{\frac{u}{v}} \times \frac{dv}{du} - \sqrt{v} \right) = h^2 \sqrt{\frac{u}{v}} \times \frac{dv}{du} \\
\Rightarrow & \sqrt{u} \left(\frac{dv}{du} + 1 \right) \frac{1}{\sqrt{v}} \left(u \times \frac{dv}{du} - v \right) = h^2 \sqrt{\frac{u}{v}} \times \frac{dv}{du} \\
\Rightarrow & \left(\frac{dv}{du} + 1 \right) \left(u \frac{dv}{du} - v \right) = h^2 \frac{dv}{du} \\
\Rightarrow & u \frac{dv}{du} - v = \frac{h^2 \frac{dv}{du}}{\left(\frac{dv}{du} + 1 \right)} \\
\Rightarrow & v = u \frac{dv}{du} - \frac{h^2 \frac{dv}{du}}{\left(\frac{dv}{du} + 1 \right)}
\end{aligned}$$

جو کہ کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں $\frac{dv}{du}$ کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$v = uc - \frac{h^2 c}{(c + 1)}$$

$x^2 = u$ اور $y^2 = v$ رکھنے پر

$$y^2 = x^2 c - \frac{h^2 c}{(c + 1)}$$

جو کہ دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(b) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$xy(y - xp) = x + yp \quad \dots (1)$$

مان لو کہ

$$y^2 = v \Rightarrow 2ydy = dv$$

اور

$$\begin{aligned}
x^2 = u & \Rightarrow 2xdx = du \\
\Rightarrow & \frac{2ydy}{2xdx} = \frac{dv}{du} \\
\Rightarrow & \frac{y}{x} p = \frac{dv}{du} \\
\Rightarrow & p = \sqrt{\frac{u}{v}} \times \frac{dv}{du}
\end{aligned}$$

اب مساوات (1) میں یہ متبادل رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned}
\Rightarrow & \sqrt{uv} \left(\sqrt{v} - \sqrt{\frac{u}{v}} \times \frac{dv}{du} \times \sqrt{u} \right) = \left(\sqrt{u} + \sqrt{v} \times \sqrt{\frac{u}{v}} \times \frac{dv}{du} \right) \\
\Rightarrow & \frac{\sqrt{uv}}{\sqrt{v}} \left(v - u \frac{dv}{du} \right) = \sqrt{u} \left(1 + \frac{dv}{du} \right)
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow v - u \frac{dv}{du} = 1 + \frac{dv}{du}$$

$$\Rightarrow v = u \frac{dv}{du} + \left(1 + \frac{dv}{du}\right)$$

جو کہ کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں $\frac{dv}{du}$ کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$v = uc + (1 + c)$$

$$x^2 = u \text{ اور } y^2 = v \text{ رکھنے پر}$$

$$y^2 = x^2 c + (1 + c)$$

جو کہ دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(c) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$y = 2xp + ayp^2 \quad \dots(1)$$

مان لو کہ

$$\begin{aligned} y^2 &= v \\ 2y \frac{dy}{dx} &= \frac{dv}{dx} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$

$\Rightarrow$

$$2p = \frac{1}{\sqrt{v}} \times \frac{dv}{dx}$$

مساوات (1) میں یہ متبادل رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\sqrt{v} = \left(\frac{1}{\sqrt{v}} \times \frac{dv}{dx}\right) x + a\sqrt{v} \times \frac{1}{4v} \times \left(\frac{dv}{dx}\right)^2$$

$$\sqrt{v} = \frac{1}{\sqrt{v}} \left[\left(\frac{dv}{dx}\right) x + \frac{a}{4} \times \left(\frac{dv}{dx}\right)^2 \right]$$

$\Rightarrow$

$$v = \left(\frac{dv}{dx}\right) x + \frac{a}{4} \times \left(\frac{dv}{dx}\right)^2$$

جو کہ کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں $\frac{dv}{dx}$ کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$v = xc + \frac{a}{4} c^2$$

$$y^2 = v \text{ رکھنے پر}$$

$$y^2 = xc + \frac{a}{4} c^2$$

جو کہ دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(d) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$y - 2xp + yp^2 = 0 \quad \dots(1)$$

مان لو کہ

$$\begin{aligned} \Rightarrow y^2 &= v \\ 2y \frac{dy}{dx} &= \frac{dv}{dx} \\ \Rightarrow 2p &= \frac{1}{\sqrt{v}} \times \frac{dv}{dx} \end{aligned}$$

مساوات (1) میں یہ متبادل رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\sqrt{v} - \left(\frac{1}{\sqrt{v}} \times \frac{dv}{dx} \right) x + \sqrt{v} \times \frac{1}{4v} \times \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{v} = \frac{1}{\sqrt{v}} \left[\left(\frac{dv}{dx} \right) x - \frac{1}{4} \left(\frac{dv}{dx} \right)^2 \right]$$

$$\Rightarrow v = \left(\frac{dv}{dx} \right) x - \frac{1}{4} \left(\frac{dv}{dx} \right)^2$$

جو کہ کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں $\frac{dv}{dx}$ کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$v = xc - \frac{1}{4} c^2$$

$y^2 = v$ رکھنے پر

$$y^2 = xc - \frac{1}{4} c^2$$

جو کہ دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(e) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$e^{4x} p + e^{2y} p^2 - e^{4x} = 0 \quad \dots (1)$$

مان لو کہ

$$e^{2y} = v \Rightarrow 2e^{2y} dy = dv$$

اور

$$e^{2x} = u \Rightarrow 2e^{2x} dx = du$$

$$\Rightarrow \frac{2e^{2y} dy}{2e^{2x} dx} = \frac{dv}{du}$$

$$\Rightarrow \frac{e^{2y}}{e^{2x}} p = \frac{dv}{du}$$

$$\Rightarrow p = \frac{e^{2x}}{e^{2y}} \times \frac{dv}{du}$$

$$\Rightarrow p = \frac{u}{v} \times \frac{dv}{du}$$

مساوات (1) میں یہ متبادل رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$u^2 \left(\frac{u}{v} \times \frac{dv}{du} \right) + v \left(\frac{u}{v} \times \frac{dv}{du} \right)^2 - u^2 = 0$$

$$\Rightarrow u^2 \left(\frac{u}{v} \times \frac{dv}{du} - 1 \right) + v \left(\frac{u}{v} \times \frac{dv}{du} \right)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{u^2}{v} \left\{ u \frac{dv}{du} - v + \left(\frac{dv}{du} \right)^2 \right\} = 0$$

$$\Rightarrow v = u \frac{dv}{du} + \left(\frac{dv}{du} \right)^2$$

جو کہ کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں $\frac{dv}{du}$ کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$v = uc + c^2$$

$$e^{2y} = v, e^{2x} = u$$

$$e^{2y} = e^{2x}c + c^2$$

جو کہ دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

(f) دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$p^2 \cos^2 y + p \sin x \cos x \cos y - \sin y \cos^2 x = 0 \quad \dots(1)$$

مان لو کہ

$$\sin y = v \Rightarrow \cos y dy = dv$$

اور

$$\sin x = u \Rightarrow \cos x dx = du$$

$$\Rightarrow \frac{\cos y dy}{\cos x dx} = \frac{dv}{du}$$

$$\Rightarrow p = \frac{\cos x dv}{\cos y du}$$

$$\Rightarrow p = \frac{\sqrt{1 - \sin^2 x}}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} \times \frac{dv}{du}$$

$$\Rightarrow p = \frac{\sqrt{1 - u^2}}{\sqrt{1 - v^2}} \times \frac{dv}{du}$$

مساوات (1) میں یہ متبادل رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1 - u^2}{1 - v^2} \times \left(\frac{dv}{du} \right)^2 (1 - v^2) + \sqrt{\frac{1 - u^2}{1 - v^2}} \times \frac{dv}{du} u \sqrt{1 - u^2} \sqrt{1 - v^2} - v(1 - u^2) = 0$$

$$\Rightarrow (1 - u^2) \left(\frac{dv}{du} \right)^2 + u(1 - u^2) \frac{dv}{du} - v(1 - u^2) = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{dv}{du} \right)^2 + u \frac{dv}{du} - v = 0$$

$$\Rightarrow v = u \frac{dv}{du} + \left(\frac{dv}{du} \right)^2$$

جو کہ کلیرو کی مساوات ہے۔ اس کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں $\frac{dv}{du}$ کی جگہ c رکھتے ہیں، اس لیے

$$v = uc + c^2$$

پر $\sin y = v, \sin x = u$ رکھنے پر

$$\sin y = c \sin x + c^2$$

جو کہ دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہے۔

7.4 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

- اس اکائی میں ہم نے دیکھا کہ لگرائج تفرقی مساوات

$$y = x\varphi(p) + \psi(p)$$

کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو بہ لحاظ x تفرق کرتے ہیں۔ جس سے ہمیں ایک خطی تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔ جس کو حل کرنے پر ہمیں درجہ ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے

$$x = f(p, c)$$

اب x کی یہ قیمت لگرائج کی مساوات میں رکھنے پر ہمیں لگرائج مساوات کا عام حل درجہ ذیل شکل میں حاصل ہوتا ہے

$$x = f(p, c), y = f(p, c)\varphi(p) + \psi(p)$$

- کلیرو کی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھا جاتا ہے۔

$$y = xp + \varphi(p)$$

اس مساوات کا عام حل حاصل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں۔ اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل درجہ ذیل شکل کا ہوگا

$$y = xc + \varphi(c)$$

- کچھ تفرقی مساواتوں کو جو کلیرو کی شکل میں نہیں ہیں، کسی مناسب متبادل کی مدد سے کلیرو کی مساوات میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

7.5 کلیدی الفاظ (Key Words)

کلیرو کی مساوات، خطی تفرقی مساوات، لگرائج مساوات، تکمیلی جزو

7.6 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

7.6.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

$$e^p = px - y \quad .1$$

$$y = px + a(1 - p) \quad .2$$

$$xp - y + p^3 = 0 \quad .3$$

$$y = xp + \frac{1}{p} \quad .4$$

$$p = \tan(px - y) \quad .5$$

$$y = xp + \log p \quad .6$$

$$y = xp + \cos^{-1} p \quad .7$$

$$\frac{y}{x} = p + \frac{\sin^{-1} p}{x} \quad .8$$

$$y = xp + \varphi(p) \quad .9 \quad \text{کو لگراج مساوات کتے ہیں} \quad (\text{صحیح/غلط})$$

$$y = xp + \varphi(p) \quad .10 \quad \text{کا عام حل حاصل کرنے کے لیے ہم اس مساوات میں } p \text{ کی جگہ } c \text{ رکھتے ہیں۔} \quad (\text{صحیح/غلط})$$

7.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

درجہ ذیل تفرقی مساوات کو مناسب متبادل کا استعمال کر کے کلیرو کی مساوات میں تبدیل کرے اور پھر اس کا عام حل حاصل کرے:

$$xy(y - px) = x + py \quad .1$$

$$x^3p + yp^2 - x^2y = 0 \quad .2$$

$$(px^2 + y^2)(px + y) = (p + 1)^2 \quad .3$$

7.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

درجہ ذیل لگراج کی مساوات کا عام حل حاصل کرے:

$$y = 2px - p^2 \quad .1$$

$$y = xp^2 + p \quad .2$$

$$y = 2px + \log p \quad .3$$

$$y = 3px + 4p^2 \quad .4$$

جوابات:

7.6.1 معروضی سوالات کے جوابات

$$y = cx - e^c \quad .1$$

$$y = cx + ac(1 - c) \quad .2$$

$$y = xc + c^3 \quad .3$$

$$y = xc + \frac{1}{c} \quad .4$$

$$y = cx - \tan^{-1} c \quad .5$$

$$y = xc + \log c \quad .6$$

$$y = xc + \cos^{-1} c \quad .7$$

$$y = xc + \sin^{-1} c \quad .8$$

9. $y = xp + \varphi(p)$ کو لگراج مساوات کہتے ہیں (غلط)

10. $y = xp + \varphi(p)$ کا عام حل حاصل کرنے کے لیے ہم اس مساوات میں p کی جگہ c رکھتے ہیں۔ (صحیح)

7.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$1. y^2 = cx^2 + (1 + c)$$

$$2. y^2 = cx^2 + c^2$$

$$3. c^2(x + y) = 1 + c(xy + 1)$$

7.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$1. x = \frac{2}{3}p + \frac{c}{p^2}, y = \frac{p^2}{3} + \frac{2c}{p}$$

$$2. x = \frac{\log p - p + c}{(p-1)^2} + \frac{c}{p^2}, y = xp^2 + p$$

$$3. x = \frac{c}{p^2} - \frac{1}{p}, y = \log p + \frac{2c}{p} - 2$$

$$4. x = -\frac{8}{5}p + \frac{c}{p^{3/2}}, y = \frac{3c}{p^{1/2}} - \frac{4p^2}{5}$$

7.7 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhanian, S.Chand & Co., New Delhi

اکائی 8 - پہلے رتبے کی تفرقی مساواتوں کے اطلاقات: عمودی ٹراجکٹری

(Applications of First Order Differential Equations: Orthogonal Trajectory)

اکائی کے اجزا

تمہید	8.0
مقاصد	8.1
اطلاقات	8.2
عمودی ٹراجکٹری	8.3
جب مساوات کارتیزی شکل میں ہو	8.3.1
جب مساوات قطبی شکل میں ہو	8.3.2
اولک ٹراجکٹری	8.4
اکتسابی نتائج	8.5
کلیدی الفاظ	8.6
نمونہ امتحانی سوالات	8.7
معروضی جوابات کے حامل سوالات	8.7.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	8.7.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	8.7.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	8.8

8.0 تمہید (Introduction)

گزشتہ اکائیوں میں ہم تفرقی مساوات کی تشکیل اور ان کے حل حاصل کرنے کے طریقوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس اکائی میں ہم کچھ مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کا تعلق پہلے رتبے اور پہلے درجے کی تفرقی مساوات سے ہے۔ کسی مسئلہ کے دیے ہوئے اعداد سے پہلے ہم تفرقی مساوات کی تشکیل کریں گے اور پھر کسی مناسب طریقہ سے اس کا حل حاصل کریں گے۔ آخر میں عمودی ٹراجکٹری (Orthogonal Trajectory) اور اوپک ٹراجکٹری کے بارے میں بحث کریں گے۔

8.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ پہلے رتبے کی تفرقی مساوات کے اطلاقات سے واقف ہو جائیں گے نیز عمودی ٹراجکٹری (Orthogonal Trajectory) اور اوپک ٹراجکٹری کی تفصیلی جانکاری اور کسی منحنی کے لیے ان کو حاصل کرنا بھی سیکھیں گے۔

8.2 اطلاقات (Applications)

طبی اطلاقات:

مان لیجیے کہ ایک ذرہ کسی سیدھی لکیر OX کے ایک نقطہ O سے X کی طرف چل رہا ہے، تب اس ذرہ کی کسی وقت t پر رفتار (Speed) درجہ ذیل ہوگی

$$v = \frac{dx}{dt}$$

اور اس ذرہ کا اسراع (Acceleration)

$$a = \frac{dv}{dt}$$

ہوگا۔

اب اگر یہ ذرہ کسی منحنی پر گردش کر رہا ہو، تب ذرہ کی رفتار

$$v = \frac{ds}{dt}$$

اور اس ذرہ کا اسراع (Acceleration)

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

ہوگا۔

یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ رفتار اور اسراع کو منفی (-) یا مثبت (+) نشان کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جب کہ اس ذرہ کی رفتار گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے اور اسراع گھٹ رہا ہے یا بڑھ رہا ہے۔

کسی آبادی کے اضافہ کی شرح آبادی کے متناسب ہوتی ہے۔ کسی بیکٹیریا (Bacteria) کی آبادی کے اضافہ کی شرح $\frac{dx}{dt}$ بیکٹریا کی آبادی x کے متناسب ہوگی، جہاں $x = x(t)$ بیکٹریا کی وقت t پر تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے

$$\frac{dx}{dt} \propto x$$

یا

$$\frac{dx}{dt} = kx$$

جہاں k تناسب کا مثبت (+) مستقل ہے۔

کسی خاص ریڈیو ایکٹو (Radioactive) مادہ کی کثی کی شرح موجودہ مقدار کے متناسب ہوتی ہے۔ اگر کسی ریڈیو ایکٹو مادہ کی مقدار m ہو کسی وقت t پر تب اس مادہ کی شرح درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dm}{dt} \propto m$$

یا

$$\frac{dm}{dt} = km$$

جہاں k تناسب کا منفی (-) مستقل ہے۔

ٹھنڈک کا نیوٹن کا قانون:

اس قانون کے مطابق، ٹھنڈی ہو رہی کسی جسم (Body) میں درجہ حرارت میں بدلاؤ کی شرح جسم کے درجہ حرارت T اور اس کے چاروں طرف کے ماحول کے درجہ حرارت T_0 کے درمیانی فرق کے متناسب ہوتا ہے۔ اس لیے

$$\frac{dT}{dt} \propto (T - T_0), \quad T - T_0 > 0$$

یا

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$$

جہاں k تناسب کا مثبت (+) مستقل ہے۔ یہاں جسم (Body) میں درجہ حرارت میں بدلاؤ کی شرح $\frac{dT}{dt}$ کو منفی اس لیے لیا گیا ہے کہ ٹھنڈی ہو رہی بوڈی کے درجہ حرارت میں لگاتار کمی ہو رہی ہے۔

مثال 1۔ کسی ملک کی آبادی 50 سال میں دوگنی ہو جاتی ہے۔ کتنے سال میں اس ملک کی آبادی تین گنا ہو جائیگی؟
حل۔ مان لیجیے کہ ملک کی آبادی t سال میں x ہے۔ جب $t = 0$ ، تب ملک کی آبادی x_0 ہے۔ تب ہم جانتے ہیں کہ

$$\frac{dx}{dt} = kx$$

جہاں k تناسب کا مستقل ہے۔

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} = k dt$$

مکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log x = kt + \log c$$

$$\Rightarrow \log \frac{x}{c} = kt$$

$$\Rightarrow x = ce^{kt}$$

$$x = x_0 \text{ پر } t = 0 \text{ تب}$$

$$x_0 = c$$

اس لیے

$$x = x_0 e^{kt}$$

$$\text{اور } t = 50 \text{ پر } x = 2x_0 \text{ تب}$$

$$2x_0 = x_0 e^{50k}$$

$$\log 2 = 50k$$

$$k = \frac{1}{50} \log 2$$

مان لو کہ T سال میں آبادی تین گنا ہو جائیگی، تب

$$3x_0 = x_0 e^{\left(\frac{1}{50} \log 2\right)T}$$

$$\Rightarrow \log 3 = \left(\frac{1}{50} \log 2\right)T$$

$$\Rightarrow T = \frac{50 \log 3}{\log 2}$$

8.3 عمودی ٹراجکٹری (Orthogonal Trajectory)

وہ منحنی جو کسی منحنیات کے خاندان کے کسی رکن کو کسی دیے گئے قانون کے مطابق کاٹتا ہے، اس منحنیات کے خاندان کی ٹراجکٹری کہلاتی ہے۔ کوئی ٹراجکٹری عمودی ہوگی اگر یہ منحنیات کے خاندان کے ہر ایک رکن کو 90° پر کاٹے۔

ایک خط جو کسی ہم مرکزی (Concentric) دائرے کے مشترکہ مرکز سے ہو کر گزرتی ہے، وہ دائروں کے خاندان کے ہر ایک رکن کو 90° پر کاٹتی ہے۔ اس لیے اس خط کو ہم مرکزی حلقوں کے خاندان کی ٹرانجکٹری کہتے ہیں۔ اس طرح کے لامحدود خطوط ہوتے ہیں۔ کسی منحنیات کے خاندان کی عمودی ٹرانجکٹری خود ایک خاندان کو تشکیل دیتی ہے۔ اب ہم عمودی ٹرانجکٹری کی تفرقی مساوات حاصل کرنا سیکھیں گے۔

8.3.1 جب مساوات کارٹیزی شکل میں ہو (When Equations in Cartesian Form)

مان لیجیے کہ منحنیات کے خاندان کی مساوات درجہ ذیل ہے

$$\phi(x, y, a) = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

جہاں a ایک پیرامیٹر ہے اور مان لیجیے کہ اس خاندان کی تفرقی مساوات درجہ ذیل ہے

$$\psi\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \quad \dots\dots\dots(2)$$

مان لیجیے کہ خاندان کے کسی منحنی C کے کسی نقطہ $P(x, y)$ پر ایک عمودی ٹرانجکٹری T کاٹتی ہے۔ نقطہ $P(x, y)$ ٹرانجکٹری پر ہے۔ نقطہ $P(x, y)$ پر C کا جھکاؤ $\frac{dy}{dx}$ اور $P(x, y)$ پر ٹرانجکٹری T کا جھکاؤ $\frac{dY}{dX}$ ہوگا۔ چونکہ C اور T ایک دوسرے کو 90° پر کاٹتے ہیں، اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{dX}{dY}$$

اب x کی جگہ X ، y کی جگہ Y اور $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dX}{dY}$ مساوات (2) میں رکھنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\psi\left(X, Y, -\frac{dX}{dY}\right) = 0$$

(x, y) کو (X, Y) کی جگہ رکھنے پر دی گئی منحنی کے خاندان کے لیے عمودی ٹرانجکٹری حاصل ہوگی جو کہ درجہ ذیل ہے

$$\psi\left(x, y, -\frac{dx}{dy}\right) = 0$$

زہن نشین رکھیں کہ کسی منحنیات کے خاندان کی عمودی ٹرانجکٹری حاصل کرنے کے لیے اس خاندان کی دی گئی تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dx}{dy}$ رکھتے ہیں۔

مثال 1- دائروں کے خاندان $x^2 + y^2 = r^2$ کے لیے عمودی ٹرانجکٹری حاصل کریے۔

حل- دی گئی ہم مرکزی دائرے کی مساوات ہے

$$x^2 + y^2 = r^2$$

جہاں r ایک پیرامیٹر ہے۔

اوپر دی گئی مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ اس مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dx}{dy}$ رکھنے پر

$$\Rightarrow -\frac{dx}{dy} = \frac{-x}{y}$$


$$\frac{dx}{y} = \frac{dx}{x}$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\Rightarrow \log y = \log x + \log c$$

$$y = cx$$

جو کہ ان خطوط کے خاندان کی نمائندگی کرتی ہے جو مبدا (0, 0) سے ہو کر گزرتی ہیں۔



شکل 8.3.1.1

مثال 2- منحنیات کے خاندان $xy = c^2$ ، جہاں c ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانزیکٹری حاصل کریے۔

حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$xy = c^2$$

اوپر دی گئی مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$y + x \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{x}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ اس مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dx}{dy}$ رکھنے پر

$$-\frac{dx}{dy} = \frac{-y}{x}$$

$$\Rightarrow ydy - xdx = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\Rightarrow \frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = \frac{a^2}{2}$$

$$\frac{y^2}{2} - \frac{x^2}{2} = \frac{a^2}{2}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹراجکٹری ہے۔

مثال 3- ثابت کرو کہ مکافی (پیرابولہ) کا نظام $y^2 = 4a(x + a)$ خود عمودی ہے، جہاں a ایک پیرامیٹر ہے۔

حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$y^2 = 4a(x + a) \quad \dots\dots\dots(1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2y \frac{dy}{dx} = 4a$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2a}{y} \quad \dots\dots\dots(2)$$

مساوات (1) اور (2) سے a کا اخراج کرنے پر

$$y^2 = 2y \frac{dy}{dx} \left(x + \frac{y}{2} \frac{dy}{dx} \right)$$

$$y = 2x \frac{dy}{dx} + y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \quad \dots\dots\dots(3)$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ اس مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dx}{dy}$ رکھنے پر

$$y = 2x \left(-\frac{dx}{dy} \right) + y \left(-\frac{dx}{dy} \right)^2$$

$\Rightarrow$

$$y = -\frac{2x}{\frac{dy}{dx}} + \frac{y}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^2}$$

$\Rightarrow$

$$y = 2x \frac{dy}{dx} + y \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی تفرقی مساوات کی طرح ہی ہے۔ اس لیے دیے گئے مکافی کا نظام خود عمودی ہے۔

مثال 4- منحنیات کے خاندان $ax^2 + y^2 = 1$ کے لیے عمودی ٹراجکٹری حاصل کریے۔

حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$ax^2 + y^2 = 1$$

جہاں a ایک پیرامیٹر ہے۔

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2ax + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$a = -\frac{y}{x} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

a کی یہ قیمت دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$\left\{ -\frac{y}{x} \left(\frac{dy}{dx} \right) \right\} x^2 + y^2 = 1$$

$$\Rightarrow y^2 = 1 + xy \frac{dy}{dx}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ اس مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dx}{dy}$ رکھنے پر

$$y^2 = 1 + xy \left(-\frac{dx}{dy}\right)$$

$$\Rightarrow xy \left(\frac{dx}{dy}\right) = 1 - y^2$$

$$\Rightarrow xdx = \left(\frac{1}{y} - y\right) dy$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} - \log c = \log y$$

$$\Rightarrow \log \frac{y}{c} = \frac{x^2 + y^2}{2}$$

$$\Rightarrow y = ce^{\left(\frac{x^2 + y^2}{2}\right)}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹراجنکٹری ہے۔

مثال 5- ثابت کرو کہ $x^2 + y^2 + 2gx + 1 = 0$ کی عمودی ٹراجنکٹری $x^2 + y^2 + 2fy - 1 = 0$ ہے۔

حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$x^2 + y^2 + 2gx + 1 = 0$$

جہاں g ایک پیرامیٹر ہے۔

اس مساوات کو x لحاظ تفرقی کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} + 2g = 0$$

$$\Rightarrow g = -\left(x + y \frac{dy}{dx}\right)$$

g کی یہ قیمت دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$x^2 + y^2 - 2\left(x + y \frac{dy}{dx}\right)x + 1 = 0$$

$$\Rightarrow -x^2 + y^2 - 2xy \frac{dy}{dx} + 1 = 0$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ اس مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dx}{dy}$ رکھنے پر

$$-x^2 + y^2 - 2xy \left(-\frac{dx}{dy}\right) + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-x^2}{y} + y - 2x \left(-\frac{dx}{dy}\right) + \frac{1}{y} = 0$$

$$\Rightarrow 2x \frac{dx}{dy} = \frac{x^2}{y} - \left(y + \frac{1}{y}\right)$$

مان لیجیے کہ $x^2 = m$ ، تب $2x \frac{dx}{dy} = \frac{dm}{dy}$ اس لیے

$$\frac{dm}{dy} - \frac{m}{y} = -\left(y + \frac{1}{y}\right)$$

جو کہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس لیے

$$I.F. = e^{-\int \frac{1}{y} dy} = e^{-\log y} = \frac{1}{y}$$

اس لیے خطی تفرقی مساوات کا حل ہوگا

$$\begin{aligned} m \frac{1}{y} &= -\int \frac{1}{y} \left(y + \frac{1}{y}\right) + c \\ &= -\int \left(1 + \frac{1}{y^2}\right) + c \\ &= -y + \frac{1}{y} + c \end{aligned}$$

اب $x^2 = m$ رکھنے پر

$$\frac{x^2}{y} = -y + \frac{1}{y} + c$$

یہاں $2f = -c$ رکھنے پر حاصل ہوتا ہے

$$x^2 + y^2 + 2fy - 1 = 0$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ $x^2 + y^2 + 2gx + 1 = 0$

کی عمودی ٹرانسجکٹری $x^2 + y^2 + 2fy - 1 = 0$ ہے۔

مثال 6- منحنیات کے خاندان $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 + \lambda} = 1$ جہاں λ ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری حاصل کریے۔

حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 + \lambda} = 1$$

من درجہ بالا مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y \frac{dy}{dx}}{a^2 + \lambda} = 0$$

$\Rightarrow$

$$a^2 + \lambda = \frac{-a^2 y}{x} \left(\frac{dy}{dx}\right)$$

$a^2 + \lambda$ کی یہ قیمت دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\frac{-a^2 y}{x} \left(\frac{dy}{dx}\right)} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{xy}{a^2} \left(\frac{dx}{dy} \right) = 1$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔

اس مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dx}{dy}$ رکھنے پر ضروری عمودی ٹرانزیکٹری حاصل ہو جاتی ہے۔

$$\Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{a^2} \left(\frac{dy}{dx} \right) = 1$$

$$\Rightarrow xy \left(\frac{dy}{dx} \right) = a^2 - x^2$$

$$\Rightarrow ydy = \left(\frac{a^2}{x} - x \right) dx$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\Rightarrow \frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} = a^2 \log x + \frac{c}{2}$$

$$x^2 + y^2 - 2a^2 \log x = c$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹرانزیکٹری ہے۔

مثال 6- منحنیات کے خاندان $y = ax^3$ جہاں a ایک اختیاری مستقل ہے، کے لیے عمودی ٹرانزیکٹری حاصل کریے۔

حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$y = ax^3$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = 3ax^2$$

$$a = \frac{1}{3x^2} \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

a کی یہ قیمت دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$\Rightarrow y = \frac{1}{3x^2} \left(\frac{dy}{dx} \right) x^3$$

$$3y = x \left(\frac{dy}{dx} \right)$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ عمودی ٹرانزیکٹری حاصل کرنے کے لیے اس مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ

$-\frac{dx}{dy}$ رکھتے ہیں، اس لیے

$$\Rightarrow 3y = x \left(-\frac{dx}{dy} \right)$$

$$3ydy + xdx = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{3y^2}{2} + \frac{x^2}{2} = \frac{c}{2}$$

⇒

$$x^2 + 3y^2 = c$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری ہے۔


8.3.2 جب مساوات قطبی شکل میں ہو (When Equations in Polar Form)

مان لیجیے کہ منحنیات کے خاندان کی مساوات درجہ ذیل ہے

$$\phi(r, \theta, a) = 0 \quad \dots\dots\dots(1)$$

جہاں a ایک پیرامیٹر ہے اور مان لیجیے کہ اس خاندان کی تفرقی مساوات درجہ ذیل ہے

$$\psi\left(r, \theta, \frac{dr}{d\theta}\right) = 0 \quad \dots\dots\dots(2)$$



شکل 8.3.2.1

مان لیجیے کہ خاندان کے کسی منحنی C کے کسی نقطہ $P(r, \theta)$ پر اسی خاندان کی ایک عمودی ٹرانسجکٹری T کاٹتی ہے۔ اگر P ٹرانسجکٹری پر مان لیا جائے، تب اس نقطہ کو $P(\rho, \alpha)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ مان لو کہ δ اور δ' منحنی C اور ٹرانسجکٹری T کے نقطہ P پر مماس (Tangents) کے زاویے (Angles) ہیں جو کہ برداری نصف قطر (Radius Vector) OP سے بنائے گئے ہیں۔ تب

$$\tan \delta' = \rho \frac{d\alpha}{d\rho} \text{ اور } \tan \delta = r \frac{d\theta}{dr}$$

اب چوں کہ C اور T ایک دوسرے کو 90° پر کاٹتے ہیں، اس لیے

$$|\delta - \delta'| = \frac{\pi}{2}$$

⇒

$$\delta = \delta' + \frac{\pi}{2}$$

⇒

$$\tan \delta = \tan\left(\delta' + \frac{\pi}{2}\right)$$

⇒

$$\tan \delta = -\cot \delta'$$

⇒

$$\tan \delta \tan \delta' = -1$$

⇒

$$\left(r \frac{d\theta}{dr}\right) \left(\rho \frac{d\alpha}{d\rho}\right) = -1$$

$$\Rightarrow \frac{d\theta}{dr} = \frac{-1}{r\rho \frac{d\alpha}{d\rho}}$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{d\theta} = -r\rho \frac{d\alpha}{d\rho}$$

نقطہ P پر $r = \rho$ اور $\theta = \alpha$ اس لیے

$$\frac{dr}{d\theta} = -\rho^2 \frac{d\alpha}{d\rho}$$

اب مساوات (2) سے

$$\psi\left(\rho, \alpha, -\rho^2 \frac{d\alpha}{d\rho}\right) = 0$$

(ρ, α) کو (r, θ) سے بدل کر ہمیں ضروری عمودی ٹراجکٹری کی تفرقی مساوات حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ درجہ ذیل ہوگی

$$\psi\left(r, \theta, -r^2 \frac{d\theta}{dr}\right) = 0$$

زہن نشین رکھیں کہ کسی منحنیات کے خاندان کی تفرقی مساوات میں $\frac{dr}{d\theta}$ کی جگہ $-r^2 \frac{d\theta}{dr}$ رکھ کر اس منحنیات کے خاندان کی عمودی ٹراجکٹری حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح حاصل تفرقی مساوات کو حل کرنے پر عمودی ٹراجکٹری کے خاندان کی مساوات حاصل ہو جاتی ہے۔

مثال 7- منحنیات کے خاندان $r = a\theta$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹراجکٹری حاصل کریے۔

حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$r = a\theta$$

اس مساوات کو بہ لحاظ θ تفرق کرنے پر

$$\frac{dr}{d\theta} = a$$

a کی یہ قیمت دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$r = \theta \frac{dr}{d\theta}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ عمودی ٹراجکٹری کی تفرقی مساوات حاصل کرنے کے لیے اس مساوات

میں $\frac{dr}{d\theta}$ کی جگہ $-r^2 \frac{d\theta}{dr}$ رکھتے ہیں، اس لیے

$$r = \theta \left(-r^2 \frac{d\theta}{dr}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{r} = -\theta d\theta$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log r = -\frac{\theta^2}{2} + \log c$$

$$\Rightarrow \log \frac{r}{c} = -\frac{\theta^2}{2}$$

$$\Rightarrow r = ce^{-\frac{\theta^2}{2}}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری ہے۔

مثال 8- منحنیات کے خاندان $r = a(1 + \cos \theta)$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری حاصل کریے۔
حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$r = a(1 + \cos \theta)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ θ تفرق کرنے پر

$$\frac{dr}{d\theta} = -a \sin \theta$$

$$\Rightarrow a = -\frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{dr}{d\theta} \right)$$

a کی یہ قیمت دی گئی مساوات میں رکھنے پر

$$\Rightarrow r = -\frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{dr}{d\theta} \right) (1 + \cos \theta)$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ عمودی ٹرانسجکٹری کی تفرقی مساوات حاصل کرنے کے لیے اس مساوات میں $\frac{dr}{d\theta}$ کی جگہ $-r^2 \frac{d\theta}{dr}$ رکھتے ہیں، اس لیے

$$\Rightarrow r = -\frac{1 + \cos \theta}{\sin \theta} \left(-r^2 \frac{d\theta}{dr} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{r} = (\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta) d\theta$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log |r| = \log |\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta| + \log |\sin \theta| + \log c$$

$$\Rightarrow \log |r| = \log |c \sin \theta (\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)|$$

$$\Rightarrow r = c \sin \theta (\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)$$

$$\Rightarrow r = c(1 - \cos \theta)$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری ہے۔

مثال 9- منحنیات کے خاندان $r^n \sin n\theta = a^n$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری حاصل کریے۔
حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$r^n \sin n\theta = a^n$$

$$n \log r + \log \sin n\theta = n \log a$$

اس مساوات کو بہ لحاظ θ تفرق کرنے پر

$$\frac{n}{r} \frac{dr}{d\theta} + \frac{1}{\sin n\theta} \times n \cos n\theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{dr}{d\theta} + \cot n\theta = 0$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ عمودی ٹراجکٹری کی تفرقی مساوات حاصل کرنے کے لیے اس مساوات میں $\frac{dr}{d\theta}$ کی جگہ $-r^2 \frac{d\theta}{dr}$ رکھتے ہیں، اس لیے

$$\frac{1}{r} \left(-r^2 \frac{d\theta}{dr} \right) + \cot n\theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{r} + \tan n\theta d\theta = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log|r| = \frac{1}{n} \log|\sec n\theta| + \log c$$

$$\Rightarrow n \log|r| = \log|\sec n\theta| + n \log c$$

$$\Rightarrow r^n = c^n \sec n\theta$$

$$\Rightarrow r^n \cos n\theta = c^n$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹراجکٹری ہے۔

مثال 10- منحنیات کے خاندان $r\theta = a$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹراجکٹری حاصل کریے۔

حل- دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات ہے

$$r\theta = a$$

اس مساوات کو بہ لحاظ θ تفرق کرنے پر

$$\theta \frac{dr}{d\theta} + r = 0$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ عمودی ٹراجکٹری کی تفرقی مساوات حاصل کرنے کے لیے اس مساوات میں $\frac{dr}{d\theta}$ کی جگہ $-r^2 \frac{d\theta}{dr}$ رکھتے ہیں، اس لیے

$$\theta \left(-r^2 \frac{d\theta}{dr} \right) + r = 0$$

$$\Rightarrow 1 - r\theta \frac{d\theta}{dr} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dr}{r} = \theta d\theta$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\log|r| = \frac{\theta^2}{2} + \log c$$

$$\Rightarrow \log \frac{r}{c} = \frac{\theta^2}{2}$$

$$\Rightarrow r = c e^{\frac{\theta^2}{2}}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کی مساوات کے لیے عمودی ٹراجکٹری ہے۔

8.4 اوہلک ٹراجکٹری (Oblique Trajectory)

اگر کوئی منحنی کسی دیے گئے منحنیات کے خاندان کے ہر ایک رکن کو جھکاؤ $90^\circ \neq \alpha$ پر کاٹتا ہے، تب اس کو اوہلک ٹراجکٹری کہتے ہیں۔

نوٹ: کسی منحنیات کے خاندان کی تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $\frac{p + \tan \alpha}{1 - p \tan \alpha}$ رکھنے پر اس خاندان کی اوہلک ٹراجکٹری حاصل ہو جاتی ہے، جہاں $p = \frac{dy}{dx}$ اور α وہ جھکاؤ ہے جو اوہلک ٹراجکٹری، منحنیات کے خاندان کے ہر ایک رکن کو کاٹ کر بناتی ہے۔

مثال 11- دائروں کے خاندان $x^2 + y^2 = r^2$ کو 30° کے جھکاؤ پر کاٹنے والی اوہلک ٹراجکٹری کی مساوات حاصل کریے۔

حل- دی گئی دائروں کے خاندان کی مساوات ہے

$$x^2 + y^2 = r^2$$

جہاں r ایک پیرامیٹر ہے۔

من درجہ بالا مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{y}$$

جو کہ دی گئی منحنیات کے خاندان کے لیے تفرقی مساوات ہے۔ اوہلک ٹراجکٹری حاصل کرنے کے لیے اس مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ

$$\frac{p + \tan \alpha}{1 - p \tan \alpha}$$

رکھتے ہیں، یہاں $\alpha = 30^\circ$ ہے۔ اس لیے

$$\frac{p + \tan 30^\circ}{1 - p \tan 30^\circ} = \frac{-x}{y}$$

$$\Rightarrow \frac{p + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - p \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{-x}{y}$$

$$\Rightarrow y(\sqrt{3}p + 1) + x(\sqrt{3} - p) = 0$$

$$\Rightarrow (\sqrt{3}y - x)p + \sqrt{3}x + y = 0$$

$$\Rightarrow p = -\frac{\sqrt{3}x + y}{\sqrt{3}y - x}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sqrt{3} + \frac{y}{x}}{1 - \sqrt{3}\frac{y}{x}}$$

جو ایک متجانس خطی تفرقی مساوات ہے۔ اب مان لیجیے کہ $y = xv$ ، تب $\frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$ اس لیے

$$\begin{aligned}
v + x \frac{dv}{dx} &= \frac{\sqrt{3} + \frac{xv}{x}}{1 - \sqrt{3} \frac{xv}{x}} \\
\Rightarrow x \frac{dv}{dx} &= \frac{\sqrt{3} + v}{1 - \sqrt{3}v} - v \\
\Rightarrow x \frac{dv}{dx} &= \frac{\sqrt{3} + v - v + \sqrt{3}v^2}{1 - \sqrt{3}v} \\
\Rightarrow x \frac{dv}{dx} &= \frac{\sqrt{3}(1 + v^2)}{1 - \sqrt{3}v} \\
\Rightarrow \sqrt{3} \frac{dx}{x} &= \frac{1 - \sqrt{3}v}{1 + v^2} dv \\
\Rightarrow \sqrt{3} \frac{dx}{x} &= \frac{1}{1 + v^2} dv - \frac{\sqrt{3}}{2} \left(\frac{2v}{1 + v^2} \right) dv \\
\Rightarrow \frac{dx}{x} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{1 + v^2} \right) dv - \frac{1}{2} \left(\frac{2v}{1 + v^2} \right) dv \\
\Rightarrow 2 \frac{dx}{x} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{1 + v^2} \right) dv - \left(\frac{2v}{1 + v^2} \right) dv
\end{aligned}$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned}
2 \log x &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} v - \log(1 + v^2) + \log c \\
\Rightarrow \log \frac{x^2(1 + v^2)}{c} &= \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} v \\
\Rightarrow x^2(1 + v^2) &= ce^{\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} v}
\end{aligned}$$

v کی جگہ $\frac{y}{x}$ رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\begin{aligned}
\Rightarrow x^2 \left\{ 1 + \left(\frac{y}{x} \right)^2 \right\} &= ce^{\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)} \\
\Rightarrow x^2 + y^2 &= ce^{\frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)}
\end{aligned}$$

جو کہ دیے گئے دائروں کے خاندان کی ضروری اوپنک ٹریجکٹری ہے۔

8.5 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی میں ہم نے پڑھا:

1. مان لیجیے کہ ایک ذرہ کسی سیدھی لکیر OX کے ایک نقطہ O سے X کی طرف چل رہا ہے، تب اس ذرہ کی کسی وقت t پر رفتار (Speed) اور اس ذرہ کا اسراع (Acceleration) بالترتیب $v = \frac{dx}{dt}$ اور $a = \frac{dv}{dt}$ ہو گا۔ اور اگر یہ ذرہ کسی منحنی پر گردش کر رہا ہو، تب ذرہ کی رفتار $v = \frac{ds}{dt}$ اور اس ذرہ کا اسراع (Acceleration) $a = \frac{d^2s}{dt^2}$ ہو گا۔

2. کسی آبادی کے اضافہ کی شرح آبادی کے متناسب ہوتی ہے۔
3. کسی خاص تابکار (Radioactive) مادہ کی کشتی کی شرح موجودہ مقدار کے متناسب ہوتی ہے۔
4. ٹھنڈی ہو رہی کسی بوڈی میں درجہ حرارت میں بدلاؤ کی شرح بوڈی کے درجہ حرارت T اور اس کے چاروں طرف کے ماحول کے درجہ حرارت T_0 کے درمیانی فرق کے متناسب ہوتا ہے۔ اس لیے
- $$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_0)$$
- جہاں k تناسب کا مثبت (+) مستقل ہے۔
5. وہ منحنی جو کسی منحنیات کے خاندان کے کسی رکن کو کسی دیے گئے قانون کے مطابق کاٹتا ہے، اس منحنیات کے خاندان کی ٹراجکٹری کہلاتی ہے۔
6. کوئی ٹراجکٹری عمودی ہوگی اگر یہ منحنیات کے خاندان کے ہر ایک رکن کو 90° پر کاٹے۔ کسی منحنیات کے خاندان کی عمودی ٹراجکٹری حاصل کرنے کے لیے اس خاندان کی دی گئی تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $-\frac{dx}{dy}$ رکھتے ہیں۔
7. اگر منحنی پولر شکل میں ہو تب اس منحنیات کے خاندان کی تفرقی مساوات میں $\frac{dr}{d\theta}$ کی جگہ $-r^2 \frac{d\theta}{dr}$ رکھ کر اس منحنی کی قطبی شکل میں عمودی ٹراجکٹری حاصل ہو جاتی ہے۔
8. اگر کوئی منحنی کسی دیے گئے منحنیات کے خاندان کے ہر ایک رکن کو جھکاؤ $90^\circ \neq \alpha$ پر کاٹتا ہے، تب اس کو اوپلک ٹراجکٹری کہتے ہیں۔ کسی منحنیات کے خاندان کی تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $\frac{p + \tan \alpha}{1 - p \tan \alpha}$ رکھنے پر اس خاندان کی اوپلک ٹراجکٹری حاصل ہو جاتی ہے۔

8.6 کلیدی الفاظ (Key Words)

منحنیات کا خاندان، عمودی ٹراجکٹری، اوپلک ٹراجکٹری، پولر شکل، متجانس

8.7 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

8.7.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. کسی خاص ریڈیو ایکٹو (Radioactive) مادہ کی کشتی کی شرح موجودہ مقدار کے متناسب ہوتی ہے۔ (T/F)
2. کسی بیکٹیریا (Bacteria) کی آبادی کے اضافہ کی شرح $\frac{dx}{dt}$ بیکٹریا کی آبادی x کے غیر متناسب ہوگی، جہاں $x = x(t)$ بیکٹریا کی وقت t پر تعداد کو ظاہر کرتا ہے۔ (T/F)

3. کسی منحنیات کے خاندان کی عمودی ٹرانجکٹری حاصل کرنے کے لیے اس خاندان کی دی گئی تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $\frac{dx}{dy}$ رکھتے ہیں۔
(T/F)

4. مان لیجیے کہ کوئی منحنی پولر شکل میں ہے، تب اس منحنیات کے خاندان کی تفرقی مساوات میں $\frac{dr}{d\theta}$ کی جگہ $-r^2 \frac{d\theta}{dr}$ رکھ کر اس منحنی کی پولر شکل میں عمودی ٹرانجکٹری حاصل ہو جاتی ہے۔
(T/F)

5. کسی منحنیات کے خاندان کی تفرقی مساوات میں $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ $\frac{p+\tan \alpha}{1-p \tan \alpha}$ رکھنے پر اس خاندان کی اوپلک ٹرانجکٹری حاصل ہو جاتی ہے۔
(T/F)

6. ٹھنڈک کانپوٹن کا قانون کیا ہے؟

7. اوپلک ٹرانجکٹری کیا ہے؟

8. ٹرانجکٹری کی تعریف کریے۔

9. عمودی ٹرانجکٹری کی تعریف کریے۔

8.7.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

1. منحنیات کے خاندان $r = a(1 - \cos \theta)$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری محسوب کریے۔
2. منحنیات کے خاندان $r = e^{a\theta}$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری معلوم کرو۔
3. منحنیات کے خاندان $r = a + \sin 5\theta$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری حاصل کرو۔
4. منحنیات کے خاندان $r = a(\sec \theta + \tan \theta)$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری معلوم کرو۔
5. منحنیات کے خاندان $r = 2a/(1 + \cos \theta)$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری محسوب کریے۔
6. منحنیات کے خاندان $r^n = a^n \sin n\theta$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری حاصل کرو۔

8.7.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. منحنیات کے خاندان $x^2 + y^2 + 2gx + a = 0$ جہاں g ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری حاصل کریے۔
2. منحنیات کے خاندان $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری محسوب کریے۔
3. منحنیات کے خاندان $x^2 = cy$ جہاں c ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانجکٹری معلوم کریے۔

4. منحنیات کے خاندان $\frac{x^2}{a^2+\lambda} + \frac{y^2}{b^2+\lambda} = 1$ جہاں λ ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری معلوم کریے۔

5. منحنیات کے خاندان $x^3 = cy^2$ جہاں c ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری حاصل کریے۔

جوابات:

8.7.1 معروضی سوالات کے جوابات

1. (T)

2. (F)

3. (F)

4. (T)

5. (T)

8.7.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$1. r = c(1 + \cos \theta)$$

$$2. (\log r)^2 + \theta^2 = b^2$$

$$3. ce^{\frac{25}{r}} = \sec 5\theta + \tan 5\theta$$

$$4. r = ce^{-\sin \theta}$$

$$5. r = \frac{2c}{(1 - \cos \theta)}$$

$$6. r^n = b^n \cos n\theta$$

8.7.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$1. x^2 + y^2 + 2\mu y - c = 0$$

$$2. y^{4/3} - x^{4/3} = b^{4/3}$$

$$3. x^2 + 2y^2 = b^2$$

$$4. \left(x + y \frac{dy}{dx}\right) \left(x - y \frac{dx}{dy}\right) = a^2 - b^2$$

$$5. x^2 + 2y^2 = b^2$$

8.8 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhania, S.Chand & Co., New Delhi
3. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume –I , V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company

اکائی 9۔ مستقل ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساواتیں

(Homogeneous Linear Differential Equations with Constant Coefficients)

اکائی کے اجزا	
9.0	تمہید
9.1	مقاصد
9.2	مستقل ضریب کے ساتھ متجانس خطی تفرقی مساوات
9.2.1	کچھ بنیادی قضیے
9.2.1	اتمامی تفاعلات
9.3	اکتسابی نتائج
9.4	کلیدی الفاظ
9.5	نمونہ امتحانی سوالات
9.5.1	معروضی جوابات کے حامل سوالات
9.5.2	مختصر جوابات کے حامل سوالات
9.5.3	طویل جوابات کے حامل سوالات
9.6	مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں

9.0 تمہید (Introduction)

گزشتہ اکائی میں ہم نے پہلے رتبے اور پہلے درجے کی مساواتوں کے اطلاقات کے بارے میں پڑھا خاص طور پر عمودی ٹریجیکٹری کو حاصل کرنا سیکھا۔ اس اکائی میں ہم اعلیٰ رتبہ کی متجانس تفرقی مساوات اور اس کی معاون (Auxiliary) مساوات کی مدد سے حاصل اتمائی تفاعل کا حل حاصل کرنے کے مختلف طریقوں پر بحث کریں گے۔

9.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ متجانس تفرقی مساوات کی بنیادی معلومات حاصل کریں گے اور پھر معاون مساوات کی مدد سے اتمائی تفاعلات کو حاصل کر کے دی گئی متجانس تفرقی مساوات کا حل معلوم کریں گے۔

9.2 مستقل ضریب کے ساتھ متجانس خطی تفرقی مساوات

(Homogeneous Linear Differential Equations with Constant Coefficients)

n رتبہ کی خطی تفرقی مساوات درجہ ذیل شکل کی ہوتی ہے

$$\frac{d^n y}{dx^n} + P_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + P_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \cdots + P_{n-1} \frac{dy}{dx} + P_n y = Q \quad \text{.....(1)}$$

جہاں $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}, P_n$ یا تو x کے تفاعلات ہیں یا مستقل (Constants) ہیں اور ان میں y اور اس کے مشتق موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اگر $P_1, P_2, \dots, P_{n-1}, P_n$ مستقل ہوں اور x کا تفاعل Q ہو تب، مساوات (1) کو مستقل ضریب کے ساتھ خطی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

اب اگر $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n$ مستقل ہوں اور Q یا تو مستقل ہو یا x کا تفاعل ہو تب، مساوات (1) سے

$$\frac{d^n y}{dx^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + a_2 \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dy}{dx} + a_n y = Q$$

اگر $\frac{d}{dx} = D, \frac{d^2}{dx^2} = D^2, \frac{d^3}{dx^3} = D^3, \dots, \frac{d^n}{dx^n} = D^n$ تب

$$D^n y + a_1 D^{n-1} y + a_2 D^{n-2} y + \cdots + a_{n-1} D y + a_n y = Q$$

$$(D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \cdots + a_{n-1} D + a_n) y = Q$$

اس مساوات کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں

$$f(D)y = Q \quad \text{.....(2)}$$

جہاں $f(D) = D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \cdots + a_{n-1} D + a_n$ ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی تفرقی مساوات کا رتبہ n ہے، تب اس کے عام حل (General Solution) میں n اختیاری مستقلات ہوں گے۔ اگر کسی حل میں اختیاری مستقل موجود نہ ہوں تب اس حل کو خاص تکملہ (Particular Integral) کہتے ہیں۔ اگر مساوات (2) میں $Q = 0$ ، تب مساوات

$$f(D)y = 0 \quad \text{.....(3)}$$

متجانس تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

9.2.1 کچھ بنیادی قضیے (Some Basic Theorems)

1. اگر $y = v$ مساوات $f(D)y = Q$ کا خاص تکملہ ہو اور $y = u$ جس میں n غیر تابع اختیاری مستقلات ہیں، مساوات

$$f(D)y = 0 \text{ کا عام حل ہو، تب } y = u + v \text{ مساوات } f(D)y = Q \text{ کا عام حل ہو گا۔}$$

ثبوت: چون کہ $y = v$ مساوات (2) کا خاص تکملہ (Particular Integral) ہے اور $y = u$ مساوات (3) کا عام حل ہے، اس لیے

$$f(D)v = Q$$

اور

$$f(D)u = 0$$

اس لیے

$$f(D)(u + v) = f(D)u + f(D)v = 0 + Q = Q$$

اس لیے مساوات $f(D)y = Q$ کا حل $y = u + v$ ہے۔ لیکن اس حل میں n غیر تابع اختیاری مستقل ہیں۔ اس لیے یہ مساوات

$f(D)y = Q$ کا عام حل $y = u + v$ ہو گا۔ مساوات $f(D)y = 0$ کے عام حل کو مساوات $f(D)y = Q$ کا اتمی

تفاعل (Complementary Function) کہتے ہیں۔ اس طرح کسی خطی تفرقی مساوات کے لیے عام حل درجہ ذیل طریقے سے حاصل

کرتے ہیں

$$y = C.F. + P.I.$$

2. اگر $f(D)y = 0$ کا ایک حل $y = y_1$ ہے، تب $y = cy_1$ بھی اس کا ایک حل ہو گا، جہاں c ایک اختیاری مستقل ہے۔

ثبوت: مان لیجیے $f(D)y = 0$ کا ایک حل $y = y_1$ ہے، تب

$$f(D)y_1 = 0$$

اب

$$f(D)cy_1 = cf(D)y_1 = 0$$

اس لیے $y = cy_1$ مساوات $f(D)y = 0$ کا بھی حل ہو گا۔

3. اگر $y = y_1, y = y_2, \dots, y = y_n$ مساوات $f(D)y = 0$ کے n غیر تابع حل ہیں، تب

$$y = c_1y_1 + c_2y_2 + \dots + c_ny_n$$

بھی اس کا ایک حل ہو گا، جہاں $c_1, c_2, \dots, c_n$ اختیاری مستقلات ہیں۔

ثبوت: مان لیجیے $y = y_1, y = y_2, \dots, y = y_n$ مساوات $f(D)y = 0$ کے n غیر تابع حل ہیں، تب

$$f(D)y_1 = 0, f(D)y_2 = 0, \dots, f(D)y_n = 0 \quad \dots(1)$$

اب

$$\begin{aligned} f(D)(c_1y_1 + c_2y_2 + \dots + c_ny_n) &= f(D)c_1y_1 + f(D)c_2y_2 + \dots + f(D)c_ny_n \\ &= c_1f(D)y_1 + c_2f(D)y_2 + \dots + c_nf(D)y_n \end{aligned}$$

مساوات (1) کا استعمال کرنے پر

$$f(D)(c_1y_1 + c_2y_2 + \dots + c_ny_n) = 0$$

اس لیے $y = c_1y_1 + c_2y_2 + \dots + c_ny_n$ مساوات $f(D)y = 0$ کا ایک حل ہے۔

9.2.2 اتمی تفاعلات (Complementary Functions)

فرض کرو کہ

$$f(D)y = 0 \quad \dots(1)$$

مان لو کہ $m_1, m_2, \dots, m_n$ درجہ ذیل مساوات جسے معاون (Auxiliary) مساوات کہتے ہیں، کے روٹس ہیں

$$f(m) = 0 \quad \dots(2)$$

تب، مساوات (1) کو درجہ ذیل شکل میں لکھ سکتے ہیں

$$(D - m_1)(D - m_2) \dots (D - m_n)y = 0 \quad \dots(3)$$

اس مساوات کی خطی مساوات درجہ ذیل ہیں

$$(D - m_1)y = 0, (D - m_2)y = 0, \dots, (D - m_n)y = 0 \quad \dots(4)$$

جن کے حل مساوات (3) کے حل ہوں گے اور پھر مساوات (1) کے بھی حل ہوں گے۔ اب مان لو کہ مساوات

$$(D - m_k)y = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{d}{dx} - m_k \right) y = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} - m_k y = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{y} = m_k dx$$

تکمل کرنے پر ہمیں خاص حل حاصل ہوتا ہے

$$y = e^{m_k x}$$

اس لیے مساوات (4) کے خاص حل $y_1 = e^{m_1 x}, y_2 = e^{m_2 x}, \dots, y_n = e^{m_n x}$ جو کہ مساوات (1) کے بھی ہوں گے۔ اس سے درجہ ذیل تین صورتیں ظاہر ہوتی ہیں:

1. جب معاون مساوات کے سبھی روٹس مختلف ہوں:

اس صورت میں مان لیجیے کہ $m_1 \neq m_2, \neq \dots \neq m_n$ حاصل کردہ معاون مساوات کے روٹس ہیں، تب $e^{m_1 x}, e^{m_2 x}, \dots, e^{m_n x}$ خطی طور پر غیر تابع ہیں۔ اس لیے مساوات (1) کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \dots + c_n e^{m_n x} \quad \dots (5)$$

2. جب معاون مساوات کے کچھ روٹس مساوی ہوں:

اس صورت میں مان لیجیے کہ معاون مساوات کے n روٹس میں سے k روٹس مساوی ہیں $m = m_1 = m_2 = \dots = m_k$ تب مساوات (1) کا عام حل ہوگا

$$\begin{aligned} y = C.F. &= c_1 e^{mx} + c_2 e^{mx} + \dots + c_k e^{mx} + c_{k+1} e^{m_{k+1} x} + \dots + c_n e^{m_n x} \\ &= (c_1 + c_2 + \dots + c_k) e^{mx} + c_{k+1} e^{m_{k+1} x} + \dots + c_n e^{m_n x} \\ &= C e^{mx} + c_{k+1} e^{m_{k+1} x} + \dots + c_n e^{m_n x}, \end{aligned}$$

$$c_1 + c_2 + \dots + c_k = C \quad \text{جہاں}$$

اس طرح اس حل میں $n - k + 1$ اختیاری مستقلات ہیں۔

چوں کہ معاون مساوات کے پہلے k روٹس مساوی ہیں اس لیے مساوات (1) کو درجہ ذیل طریقہ سے لکھ سکتے ہیں

$$(D - m)^r (D - m_{k+1}) \dots (D - m_n) y = 0$$

اس لیے اب ہم درجہ ذیل مساوات کا عام حل حاصل کرتے ہیں

$$(D - m)^r y = 0 \quad \dots (6)$$

اب مان لیجیے کہ $y = v e^{mx}$ تب

$$\begin{aligned} (D - m)y &= (D - m)v e^{mx} \\ &= D(v e^{mx}) - m v e^{mx} \end{aligned}$$

$$= vme^{mx} + e^{mx}D(v) - mve^{mx}$$

$$= e^{mx}D(v)$$

(D - m) کی مدد سے دونوں طرف آپریٹ کرنے پر

$$(D - m)^2 y = (D - m)e^{mx}D(v)$$

$$= D\{e^{mx}D(v)\} - me^{mx}D(v)$$

$$= me^{mx}D(v) + e^{mx}D^2(v) - me^{mx}D(v)$$

$$= e^{mx}D^2(v)$$

یہ طریقہ k مرتبہ دہرانے پر

$$(D - m)^k y = e^{mx}D^k(v)$$

اس لیے مساوات (6) سے

$$e^{mx}D^k(v) = 0$$

⇒

$$D^k(v) = 0$$

اس مساوات کے خطی طور پر غیر تابع خاص حل درجہ ذیل ہوں گے

$$v = 1, v = x, v = x^2, \dots, v = x^{k-1}$$

اس لیے عام حل ہوگا $v = c_1 + c_2x + c_3x^2 + \dots + c_kx^{k-1}$ اور پھر مساوات (6) کا حل ہوگا

$$y = (c_1 + c_2x + c_3x^2 + \dots + c_kx^{k-1})e^{mx}$$

اس لیے جب معاون مساوات کے n روٹس میں سے k روٹس $m = m_1 = m_2 = \dots = m_k$ ہوں، تب

$$C.F. = (c_1 + c_2x + c_3x^2 + \dots + c_kx^{k-1})e^{mx} + c_{k+1}e^{m_{k+1}x} + \dots + c_ne^{m_nx}$$

3. جب معاون مساوات کے روٹس ملتی اعداد (Complex Numbers) ہوں:

اس صورت میں مان لیجیے کہ $m_1 = \alpha + i\beta$ اور $m_2 = \alpha - i\beta$ حاصل کردہ معاون مساوات کے روٹس ہیں، تب

$$C.F. = c_1e^{(\alpha+i\beta)x} + c_2e^{(\alpha-i\beta)x}$$

$$= c_1e^{(\alpha x + i\beta x)} + c_2e^{(\alpha x - i\beta x)}$$

$$= c_1e^{\alpha x}e^{i\beta x} + c_2e^{\alpha x}e^{-i\beta x}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{\alpha x}(c_1 e^{i\beta x} + c_2 e^{-i\beta x}) \\
&= e^{\alpha x}\{(c_1 \cos \beta x + c_1 i \sin \beta x) + (c_2 \cos \beta x - c_2 i \sin \beta x)\} \\
&= e^{\alpha x}\{(c_1 + c_2) \cos \beta x + (c_1 - c_2) i \sin \beta x\} \\
&= e^{\alpha x}\{A \cos \beta x + B \sin \beta x\}
\end{aligned}$$

جہاں A اور B نئے اختیاری مستقل ہیں۔

اتمامی تقابل $C.F.$ حاصل کرنے کا طریقہ:

- (i) سب سے پہلے دی گئی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھیں
- $$(D^n + a_1 D^{n-1} + a_2 D^{n-2} + \dots + a_{n-1} D + a_n)y = 0$$
- (ii) اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل طریقہ سے لکھیں
- $$m^n + a_1 m^{n-1} + a_2 m^{n-2} + \dots + a_{n-1} m + a_n = 0$$
- (iii) اس مساوات کو m کے لیے حل کریں
- (iv) اب اوپر بتائے طریقوں میں سے مناسب طریقہ سے $C.F.$ حاصل کریں۔

مثال 1- مساوات $(D^2 + 2D - 15)y = 0$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات مستقل ضریب کے ساتھ دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\begin{aligned}
m^2 + 2m - 15 &= 0 \\
\Rightarrow (m - 3)(m + 5) &= 0 \\
\Rightarrow m &= 3, -5
\end{aligned}$$

چوں کہ روٹس الگ الگ ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-5x}$$

مثال 2- مساوات $(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^3 - 6D^2 + 11D - 6)y = 0$$

یہ مساوات مستقل ضریب کے ساتھ تیسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\begin{aligned}
& m^3 - 6m^2 + 11m - 6 = 0 \\
\Rightarrow & m^2(m - 1) - 5m(m - 1) + 6(m - 1) = 0 \\
\Rightarrow & (m - 1)(m^2 - 5m + 6) = 0 \\
\Rightarrow & (m - 1)(m - 2)(m - 3) = 0 \\
\Rightarrow & m = 1, 2, 3
\end{aligned}$$

چوں کہ روٹس الگ الگ ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$$

مثال 3- مساوات $\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} - 12x = 0$ کا حل معلوم کریں، دیا گیا ہے کہ $t = 0$ پر $x = 3$ اور $\frac{dx}{dt} = 5$ ہے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} - 12x = 0$$

سب سے پہلے دی گئی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھتے ہیں

$$(D^2 - D - 12)x = 0$$

یہ مساوات مستقل ضریب کے ساتھ دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\begin{aligned}
& m^2 - m - 12 = 0 \\
\Rightarrow & (m - 4)(m + 3) = 0 \\
\Rightarrow & m = 4, -3
\end{aligned}$$

چوں کہ روٹس الگ الگ ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = C.F. = c_1 e^{4t} + c_2 e^{-3t} \quad \dots(1)$$

$t = 0$ پر $x = 3$ اور $\frac{dx}{dt} = 5$ ہیں، تب

$$3 = c_1 e^0 + c_2 e^0$$

$$c_1 + c_2 = 3 \quad \dots(2)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ t تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{dx}{dt} = 4c_1 e^{4t} - 3c_2 e^{-3t}$$

اور جب $t = 0$ تب $\frac{dx}{dt} = 5$ اس لیے

$$4c_1 - 3c_2 = 5 \quad \dots\dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) کو حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$c_1 = 2, c_2 = 1$$

اس لیے ضروری خاص حل ہوگا

$$x = 2e^{4t} + e^{-3t}$$

مثال 4- مساوات $\frac{d^2x}{dt^2} - 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0$ کو حل کریں، دیا گیا ہے کہ $t = 0$ پر $x = 0$ اور $\frac{dx}{dt} = 0$ ہوگا۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0$$

سب سے پہلے دی گئی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھتے ہیں

$$(D^2 - 3D + 2)x = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^2 - 3m + 2 = 0$$

$$\Rightarrow (m - 2)(m - 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, 2$$

چوں کہ روٹس الگ الگ ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = C.F. = c_1 e^t + c_2 e^{2t} \quad \dots\dots(1)$$

$t = 0$ کے لیے $x = 0$ اور $\frac{dx}{dt} = 0$ ہیں، اس لیے

$$0 = c_1 e^0 + c_2 e^0$$

$$c_1 + c_2 = 0 \quad \dots\dots(2)$$

اب مساوات (1) کو بہ لحاظ t تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{dx}{dt} = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t}$$

اور جب $t = 0$ تب $\frac{dx}{dt} = 0$ اس لیے

$$c_1 + 2c_2 = 0 \quad \dots\dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) کو حل کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$c_1 = 0, c_2 = 0$$

اس لیے ضروری خاص حل ہوگا

$$x = 0$$

مثال 5- مساوات $(D^2 - 2D + 5)y = 0$ کا حل معلوم کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^2 - 2D + 5)y = 0$$

یہ مساوات مستقل ضریب کے ساتھ دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 - 2m + 5 = 0$$

$$\Rightarrow m = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2}$$

$$\Rightarrow m = 1 \pm 2i$$

چوں کہ روٹس ملطف اعداد (Complex Numbers) ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = e^x (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$$

مثال 6- مساوات $(D^3 - 2D^2 + 4D - 8)y = 0$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^3 - 2D^2 + 4D - 8)y = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ تیسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^3 - 2m^2 + 4m - 8 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m - 2) + 4(m - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (m - 2)(m^2 + 4) = 0$$

$$\Rightarrow m = 2, \pm 2i$$

چوں کہ روٹس الگ الگ اور ملتف اعداد ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = c_1 e^{2x} + e^{0 \cdot x} (c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x)$$

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x$$

مثال 7- مساوات $(D^3 - 5D^2 + 7D - 3)y = 0$ کو حل کریے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^3 - 5D^2 + 7D - 3)y = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ تیسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^3 - 5m^2 + 7m - 3 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m - 1) - 4m(m - 1) + 3(m - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (m - 1)(m^2 - 4m + 3) = 0$$

$$\Rightarrow (m - 1)(m - 1)(m - 3) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, 1, 3$$

چوں کہ روٹس الگ الگ ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = (c_1 + c_2 x)e^x + c_3 e^{3x}$$

مثال 8- مساوات $(D^3 + 3D^2 + 3D + 1)y = 0$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^3 + 3D^2 + 3D + 1)y = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ تیسرے درجے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^3 + 3m^2 + 3m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m + 1) + 2m(m + 1) + (m + 1) = 0$$

$$\Rightarrow (m + 1)(m^2 + 2m + 1) = 0$$

$$\Rightarrow (m + 1)(m + 1)(m + 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = -1, -1, -1$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = (c_1 + c_2x + c_3x^2)e^{-x}$$

مثال 9- مساوات $(D^4 + 8D^2 + 16)y = 0$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^4 + 8D^2 + 16)y = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ چوتھے درجے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^4 + 8m^2 + 16 = 0$$

$$\Rightarrow (m^2 + 4)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = \pm 2i, \pm 2i$$

چوں کہ روٹس ملطف اعداد ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = (c_1 + c_2x) \cos 2x + (c_3 + c_4x) \sin 2x$$

مثال 10- مساوات $(D^3 - 3D - 2)y = 0$ کا حل معلوم کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^3 - 3D - 2)y = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ تیسرے درجے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^3 - 3m - 2 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m+1) - m(m+1) - 2(m+1) = 0$$

$$\Rightarrow (m+1)(m^2 - m - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (m+1)(m+1)(m-2) = 0$$

$$\Rightarrow m = -1, -1, 2$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = (c_1 + c_2 x)e^{-x} + c_3 e^{2x}$$

مثال 11- مساوات $(D^3 + D^2 + 4D + 4)y = 0$ کا حل معلوم کرو، جب کہ دیا گیا ہے کہ $x = 0$ پر $y = 0$ ، $\frac{dy}{dx} = -1$

اور $\frac{d^2y}{dx^2} = 5$ ہے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^3 + D^2 + 4D + 4)y = 0$$

یہ مساوات مستقل ضریب کے ساتھ تیسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^3 + m^2 + 4m + 4 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m+1) + 4(m+1) = 0$$

$$\Rightarrow (m+1)(m^2 + 4) = 0$$

$$\Rightarrow m = -1, \pm 2i$$

چوں کہ روٹس مختلف اور ملطف اعداد ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$y = C.F. = c_1 e^{-x} + e^{0 \cdot x} (c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x)$$

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 \cos 2x + c_3 \sin 2x \quad \dots\dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر

$$\frac{dy}{dx} = -c_1 e^{-x} - 2c_2 \sin 2x + 2c_3 \cos 2x \quad \dots\dots(2)$$

دوسری مرتبہ تفرق کرنے پر

$$\frac{d^2y}{dx^2} = c_1 e^{-x} - 4c_2 \cos 2x - 4c_3 \sin 2x \quad \dots\dots(3)$$

اب دیا ہے $x = 0$ پر $y = 0$ اس لیے

$$c_1 + c_2 = 0 \quad \dots\dots(4)$$

$$\frac{dy}{dx} = -1 \text{ پر } x = 0$$

$$-c_1 + 2c_3 = -1 \quad \dots\dots(5)$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 5 \text{ پر } x = 0$$

$$c_1 - 4c_2 = 5 \quad \dots\dots(6)$$

مساوات (4)، (5) اور (6) کو حل کرنے پر ہمیں حاصل ہے

$$c_1 = 1, c_2 = -1, c_3 = 0$$

اس لیے دی گئی مساوات کا خاص حل ہوگا

$$y = e^{-x} - \cos 2x$$

مثال 12 مساوات $0 = 6x - 5 \frac{dx}{dt} - 2 \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d^3x}{dt^3}$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھنے پر

$$(D^3 + 2D^2 - 5D - 6)x = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ تیسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^3 + 2m^2 - 5m - 6 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m + 1) + m(m + 1) - 6(m + 1) = 0$$

$$\Rightarrow (m + 1)(m^2 + m - 6) = 0$$

$$\Rightarrow (m + 1)(m + 3)(m - 2) = 0$$

$$\Rightarrow m = -3, -1, 2$$

چوں کہ روٹس الگ الگ ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = c_1 e^{-3t} + c_2 e^{-t} + c_3 e^{2t}$$

مثال 13۔ مساوات $0 = \frac{d^3x}{dt^3} - 3\frac{d^2x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} + 3x$ کو حل کریے۔

حل۔ دی گئی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھنے پر

$$(D^3 - 3D^2 - D + 3)x = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ تیسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^3 - 3m^2 - m + 3 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m + 1) - 4m(m + 1) + 3(m + 1) = 0$$

$$\Rightarrow (m + 1)(m^2 - 4m + 3) = 0$$

$$\Rightarrow (m + 1)(m - 3)(m - 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, -1, 3$$

چوں کہ روٹس الگ الگ ہیں اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{3t}$$

مثال 14۔ حل کرو: $0 = \frac{d^4x}{dt^4} + 2\frac{d^3x}{dt^3} - 3\frac{d^2x}{dt^2} - 4\frac{dx}{dt} + 4x$

حل۔ دی گئی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھنے پر

$$(D^4 + 2D^3 - 3D^2 - 4D + 4)x = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ چوتھے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^4 + 2m^3 - 3m^2 - 4m + 4 = 0$$

$$\Rightarrow m^3(m - 1) + 3m^2(m - 1) - 4(m - 1) = 0$$

$$\Rightarrow (m - 1)(m^3 + 3m^2 - 4) = 0$$

$$\Rightarrow (m - 1)\{m^2(m - 1) + 4m(m - 1) + 4(m - 1)\} = 0$$

$$\Rightarrow (m - 1)(m - 1)\{m^2 + 4m + 4\} = 0$$

$$\Rightarrow (m - 1)^2(m + 2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, 1, -2, -2$$

اب دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = (c_1 + c_2 x)e^t + (c_3 + c_4 x)e^{-2t}$$

مثال 15۔ مساوات $\frac{d^4 x}{dt^4} + a^4 x = 0$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھنے پر

$$(D^4 + a^4)x = 0$$

یہ مساوات مستقل ضرب کے ساتھ چوتھے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل کی ہوگی

$$m^4 + a^4 = 0$$

$$\Rightarrow (m^2 + a^2)^2 - 2m^2 a^2 = 0$$

$$\Rightarrow (m^2 + a^2)^2 - (\sqrt{2}ma)^2 = 0$$

$$\Rightarrow (m^2 + a^2 - \sqrt{2}ma)(m^2 + a^2 + \sqrt{2}ma) = 0$$

اس لیے

$$m^2 + a^2 - \sqrt{2}ma = 0, m^2 + a^2 + \sqrt{2}ma = 0$$

اب

$$m^2 + a^2 - \sqrt{2}ma = 0$$

$$\Rightarrow m = \frac{\sqrt{2}a \pm \sqrt{2a^2 - 4a^2}}{2}$$

$$\Rightarrow m = \frac{a}{\sqrt{2}} \pm \frac{ai}{\sqrt{2}}$$

اسی طرح

$$m^2 + a^2 + \sqrt{2}ma = 0$$

$$\Rightarrow m = \frac{-\sqrt{2}a \pm \sqrt{2a^2 - 4a^2}}{2}$$

$$\Rightarrow m = \frac{-a}{\sqrt{2}} \pm \frac{ai}{\sqrt{2}}$$

اب دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$x = e^{\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)t} \left\{ c_1 \cos\left(\frac{a}{\sqrt{2}}t\right) + c_2 \sin\left(\frac{a}{\sqrt{2}}t\right) \right\} + e^{\left(-\frac{a}{\sqrt{2}}\right)t} \left\{ c_3 \cos\left(\frac{a}{\sqrt{2}}t\right) + c_4 \sin\left(\frac{a}{\sqrt{2}}t\right) \right\}$$

9.3 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی میں ہم نے متجانس تفرقی مساوات کی بنیادی جانکاری حاصل کی اور اس کا عام حل حاصل کرنا سیکھا نیز اس سے خاص حل کس طرح نکالا جاتا ہے یہ بھی سیکھا۔

9.4 کلیدی الفاظ (Key Words)

متجانس تفرقی مساوات، خطی تفرقی مساوات، رتبہ، اتمی تفاعل، معاون مساوات

9.5 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

9.5.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. فرض کرو کہ $f(D)y = 0$ مستقل ضریب کے ساتھ متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اگر $m_1 \neq m_2$ حاصل کردہ معاون مساوات کے دو روٹس ہوں، تب مساوات کا عام حل ہوگا $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$ (T/F)
2. فرض کرو کہ $f(D)y = 0$ مستقل ضریب کے ساتھ متجانس تفرقی مساوات ہے۔ مان لیجیے کہ $m_1 = \alpha + i\beta$ اور $m_2 = \alpha - i\beta$ حاصل کردہ معاون مساوات کے روٹس ہیں، تب $C.F. = e^{-\alpha x} \{A \cos \beta x + B \sin \beta x\}$ ہوگا۔ (T/F)

3. مساوات $\frac{d^3 x}{dt^3} + 3 \frac{d^2 x}{dt^2} + 3 \frac{dx}{dt} + x = 0$ کی معاون مساوات لکھو۔

4. مساوات $\frac{d^2 x}{dt^2} + 5 \frac{dx}{dt} + 6x = 0$ کی اتمی تفاعل معلوم کریں۔

9.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

1. حل کرو: $\frac{d^2 x}{dt^2} + 3 \frac{dx}{dt} + 2x = 0$

2. مساوات $\frac{d^3 x}{dt^3} - 3 \frac{d^2 x}{dt^2} + 2 \frac{dx}{dt} = 0$ کو حل کریں۔

3. مساوات $\frac{d^3 x}{dt^3} + 6 \frac{d^2 x}{dt^2} + 11 \frac{dx}{dt} + 6x = 0$ کا حل معلوم کریں۔

4. مساوات $\frac{d^3 x}{dt^3} - 3 \frac{d^2 x}{dt^2} - \frac{dx}{dt} + 3x = 0$ کا حل حاصل کریں۔

5. مساوات $\frac{d^3y}{dx^3} - 2\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} = 0$ کو حل کریں۔

6. مساوات $\frac{d^2x}{dt^2} - 6\frac{dx}{dt} + 9x = 0$ کو حل کریں۔

7. مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 10y = 0$ کو حل کریں۔

9.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. مساوات $3\frac{d^3x}{dt^3} + 5\frac{d^2x}{dt^2} - 2\frac{dx}{dt} = 0$ کو حل کریں۔

2. مساوات $\frac{d^3x}{dt^3} + 3\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + x = 0$ کا حل محسوب کریں۔

3. مساوات $\frac{d^4x}{dt^4} + 8\frac{d^2x}{dt^2} + 16x = 0$ کا حل معلوم کریں۔

4. مساوات $\frac{d^4y}{dx^4} - 6\frac{d^3y}{dx^3} + 12\frac{d^2y}{dx^2} - 8\frac{dy}{dx} = 0$ کو حل کریں۔

5. مساوات $\left(\frac{d^2y}{dx^2} + 1\right)^3 \left(\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + 1\right) = 0$ کو حل کریں۔

6. حل کرو: $\frac{d^3y}{dx^3} - 3\frac{d^2y}{dx^2} + 9\frac{dy}{dx} + 13y = 0$

7. مساوات $\left(\frac{d^2y}{dx^2} + 1\right)^2 = 0$ کا حل حاصل کریں۔

8. مساوات $\frac{d^3y}{dx^3} + 16\frac{dy}{dx} = 0$ کا حل معلوم کریں۔

9. رتبہ n کی متجانس تفرقی مساوات $f(D)y = 0$ کا حل حاصل کرنے کی سبھی صورتوں پر بحث کریں۔

10. اگر $y = y_1, y = y_2, \dots, y = y_n$ مساوات $f(D)y = 0$ کے n غیر تابع حل ہیں، تب ثابت کرو کہ

$$y = c_1y_1 + c_2y_2 + \dots + c_ny_n$$

بھی اس کا ایک حل ہوگا، جہاں $c_1, c_2, \dots, c_n$ اختیاری مستقل ہیں۔

11. اگر متجانس تفرقی مساوات کے r روٹس برابر ہوں، تب اس کا حل کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟

جوابات:

9.5.1 معروضی سوالات کے جوابات

1. (T)

2. (F)

3. $m^3 + 3m^2 + 3m + 1 = 0$

4. $y = c_1e^{-2x} + c_2e^{-3x}$

9.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

1. $x = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-t}$
2. $x = c_1 + c_2 e^t + c_3 e^{2t}$
3. $y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{-2x} + c_3 e^{-3x}$
4. $x = c_1 e^{-t} + c_2 e^t + c_3 e^{3t}$
5. $y = c_1 e^{-x} + c_2 + c_3 e^{3x}$
6. $y = (c_1 + c_2 x) e^{3x}$
7. $y = e^x (c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x)$

9.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

1. $x = c_1 + c_2 e^{-2t} + c_3 e^{\frac{1}{3}t}$
2. $x = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2) e^{-t}$
3. $x = (c_1 + c_2 t) \cos 2t + (c_3 + c_4 t) \sin 2t$
4. $y = c_1 + (c_2 + c_3 t + c_4 t^2) e^{2x}$
5. $y = e^{-\frac{x}{2}} \left[(c_1 + c_2 x) \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + (c_3 + c_4 x) \sin \frac{\sqrt{3}x}{2} \right]$
6. $y = c_1 e^{-x} + e^{2x} (c_2 \cos 3x + c_3 \sin 3x)$
7. $y = (c_1 + c_2 x) \cos x + (c_3 + c_4 x) \sin x$
8. $y = c_1 + c_2 \cos 4x + c_3 \sin 4x$

9.6 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhanian, S.Chand & Co., New Delhi
3. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume -I, V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company

اکائی 10۔ مستقل ضریب کی غیر متجانس خطی تفرقی مساواتوں کے خاص تکملے

(Particular Integral of Non – Homogeneous Linear
Differential Equations with Constant Coefficients)

اکائی کے اجزا

تمہید	10.0
مقاصد	10.1
مستقل ضریب کی غیر متجانس تفرقی مساواتوں کے خاص تکملے	10.2
خاص تکملہ $\left(\frac{1}{D-m} Q\right)$ حاصل کرنا	10.2.1
$f(D)y = Q$ کا خاص تکملہ	10.2.2
$f(D)y = e^{ax}$ کا خاص تکملہ	10.3
$f(D)y = \sin ax$ (یا $\cos ax$) کا خاص تکملہ	10.4
$f(D)y = x^m$ کا خاص تکملہ	10.5
$f(D)y = e^{ax} \cdot V$ کا خاص تکملہ	10.6
اکتسابی نتائج	10.7
کلیدی الفاظ	10.8
نمونہ امتحانی سوالات	10.9
معروضی جوابات کے حامل سوالات	10.9.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	10.9.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	10.9.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ مواد	10.10

10.0 تمہید (Introduction)

مان لیجیے کہ x کا ایک تفاعل $\frac{1}{f(D)} Q$ ہے۔ اس پر جب $f(D)$ کی مدد سے عمل کرایا جاتا ہے تو نتیجہ Q حاصل ہوتا ہے۔ چوں کہ $y = \frac{1}{f(D)} Q$ غیر متجانس تفرقی مساوات (Non Homogeneous Differential Equation) $f(D)y = Q$ کو مطمئن کرتی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\frac{1}{f(D)} Q$ غیر متجانس تفرقی مساوات $f(D)y = Q$ کا ایک خاص حل ہے۔ اب ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$f(D) \left(\frac{1}{f(D)} Q \right) = Q$$

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عامل $\frac{1}{f(D)}$ عامل $f(D)$ کا معکوس (Inverse) ہے۔

نوٹ:

$$\frac{1}{D} Q = \int Q dx \text{ اس لیے } \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{D} Q \right) = Q \text{ یا } D \left(\frac{1}{D} Q \right) = Q$$

10.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے پر آپ کو خاص تکملے کی بنیادی جانکاری حاصل ہو جائیگی نیز اس کو حاصل کرنے کی مختلف صورتوں کو سمجھتے ہوئے دی گئی غیر متجانس تفرقی مساوات کا حل حاصل کر سکیں گے۔

10.2 مستقل ضریب کی غیر متجانس تفرقی مساواتوں کے خاص تکملے

(Particular Integrals of Non Homogeneous Differential Equations with Constant Coefficients)

خاص تکملے کی درجہ ذیل دو صورتیں ہیں جن پر ہم بحث کریں گے۔

1. خاص تکملہ $\left(\frac{1}{D-m} Q \right)$ حاصل کرنا

2. $f(D)y = Q$ کا خاص تکملہ $\frac{1}{f(D)} Q$ حاصل کرنا

10.2.1 خاص تکملہ $\left(\frac{1}{D-m} Q \right)$ حاصل کرنا (Determining the Particular Integral $\frac{1}{D-m} Q$)

فرض کرو کہ $u = \frac{1}{D-m} Q$ ، تب

$$(D - m)u = (D - m) \left(\frac{1}{D - m} Q \right) = Q$$

$$\Rightarrow \frac{du}{dx} - mu = Q$$

جو کہ پہلے رتبے کی خطی تفرقی مساوات ہے جس کا حل درجہ ذیل ہے

$$ue^{-mx} = \int Q e^{-mx} dx$$

$$\Rightarrow u = e^{mx} \int Q e^{-mx} dx$$

$$\Rightarrow \frac{1}{D - m} Q = e^{mx} \int Q e^{-mx} dx$$

10.2.2 $f(D)y = Q$ کا خاص تکملہ (Particular Integral of $f(D)y = Q$)

اس کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں۔

پہلا طریقہ:

مان لیجیے کہ $f(D) = (D - m_1)(D - m_2) \cdots (D - m_n)$

تب

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(D)} Q &= \frac{1}{(D - m_1)(D - m_2) \cdots (D - m_n)} Q \\ &= \frac{1}{(D - m_1)(D - m_2) \cdots (D - m_{n-1})} \left(e^{m_n x} \int Q e^{-m_n x} dx \right) \end{aligned}$$

اسی طرز پر آگے بڑھنے پر ضروری خاص تکملہ حاصل ہو جاتا ہے۔

دوسرا طریقہ:

$$\frac{1}{f(D)} Q = \frac{1}{(D - m_1)(D - m_2) \cdots (D - m_n)} Q$$

جزوی کسروں (Partial Fractions) کی مدد سے

$$\frac{1}{f(D)} Q = \left\{ \frac{A_1}{(D - m_1)} + \frac{A_2}{(D - m_2)} + \dots + \frac{A_n}{(D - m_n)} \right\} Q$$

$$= A_1 e^{m_1 x} \int Q e^{-m_1 x} dx + A_2 e^{m_2 x} \int Q e^{-m_2 x} dx + \dots + A_n e^{m_n x} \int Q e^{-m_n x} dx$$

جو کہ ضروری خاص تکملہ ہے۔

$$\text{مثال 1۔ مساوات } \frac{d^2 x}{dt^2} - 5 \frac{dx}{dt} + 6x = e^{4t} \text{ کو حل کرو۔}$$

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقہ سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 - 5D + 6)x = e^{4t}$$

$$Q = e^{4t} \text{ اور } f(D) = D^2 - 5D + 6 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہے

$$m^2 - 5m + 6 = 0$$

⇒

$$(m - 2)(m - 3) = 0$$

⇒

$$m = 2, 3$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 - 5D + 6)x = 0$ کے لیے اتماتی تقاض (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^{2t} + c_2 e^{3t}$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{D^2 - 5D + 6} e^{4t}$$

$$= \frac{1}{(D - 2)(D - 3)} e^{4t}$$

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{1}{D - m} Q = e^{mt} \int Q e^{-mt} dt$ اس لیے

$$P.I. = \frac{1}{(D - 2)} \left\{ e^{3t} \int e^{4t} e^{-3t} dt \right\}$$

$$= \frac{1}{(D-2)} \left\{ e^{3t} \int e^t dt \right\}$$

$$= \frac{1}{(D-2)} \{ e^{3t} e^t \}$$

$$= \frac{1}{(D-2)} e^{4t}$$

$$= e^{2t} \int e^{4t} e^{-2t} dt$$

$$= e^{2t} \int e^{2t} dt$$

$$\Rightarrow P.I. = \frac{1}{2} e^{4t}$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ طریقہ سے حاصل ہوگا

$$x = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 e^{2t} + c_2 e^{3t} + \frac{1}{2} e^{4t}$$

مثال 2- مساوات $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{dx}{dt} - 2x = 2t$ کو حل کریں۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقہ سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 + D - 2)x = 2t$$

$$Q = 2t \text{ اور } f(D) = D^2 + D - 2 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + m - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (m+2)(m-1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, -2$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 + D - 2)x = 0$ کے لیے اتمامی تقاضا (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^t + c_2 e^{-2t}$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} Q \\ &= \frac{1}{D^2 + D - 2} e^{4t} \\ &= \frac{1}{(D+2)(D-1)} e^{4t} \end{aligned}$$

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{1}{D-m} Q = e^{mt} \int Q e^{-mt} dt$ اس لیے

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{(D+2)} \left\{ e^t \int 2te^{-t} dt \right\} \\ &= \frac{1}{(D+2)} 2e^t \left\{ -te^{-t} - \int (-1 \cdot e^{-t}) dt \right\} \\ &= \frac{1}{(D+2)} 2e^t (-te^{-t} - e^{-t}) \\ &= -\frac{1}{(D+2)} 2(t+1) \\ &= -2e^{-2t} \int (t+1) e^{2t} dt \\ &= -2e^{-2t} \left\{ (t+1) \frac{e^{2t}}{2} - \int \frac{e^{2t}}{2} dt \right\} \\ &= -2e^{-2t} \left\{ (t+1) \frac{e^{2t}}{2} - \frac{e^{2t}}{4} \right\} \\ &= -2e^{-2t} \frac{e^{2t}}{2} \left\{ (t+1) - \frac{1}{2} \right\} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$P.I. = -\left(t + \frac{1}{2}\right)$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل ہوگا

$$x = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 e^t + c_2 e^{-2t} - \left(t + \frac{1}{2}\right)$$

مثال 3- مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \sec x$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقہ سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 + 1)y = \sec x$$

$$Q = \sec x \text{ اور } f(D) = D^2 + 1 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + 1 = 0$$

$\Rightarrow$

$$m = \pm i$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 + 1)y = 0$ کے لیے انتہائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} Q \\ &= \frac{1}{D^2 + 1} \sec x \\ &= \frac{1}{(D + i)(D - i)} \sec x \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{(D - i)} - \frac{1}{(D + i)} \right] \sec x \\ &= \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{(D - i)} \sec x - \frac{1}{(D + i)} \sec x \right] \end{aligned}$$

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{1}{D-m} Q = e^{mt} \int Q e^{-mt} dt$ اس لیے

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{2i} \left[e^{ix} \int \sec x (e^{-ix}) dx - e^{-ix} \int \sec x (e^{ix}) dx \right] \\ &= \frac{1}{2i} \left[e^{ix} \int \frac{(\cos x - i \sin x)}{\cos x} dx - e^{-ix} \int \frac{(\cos x + i \sin x)}{\cos x} dx \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2i} \left[e^{ix} \int (1 - i \tan x) dx - e^{-ix} \int (1 + i \tan x) dx \right] \\
&= \frac{1}{2i} \left[e^{ix} (x + i \log \cos x) - e^{-ix} (x - i \log \cos x) \right] \\
&= \frac{1}{2i} \left[x(e^{ix} - e^{-ix}) + i \log \cos x (e^{ix} + e^{-ix}) \right] \\
&= x \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right) + \log \cos x \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)
\end{aligned}$$

⇒

$$P.I. = x \sin x + \cos x \log \cos x$$

اس لیے عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 \cos x + c_2 \sin x + x \sin x + \cos x \log \cos x$$

مثال 4- مساوات $e^x = y + 2 \frac{dy}{dx} - \frac{d^2y}{dx^2}$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ اس مساوات کو درجہ ذیل طریقہ سے لکھتے ہیں

$$(D^2 - 2D + 1)y = e^x$$

$$Q = e^x \text{ اور } f(D) = D^2 - 2D + 1 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 - 2m + 1 = 0$$

⇒

$$(m - 1)(m - 1) = 0$$

⇒

$$m = 1, 1$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 - 2D + 1)y = 0$ کے لیے اتماتی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 x)e^x$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{D^2 - 2D + 1} e^x$$

$$= \frac{1}{(D - 1)(D - 1)} e^x$$

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{1}{D-m} Q = e^{mx} \int Q e^{-mx} dx$ اس لیے

$$P.I. = \frac{1}{(D - 1)} \left\{ e^x \int e^x e^{-x} dx \right\}$$

$$= \frac{1}{(D - 1)} \left\{ e^x \int 1 dx \right\}$$

$$= \frac{1}{(D - 1)} x e^x$$

$$= e^x \int x e^x e^{-x} dx$$

$$= e^x \int x dx$$

$$\Rightarrow P.I. = \frac{x^2}{2} e^x$$

اس لیے عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2 x) e^x + \frac{x^2}{2} e^x$$

10.3 $f(D)y = e^{ax}$ کا خاص تکملہ (Particular Integral of $f(D)y = e^{ax}$)

1. جب $f(a) \neq 0$

متواتر تفرق (Successive Differentiation) کی مدد سے ہم حاصل کرتے ہیں

$$D e^{ax} = a e^{ax}$$

$$D^2 e^{ax} = D(D e^{ax}) = D(a e^{ax}) = a^2 e^{ax}$$

.....

.....

.....

$$D^n e^{ax} = a^n e^{ax}$$

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ

$$f(D)e^{ax} = f(a)e^{ax}$$

عامل $\frac{1}{f(D)}$ کی مدد سے دونوں طرف عمل کرنے پر

$$\frac{1}{f(D)}\{f(D)e^{ax}\} = \frac{1}{f(D)}\{f(a)e^{ax}\}$$

$\Rightarrow$

$$e^{ax} = \frac{1}{f(D)}\{f(a)e^{ax}\}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{1}{f(D)}e^{ax} = \frac{1}{f(a)}e^{ax}$$

2. جب $f(a) = 0$

اگر $f(a) = 0$ تب $f(D)$ کا ایک r ضربی $(D - a)$ ہو گا۔ مان لیجیے کہ

$$f(D) = (D - a)^r \varphi(D)$$

جب کہ $\varphi(a) \neq 0$ تب

$$\frac{1}{f(D)}e^{ax} = \frac{1}{(D - a)^r \varphi(D)}e^{ax}$$

$$= \frac{1}{(D - a)^r} \cdot \frac{1}{\varphi(a)}e^{ax}$$

$$= \frac{1}{\varphi(a)} \cdot \frac{x^r}{r!}e^{ax}$$

اس لیے جب $f(a) = 0$ تب $\frac{1}{f(D)}e^{ax} = \frac{1}{\varphi(a)} \cdot \frac{x^r}{r!}e^{ax}$ ہو گا۔

اب ہم کچھ مثالوں کی مدد سے اوپر دیے گئے طریقہ کو سمجھتے ہیں۔

مثال 1۔ مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} + 9y = 2e^{4x}$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقہ سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 - 6D + 9)y = 2e^{4x}$$

$\Rightarrow$

$$(D - 3)^2y = 2e^{4x}$$

یہاں $f(D) = (D - 3)^2$ اور $Q = 2e^{4x}$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$\Rightarrow (m - 3)^2 = 0$$

$$\Rightarrow m = 3, 3$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D - 3)^2 y = 0$ کے لیے اتمائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{(D - 3)^2} 2e^{4x}$$

ہم جانتے ہیں کہ جب $f(a) \neq 0$ تب $\frac{1}{f(D)} e^{ax} = \frac{1}{f(a)} e^{ax}$ اس لیے

$$P.I. = \frac{1}{(4 - 3)^2} 2e^{4x}$$

$$\Rightarrow P.I. = 2e^{4x}$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ طریقہ سے حاصل ہوگا

$$x = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2 x)e^{3x} + 2e^{4x}$$

مثال 2۔ مساوات $e^{5x} = 2y + 3 \frac{dy}{dx} - \frac{d^2 y}{dx^2}$ کو حل کرو۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 - 3D + 2)y = e^{5x}$$

$$\Rightarrow (D - 1)(D - 2)y = e^{5x}$$

$$Q = e^{5x} \text{ اور } f(D) = D^2 - 3D + 2 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$\Rightarrow (m - 1)(m - 2) = 0$$

⇒

$$m = 1, 2$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 - 3D + 2)y = 0$ کے لیے اتمائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{(D-1)(D-2)} e^{5x}$$

ہم جانتے ہیں کہ جب $f(a) \neq 0$ تب $\frac{1}{f(D)} e^{ax} = \frac{1}{f(a)} e^{ax}$ اس لیے

$$P.I. = \frac{1}{(5-1)(5-2)} e^{5x}$$

⇒

$$P.I. = \frac{1}{12} e^{5x}$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ طریقہ سے حاصل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 e^x + c_2 e^{2x} + \frac{1}{12} e^{5x}$$

مثال 3- مساوات $e^{ax} = \frac{d^2 y}{dx^2} - 2a \frac{dy}{dx} + a^2 y$ کو حل کریں۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقہ سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 - 2aD + a^2)y = e^{ax}$$

⇒

$$(D - a)^2 y = e^{ax}$$

$$Q = e^{ax} \text{ اور } f(D) = (D - a)^2 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

⇒

$$(m - a)^2 = 0$$

⇒

$$m = a, a$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D - a)^2 y = 0$ کے لیے اتمی تقاضا (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 x)e^{ax}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{(D - a)^2} e^{ax}$$

ہم جانتے ہیں کہ جب $f(a) = 0$ تب $\frac{1}{f(D)} e^{ax} = \frac{1}{\varphi(a)} \cdot \frac{x^r}{r!} e^{ax}$ جب کہ $\varphi(a) \neq 0$ اس لیے

$$P.I. = \frac{x^2}{2!} e^{ax}$$

$\Rightarrow$

$$P.I. = \frac{x^2}{2} e^{ax}$$

اس لیے عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2 x)e^{ax} + \frac{x^2}{2} e^{ax}$$

مثال 4- مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} - 4 \frac{dy}{dx} + 3y = 2e^{3x}$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقہ سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 - 4D + 3)y = 2e^{3x}$$

$\Rightarrow$

$$(D - 1)(D - 3)y = 2e^{3x}$$

$$Q = 2e^{3x} \text{ اور } f(D) = D^2 - 4D + 3 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$\Rightarrow$

$$(m - 1)(m - 3) = 0$$

$\Rightarrow$

$$m = 1, 3$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 - 4D + 3)y = 0$ کے لیے اتمائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^x + c_2 e^{3x}$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} Q \\ &= \frac{1}{(D-1)(D-3)} 2e^{3x} \end{aligned}$$

چوں کہ $f(3) = 0$ ، اس لیے

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{(3-1)(D-3)} 2e^{3x} \\ &= \frac{1}{(D-3)^1} e^{3x} \\ &= \frac{x^1}{1!} e^{3x} = x e^{3x} \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل طریقہ سے حاصل ہوگا

$$\begin{aligned} y &= C.F. + P.I. \\ &= c_1 e^x + c_2 e^{3x} + x e^{3x} \end{aligned}$$

مثال 5۔ مساوات $\frac{d^4 y}{dx^4} - 18 \frac{d^2 y}{dx^2} + 81y = 36e^{3x}$ کو حل کرو۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقہ سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^4 - 18D^2 + 81)y = 36e^{3x}$$

$\Rightarrow$

$$(D^2 - 9)(D^2 - 9)y = 36e^{3x}$$

$$Q = 36e^{3x} \text{ اور } f(D) = D^4 - 18D^2 + 81 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$\Rightarrow$

$$(m^2 - 9)(m^2 - 9) = 0$$

$\Rightarrow$

$$m^2 = 9, 9$$

⇒

$$m = \pm 3, \pm 3$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^4 - 18D^2 + 81)y = 0$ کے لیے اتنامی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2x)e^{3x} + (c_3 + c_4x)e^{-3x}$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} Q \\ &= \frac{1}{(D^2 - 9)(D^2 - 9)} 36e^{3x} \\ &= \frac{1}{(D - 3)^2(D + 3)^2} 36e^{3x} \end{aligned}$$

چوں کہ $f(3) = 0$ ، اس لیے

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{(D - 3)^2(3 + 3)^2} 36e^{3x} \\ &= \frac{1}{(D - 3)^2} e^{3x} \\ &= \frac{x^2}{2!} e^{3x} \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل طریقے سے حاصل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2x)e^{3x} + (c_3 + c_4x)e^{-3x} + \frac{x^2}{2!} e^{3x}$$

10.4 $f(D)y = \sin ax$ (یا $\cos ax$) کا خاص تکملہ

(Particular Integral of $f(D)y = \sin ax$ (یا $\cos ax$))

متواتر تفریق (Successive Differentiation) کی مدد سے ہم حاصل کرتے ہیں

$$D \sin ax = a \cos ax$$

$$D^2 \sin ax = D(D \sin ax) = D(a \cos ax) = -a^2 \sin ax$$

$$D^3 \sin ax = D(D^2 \sin ax) = D(-a^2 \sin ax) = -a^3 \cos ax$$

$$D^4 \sin ax = D(D^3 \sin ax) = D(-a^3 \cos ax) = a^4 \sin ax$$

$$\begin{array}{ccc} \dots\dots & \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots & \dots\dots \\ \dots\dots & \dots\dots & \dots\dots \end{array}$$

$$D^n \sin ax = (-a^2)^n \sin ax$$

اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر D کی صرف جفت قوت میں موجود ہوں تب اسے $\varphi(D^2)$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ تب

$$\varphi(D^2) \sin ax = \varphi(-a^2) \sin ax$$

عامل $\frac{1}{\varphi(D^2)}$ کی مدد سے دونوں طرف عمل کرنے پر

$$\frac{1}{\varphi(D^2)} \{\varphi(D^2) \sin ax\} = \frac{1}{\varphi(D^2)} \{\varphi(-a^2) \sin ax\}$$

$$\Rightarrow \sin ax = \varphi(-a^2) \left\{ \frac{1}{\varphi(D^2)} \sin ax \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\varphi(D^2)} \sin ax = \frac{1}{\varphi(-a^2)} \sin ax$$

اسی طرح

$$\Rightarrow \frac{1}{\varphi(D^2)} \cos ax = \frac{1}{\varphi(-a^2)} \cos ax$$

نوٹ: اگر $\varphi(-a^2) = 0$ اوپر دیا گیا طریقہ ناکام ہو جاتا ہے۔

اب ہم کچھ مثالوں کی مدد سے اوپر دیے گئے طریقہ کو سمجھتے ہیں۔

مثال 1۔ مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = \cos 3x$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 + 4)y = \cos 3x$$

یہاں $f(D) = D^2 + 4$ اور $Q = \cos 3x$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + 4 = 0$$

⇒

$$m = \pm 2i$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 + 4)y = 0$ کے لیے اتمی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{D^2 + 4} \cos 3x$$

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{1}{\varphi(D^2)} \cos ax = \frac{1}{\varphi(-a^2)} \cos ax$ اس لیے

$$P.I. = \frac{1}{-9 + 4} \cos 3x$$

$$= \frac{1}{-5} \cos 3x$$

اس لیے عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x - \frac{1}{5} \cos 3x$$

مثال 2- مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \sin 2x$ کو حل کرو۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 + 1)y = \sin 2x$$

یہاں $f(D) = D^2 + 1$ اور $Q = \sin 2x$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + 1 = 0$$

⇒

$$m = \pm i$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 + 1)y = 0$ کے لیے اتمی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{D^2 + 1} \sin 2x$$

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{1}{\varphi(D^2)} \sin ax = \frac{1}{\varphi(-a^2)} \sin ax$ اس لیے

$$P.I. = \frac{1}{-4 + 1} \sin 2x$$

$$= \frac{1}{-3} \sin 2x$$

اس لیے عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{3} \sin 2x$$

مثال 3- مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} - 3y = 2e^{2x} + 3 \sin x$ کو حل کریں۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 - 2D - 3)y = 2e^{2x} + 3 \sin x$$

⇒

$$(D + 1)(D - 3)y = 2e^{2x} + 3 \sin x$$

یہاں $Q = 2e^{2x} + 3 \sin x$ اور $f(D) = D^2 - 2D - 3$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

⇒

$$(m + 1)(m - 3) = 0$$

⇒

$$m = -1, 3$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 - 2D - 3)y = 0$ کے لیے اتمائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x}$$

اب ہم خاص تکملہ حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned}
 P.I. &= \frac{1}{f(D)} Q \\
 &= \frac{1}{D^2 - 2D - 3} (2e^{2x} + 3 \sin x) \\
 &= \left(\frac{1}{D^2 - 2D - 3} 2e^{2x} + \frac{1}{D^2 - 2D - 3} 3 \sin x \right) \\
 &= \left(\frac{1}{2^2 - 2 \times 2 - 3} 2e^{2x} + \frac{1}{-(1)^2 - 2D - 3} 3 \sin x \right) \\
 &= \left(-\frac{2}{3} e^{2x} + \frac{1}{-2(D+2)} 3 \sin x \right) \\
 &= \left(-\frac{2}{3} e^{2x} - \frac{3}{2(D+2)(D-2)} \sin x \right) \\
 &= \left(-\frac{2}{3} e^{2x} - \frac{3}{2(D^2 - 4)} \sin x \right) \\
 &= \left(-\frac{2}{3} e^{2x} - \frac{3}{2(-1)^2 - 4} \sin x \right) \\
 &= \left(-\frac{2}{3} e^{2x} + \frac{3}{10} (D-2) \sin x \right) \\
 &= -\frac{2}{3} e^{2x} + \frac{3}{10} \left(\frac{d}{dx} \sin x - 2 \sin x \right) \\
 &= -\frac{2}{3} e^{2x} + \frac{3}{10} (\cos x - 2 \sin x)
 \end{aligned}$$

اس لیے دی تفرقی مساوات کا عام حل درجہ ذیل طریقے سے حاصل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 e^{-x} + c_2 e^{3x} - \frac{2}{3} e^{2x} + \frac{3}{10} (\cos x - 2 \sin x)$$

(Particular Integral of $f(D)y = x^m$) تکملہ $f(D)y = x^m$ 10.5

اس کو حاصل کرنے کے لیے درجہ ذیل طریقہ استعمال کرتے ہیں

1. ہم $f(D)$ میں سے سب سے کم درجہ کی رکن کو باہر لیتے ہیں تاکہ ڈنومینٹر (Denominator) میں ذیل صورت بن جائے

$$[1 + \varphi(D)]^n \text{ یا } [1 - \varphi(D)]^n, \text{ جہاں } n \text{ ایک مثبت صحیح اعداد (Positive Integer) ہے۔}$$

2. اب اس جز ضربی کو نیومریٹر (Numerator) میں لے جاتے ہیں جو کہ ذیل صورت میں ہوگا $[1 + \varphi(D)]^{-n}$ یا

$$[1 - \varphi(D)]^{-n}$$

3. اب دور کنی قضیہ (Binomial Theorem) کی مدد سے $[1 \pm \varphi(D)]^{-n}$ کی توسیع کرتے ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots$$

سوالوں کو آسانی کے ساتھ حل کرنے کے لیے کچھ ضابطے ذیل ہیں:

$$(1 + x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad 1.$$

$$(1 - x)^{-1} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots \quad 2.$$

$$(1 + x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \dots \quad 3.$$

$$(1 - x)^{-2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots \quad 4.$$

چوں کہ x^m کے سبھی m سے زیادہ رتبہ کے مشتق صفر ہو جاتے ہیں، اس لیے $[1 + \varphi(D)]^{-n}$ کو D^m تک ہی توسیع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی $\frac{1}{f(D)}$ کو جزوی کسروں میں تبدیل کر خاص تکملہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس کے ہر ایک جز کو D کی گھٹتی ہوئی قوت میں توسیع کرنے کے بعد اوپر دیے گئے طریقہ کے مطابق خاص تکملہ حاصل کر لیتے ہیں۔

$$\text{مثال 1۔ مساوات } \frac{d^2y}{dx^2} - 4y = x^2 \text{ کو حل کرو۔}$$

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 - 4)y = x^2$$

$$\text{یہاں } f(D) = D^2 - 4 \text{ اور } Q = x^2$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 - 4 = 0$$

$\Rightarrow$

$$m = \pm 2$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 - 4)y = 0$ کے لیے اتمی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} Q \\ &= \frac{1}{D^2 - 4} x^2 \\ &= -\frac{1}{4} \frac{1}{\left(1 - \frac{D^2}{4}\right)} x^2 \\ &= -\frac{1}{4} \left(1 - \frac{D^2}{4}\right)^{-1} x^2 \end{aligned}$$

دور کئی قضیہ (Binomial Theorem) کی مدد سے ہمیں حاصل ہوگا

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{4} \left\{ 1 + \frac{D^2}{4} + \left(\frac{D^2}{4}\right)^2 + \dots \right\} x^2 \\ &= -\frac{1}{4} \left\{ x^2 + \frac{D^2 x^2}{4} + \frac{D^4 x^2}{16} + \dots \right\} \\ &= -\frac{1}{4} \left\{ x^2 + \frac{2}{4} + 0 + \dots \right\} \\ &= -\frac{1}{8} (2x^2 + 1) \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x} - \frac{1}{8} (2x^2 + 1)$$

مثال 2- مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = x + \sin x$ کا حل معلوم کریں۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 + D - 2)y = x + \sin x$$

یہاں $Q = x + \sin x$ اور $f(D) = D^2 + D - 2$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + m - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (m + 2)(m - 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, -2$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 + D - 2)y = 0$ کے لیے اتماتی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^x + c_2 e^{-2x}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} Q \\ &= \frac{1}{D^2 + D - 2} (x + \sin x) \\ &= \frac{1}{D^2 + D - 2} x + \frac{1}{D^2 + D - 2} \sin x \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{\left(1 - \frac{D^2 + D}{2}\right)} x + \frac{1}{-(1)^2 + D - 2} \sin x \\ &= -\frac{1}{2} \left(1 - \frac{D^2 + D}{2}\right)^{-1} x + \frac{1}{D - 3} \sin x \\ &= -\frac{1}{2} \left\{1 + \frac{D^2 + D}{2} + \left(\frac{D^2 + D}{2}\right)^2 + \dots\right\} x + \frac{D + 3}{(D - 3)(D + 3)} \sin x \\ &= -\frac{1}{2} \left\{x + \frac{D^2 + D}{2} x + \left(\frac{D^2 + D}{2}\right)^2 x + \dots\right\} + \frac{D + 3}{D^2 - 9} \sin x \\ &= -\frac{1}{2} \left(x + \frac{0 + 1}{2} + 0 + \dots\right) + \frac{D + 3}{-(1)^2 - 9} \sin x \\ &= -\frac{1}{4} (2x + 1) - \frac{1}{10} (D \sin x + 3 \sin x) \end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{4}(2x + 1) - \frac{1}{10}(\cos x + 3 \sin x)$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 e^x + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{4}(2x + 1) - \frac{1}{10}(\cos x + 3 \sin x)$$

مثال 3۔ مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = x^3 + 2x^2$ کو حل کرو۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^2 + D + 1)y = x^3 + 2x^2$$

$$Q = x^3 + 2x^2 \text{ اور } f(D) = D^2 + D + 1 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + m + 1 = 0$$

⇒

$$m = \frac{-1 \pm \sqrt{1-4}}{2}$$

$$= -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 + D + 1)y = 0$ کے لیے اتمی تقابل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = e^{-\frac{1}{2}x} \left(c_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + c_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{D^2 + D + 1} (x^3 + 2x^2)$$

$$= \frac{1}{(1 + D^2 + D)} (x^3 + 2x^2)$$

$$\begin{aligned}
&= \{1 + (D^2 + D)\}^{-1}(x^3 + 2x^2) \\
&= [1 - (D^2 + D) + \{(D^2 + D)\}^2 - \{(D^2 + D)\}^3 + \dots](x^3 + 2x^2) \\
&= (1 - D^2 - D + D^4 + 2D^3 + D^2 - D^6 - D^3 - 3D^4 - 3D^5 + \dots)(x^3 + 2x^2) \\
&= \{x^3 + 2x^2 - D(x^3 + 2x^2) + D^3(x^3 + 2x^2)\} \\
&= \{x^3 + 2x^2 - 3x^2 - 4x + (6 + 0)\} \\
&= x^3 - x^2 - 4x + 6
\end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= e^{-\frac{1}{2}x} \left(c_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + c_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + x^3 - x^2 - 4x + 6$$

مثال 4۔ مساوات $\frac{d^4y}{dx^4} - \frac{d^2y}{dx^2} = 6$ کو حل کریں۔

حل۔ اس مساوات کو ہم درجہ ذیل طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں

$$(D^4 - D^2)y = 6$$

یہاں $f(D) = D^4 - D^2$ اور $Q = 6$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^4 - m^2 = 0$$

$$\Rightarrow m^2(m^2 - 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 0, 0, 1, -1$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^4 - D^2)y = 0$ کے لیے اتمائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2x)e^0 + (c_3e^x + c_4e^{-x})$$

$$= c_1 + c_2x + (c_3e^x + c_4e^{-x})$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)}Q$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{D^4 - D^2} 6x^0 \\
&= \frac{6}{-D^2} \left(\frac{1}{1 - D^2} \right) x^0 \\
&= -\frac{6}{D^2} [1 - D^2]^{-1} x^0 \\
&= -\frac{6}{D^2} [1 + (D^2) + \dots] x^0 \\
&= -\frac{6}{D^2} (x^0 - D^2 x^0 + \dots) \\
&= -\frac{6}{D^2} (1 - 0 + \dots) \\
&= -\frac{6}{D} \int 1 dx \\
&= -6 \int x dx \\
&= -6 \frac{x^2}{2} \\
&= -3x^2
\end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 + c_2 x + (c_3 e^x + c_4 e^{-x}) - 3x^2$$

(Particular Integral of $f(D)y = e^{ax} \cdot V$) تکملہ $f(D)y = e^{ax} \cdot V$ 10.6

مان لیجیے کہ x کا کوئی تفاعل v ہے۔ متواتر تفرق (Successive Differentiation) کی مدد سے ہم حاصل کرتے ہیں

$$\begin{aligned}
D(e^{ax} \cdot v) &= e^{ax} \cdot Dv + ae^{ax} \cdot v \\
&= e^{ax}(D + a)v \\
D^2(e^{ax} \cdot v) &= D\{e^{ax}(D + a)v\} \\
&= e^{ax} \cdot D(D + a)v + ae^{ax}(D + a)v \\
&= e^{ax}(D + a)^2 v \\
D^3(e^{ax} \cdot v) &= D\{e^{ax}(D + a)^2 v\} \\
&= e^{ax} \cdot D(D + a)^2 v + ae^{ax}(D + a)^2 v \\
&= e^{ax}(D + a)^3 v \\
&\dots\dots\dots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \dots\dots\dots \\ & \dots\dots\dots \\ & D^n(e^{ax} \cdot v) = e^{ax}(D + a)^n v \end{aligned}$$

اس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ

$$f(D)e^{ax} \cdot v = e^{ax} \cdot f(D + a)v \quad \dots\dots\dots(1)$$

مان لیجیے کہ $f(D + a)v = V$ تب چوں کہ x کا تفاعل v ہے، تب V بھی x کا ایک تفاعل ہوگا۔ اس لیے

$$v = \frac{1}{f(D + a)} V$$

اس لیے، مساوات (1) سے

$$f(D)e^{ax} \frac{1}{f(D + a)} V = e^{ax} \cdot f(D + a) \frac{1}{f(D + a)} V = e^{ax} \cdot V$$

عامل $\frac{1}{f(D)}$ کی مدد سے دونوں طرف عمل کرنے پر

$$\frac{1}{f(D)} e^{ax} \cdot V = \frac{1}{f(D)} \left\{ f(D)e^{ax} \frac{1}{f(D + a)} V \right\}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(D)} e^{ax} \cdot V = e^{ax} \frac{1}{f(D + a)} V$$

مثال 1۔ مساوات $(D - 2)^3 y = x^2 e^{2x}$ کو حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D - 2)^3 y = x^2 e^{2x}$$

یہاں $f(D) = (D - 2)^3$ اور $Q = x^2 e^{2x}$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$(m - 2)^3 = 0$$

$$\Rightarrow m = 2, 2, 2$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 + 4)y = 0$ کے لیے اتمائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 x + c_3 x^2) e^{2x}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{(D-2)^3} x^2 e^{2x}$$

ہم جانتے ہیں کہ $e^{ax} \frac{1}{f(D)} e^{ax} \cdot V = e^{ax} \frac{1}{f(D+a)} V$ اس لیے

$$= e^{2x} \frac{1}{(D+2-2)^3} x^2$$

$$= e^{2x} \frac{1}{D^3} x^2$$

$$= e^{2x} \int \int \int x^2 dx$$

$$= e^{2x} \int \int \frac{x^3}{3} dx$$

$$= e^{2x} \int \frac{x^4}{12} dx$$

$$= e^{2x} \frac{x^5}{60}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل ہو گا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2 x + c_3 x^2) e^{2x} + \frac{1}{60} x^5 e^{2x}$$

مثال 2۔ مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + 5y = e^{2x} \sin x$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^2 - 2D + 5)y = e^{2x} \sin x$$

یہاں $f(D) = D^2 - 2D + 5$ اور $Q = e^{2x} \sin x$ اور $a = 2$ ہے۔

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درج ذیل ہوگی

$$(m^2 - 2m + 5) = 0$$

$$\Rightarrow m = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2}$$

$$\Rightarrow m = 1 \pm 2i$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 - 2D + 5)y = 0$ کے لیے انتہائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = e^x (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q$$

$$= \frac{1}{D^2 - 2D + 5} e^{2x} \sin x$$

ہم جانتے ہیں کہ $\frac{1}{f(D)} e^{ax} \cdot V = e^{ax} \frac{1}{f(D+a)} V$ اس لیے

$$P.I. = e^{2x} \frac{1}{(D+2)^2 - 2(D+2) + 5} \sin x$$

$$= e^{2x} \frac{1}{D^2 + 2D + 5} \sin x$$

D^2 کی جگہ $-(1)^2$ درج کرنے پر

$$= e^{2x} \frac{1}{-(1)^2 + 2D + 5} \sin x$$

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \frac{D - 2}{(D+2)(D-2)} \sin x$$

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \frac{D - 2}{(D^2 - 4)} \sin x$$

D^2 کی جگہ $-(1)^2$ درج کرنے پر

$$= \frac{1}{2} e^{2x} \frac{D - 2}{-(1)^2 - 4} \sin x$$

$$= -\frac{1}{10} e^{2x} (D \sin x - 2 \sin x)$$

$$= -\frac{1}{10} e^{2x} (\cos x - 2 \sin x)$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= e^x (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x) - \frac{1}{10} e^{2x} (\cos x - 2 \sin x)$$

مثال 3- مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + y = x \sin x$ کو حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(D^2 + 2D + 1)y = x \sin x$$

$$Q = x \sin x \text{ اور } f(D) = D^2 + 2D + 1 \text{ یہاں}$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$(m^2 + 2m + 1) = 0$$

$\Rightarrow$

$$m = -1, -1$$

اس لیے دی گئی مساوات $(D^2 + 2D + 1)y = 0$ کے لیے اتمی تقابل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 x)e^{-x}$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} Q \\ &= \frac{1}{D^2 + 2D + 1} x \sin x \\ &= \frac{1}{(D + 1)^2} x e^{ix} \text{ کا خیالی حصہ} \\ &= e^{ix} \frac{1}{(D + i + 1)^2} x \text{ کا خیالی حصہ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{ix} \left(\frac{1}{1+i} \right)^2 \left\{ \frac{1}{\left(1 + \frac{D}{i+1} \right)^2} \right\} x \\
&= e^{ix} \frac{1}{2i} \left(1 + \frac{D}{i+1} \right)^{-2} x \\
&= e^{ix} \frac{i}{2i^2} \left(1 - \frac{2D}{i+1} + \frac{3D^2}{(i+1)^2} - \dots \right) x \\
&= e^{ix} \frac{-1}{2} i \left(x - \frac{2Dx}{i+1} + \frac{3D^2x}{(i+1)^2} - \dots \right) \quad [\because i^2 = -1] \\
&= e^{ix} \frac{-1}{2} i \left(x - \frac{2}{i+1} + 0 \right) \\
&= e^{ix} \frac{-1}{2} i \left(x - \frac{2(1-i)}{1-i^2} \right) \\
&= e^{ix} \frac{-1}{2} \{ i(x-1) - 1 \} \quad [\because i^2 = -1] \\
&= \frac{-1}{2} (\cos x + i \sin x) \{ i(x-1) - 1 \} \\
&= \frac{-1}{2} [\{ -\cos x - (x-1) \sin x \} + i \{ (x-1) \cos x - \sin x \}] \\
&= \frac{-1}{2} \{ (x-1) \cos x - \sin x \} \\
&= \frac{1}{2} \{ (1-x) \cos x + \sin x \}
\end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2 x) e^{-x} + \frac{1}{2} \{ (1-x) \cos x + \sin x \}$$

10.7 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

کسی تفرقی مساوات $f(D)y = Q$ کا خاص تکملہ دو طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$1. \text{ مان لیجیے کہ } f(D) = D - m \text{ تب خاص تکملہ } \frac{1}{D-m} Q = e^{mx} \int Q e^{-mx} dx$$

2. مان لیجیے کہ $f(D) = (D - m_1)(D - m_2) \cdots (D - m_n)$ تب خاص حل

$$\frac{1}{(D - m_1)(D - m_2) \cdots (D - m_n)} Q = \frac{1}{(D - m_1)(D - m_2) \cdots (D - m_{n-1})} e^{m_n x} \int Q e^{-m_n x} dx$$

اسی انداز میں آگے بڑھنے پر ضروری خاص تکملہ حاصل ہو جتا ہے۔

اوپر دی گئی صورت میں ہم درجہ ذیل طریقہ سے بھی دی تفرقی مساوات کا خاص تکملہ حاصل کر سکتے ہیں

$$\begin{aligned} \frac{1}{(D - m_1)(D - m_2) \cdots (D - m_n)} Q &= \left\{ \frac{A_1}{D - m_1} + \frac{A_2}{D - m_2} + \cdots + \frac{A_n}{D - m_n} \right\} Q \\ &= \left\{ A_1 e^{m_1 x} \int Q e^{-m_1 x} dx + A_2 e^{m_2 x} \int Q e^{-m_2 x} dx + \cdots + A_n e^{m_n x} \int Q e^{-m_n x} dx \right\} \end{aligned}$$

3. جب $Q = e^{ax}$ اور $f(a) \neq 0$ تب خاص حل

$$\frac{1}{f(D)} e^{ax} = \frac{1}{f(a)} e^{ax}$$

اگر $Q = e^{ax}$ اور $f(a) = 0$ ہے، تب $f(D)$ کا ایک جزو ضربی $D - a$ ہوگا، تب ہم مان لیتے ہیں کہ

$$f(D) = (D - a)^k \varphi(D)$$

جہاں $\varphi(a) \neq 0$ تب خاص حل

$$\frac{1}{f(D)} e^{ax} = \frac{1}{\varphi(a)} \cdot \frac{x^k}{k!} e^{ax}$$

4. جب $Q = \sin ax$ تب خاص حل

اگر D کی صرف جفت قوت $f(D)$ میں موجود ہوں تو اسے $\varphi(D^2)$ سے ظاہر کرتے ہیں تب

$$\frac{1}{\varphi(D^2)} \sin ax = \frac{1}{\varphi(-a^2)} \sin ax$$

اور اسی طرح

$$\frac{1}{\varphi(D^2)} \cos ax = \frac{1}{\varphi(-a^2)} \cos ax$$

5. جب $Q = e^{ax} \cdot V$ جب کہ x کا قائل V ہو

$$\frac{1}{f(D)} e^{ax} \cdot V = e^{ax} \frac{1}{f(D + a)} V$$

10.8 کلیدی الفاظ (Key Words)

10.9 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

10.9.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + y = x \sin x$ کا معاون مساوات لکھو۔
2. مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \cos 2x$ کے لیے اتمائی تفاعل لکھو۔
3. اگر کسی تفرقی مساوات کے سبھی روٹس الگ الگ ہوں تو ان کے لیے اتمائی تفاعل کا عام ضابطہ لکھو۔
4. اگر رتبہ تین کی تفرقی مساوات کے سبھی روٹس برابر ہوں تو ان کے لیے اتمائی تفاعل کا عام ضابطہ لکھو۔
5. اگر رتبہ دو کی تفرقی مساوات کے روٹس $\alpha \pm i\beta$ ہوں تو ان کے لیے اتمائی تفاعل کا عام ضابطہ لکھو۔

10.9.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

کسی مناسب طریقہ سے درجہ ذیل تفرقی مساوات کا حل معلوم کرو:

1. $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \cos 2x$
2. $\frac{d^2y}{dx^2} + a^2y = \sec ax$
3. $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = \tan 2x$
4. $\frac{d^2y}{dx^2} - y = e^x$
5. $\frac{d^2y}{dx^2} + 9y = \sec 3x$
6. $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \sec^2 x$
7. $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \sin 2x$
8. $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} - 4y = 6e^x$
9. $\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 4y = e^{2x}$
10. $\frac{d^2y}{dx^2} \left(\frac{dy}{dx} + 1 \right) \left(\frac{dy}{dx} - 1 \right)^3 y = 12e^x$
11. $3\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 14y = e^{2x}$
12. $\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} + y = e^{-x}$
13. $\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} - 4y = 5e^x$

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} - 4y &= 3e^x + \sin 2x \quad .14 \\ \frac{d^3y}{dx^3} + \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} - y &= 25 \cos 2x \quad .15 \\ \frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 4y &= \sin 2x \quad .16 \\ \frac{d^4y}{dx^4} - y &= 15 \sin 2x \quad .17 \\ \frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y &= \cos 3x \quad .18 \\ \frac{d^2y}{dx^2} + 16y &= 24 \sin 4x \quad .19 \end{aligned}$$

10.9.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=0} = 4 \text{ اور } y(0) = 2 \text{ دیا ہے کہ } \frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 2e^x - 10 \sin x \quad .1$$

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=0} = -2 \text{ اور } y(0) = 1 \text{ دیا ہے کہ } \frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} + 13y = 5 \sin 2x \quad .2$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} + 8y = x^4 + 2x + 1 \text{ کو حل کرو۔} \quad .3$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 6y = 6x \text{ کو حل کرو۔} \quad .4$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} + 3\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} = 2x^2 \text{ کو حل کرو۔} \quad .5$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 5\frac{dy}{dx} + 6y = x \text{ کو حل کرو۔} \quad .6$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 2y = 2x \text{ کو حل کرو۔} \quad .7$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} - \frac{d^2y}{dx^2} - 6\frac{dy}{dx} = 1 + x^2 \text{ کو حل کرو۔} \quad .8$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = e^{2x} + x^2 + x \text{ کو حل کرو۔} \quad .9$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = 2x^2 + 1 \text{ کو حل کرو۔} \quad .10$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=0} = 0 \text{ اور } x(0) = 0 \text{ دیا ہے کہ } \frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 5x = 10 \quad .11$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = e^{2x} \sin x \text{ کو حل کرو۔} \quad .12$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = e^x \text{ کو حل کرو۔} \quad .13$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 4y = x^3 e^{2x} \text{ کو حل کرو۔} \quad .14$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} - 2y = e^x \text{ کو حل کرو۔} \quad .15$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - y = e^x \sin 3x \text{ کو حل کرو۔} \quad .16$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = x^2 e^{3x} \text{ کو حل کرو۔} \quad .17$$

$$\frac{d^3y}{dx^3} + 3\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + y = x^2 e^{-x} \text{ کو حل کرو۔} \quad .18$$

$$\begin{aligned}
19. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} - y = 8xe^x \text{ کو حل کرو۔} \\
20. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + 4y = e^x \sin 2x \text{ کو حل کرو۔} \\
21. \quad & \frac{d^3y}{dx^3} + 3\frac{d^2y}{dx^2} - 4y = xe^{-2x} \text{ کو حل کرو۔} \\
22. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 3y = e^x \cos 2x + \cos 3x \text{ کو حل کرو۔} \\
23. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 4y = e^x \cos x \text{ کو حل کرو۔} \\
24. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} + 4y = x \sin x \text{ کو حل کرو۔} \\
25. \quad & \frac{d^3y}{dx^3} - 7\frac{dy}{dx} - 6y = e^{2x}(1+x) \text{ کو حل کرو۔} \\
26. \quad & \frac{d^4y}{dx^4} - y = x^2 \sin x \text{ کو حل کرو۔} \\
27. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} - 12y = e^{2x}(x-1) \text{ کو حل کرو۔} \\
28. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = x \cos 2x \text{ کو حل کرو۔} \\
29. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + 4y = e^x \sin x \text{ کو حل کرو۔} \\
30. \quad & \frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} + y = xe^x \sin x \text{ کو حل کرو۔}
\end{aligned}$$

جوابات:

10.9.1 معروضی سوالات کے جوابات

$$\begin{aligned}
1. \quad & D^2 + 2D + 1 = 0 \\
2. \quad & y = c_1 \cos x + c_2 \sin x \\
3. \quad & y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x} + \dots + c_n e^{m_n x} \\
4. \quad & y = (c_1 + c_2 x + c_3 x^2) e^{mx} \\
5. \quad & y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)
\end{aligned}$$

10.9.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

کسی مناسب طریقہ سے درجہ ذیل تفرقی مساوات کا حل معلوم کرو:

$$\begin{aligned}
1. \quad & y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{3} \cos 2x \\
2. \quad & y = c_1 \cos ax + c_2 \sin ax + \frac{x}{a} \sin ax + \frac{1}{a^2} \cos ax \log(\cos ax) \\
3. \quad & y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x - \frac{1}{4} \cos 2x \log \left| \tan \left(x + \frac{\pi}{4} \right) \right| \\
4. \quad & y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + \frac{1}{2} x e^x
\end{aligned}$$

$$y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x + \frac{x}{3} \sin 3x + \frac{1}{9} \cos 3x \log(\cos 3x) \quad .5$$

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \sin x \log \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| - 1 \quad .6$$

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x - \frac{1}{3} \sin 2x \quad .7$$

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{4x} - e^x \quad .8$$

$$y = \left(c_1 + c_2 x + \frac{x^2}{2} \right) e^{2x} \quad .9$$

$$y = (c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 x) e^{2x} + (c_4 + c_5 x + c_6 x^2) e^{-x} + x^3 e^x \quad .10$$

$$y = c_1 e^{-\frac{7}{3}x} + c_2 e^{2x} + \frac{1}{13} x e^{2x} \quad .11$$

$$y = e^{-\frac{1}{2}x} \left(c_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + c_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right) + e^{-x} \quad .12$$

$$y = c_1 e^{-4x} + c_2 e^x + x e^x \quad .13$$

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - e^x \quad .14$$

$$y = c_1 e^{3x} + (c_2 + c_3 x) e^{-x} - (2 \sin 2x + \cos 2x) \quad .15$$

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{2x} + \frac{1}{8} \cos 2x \quad .16$$

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 \cos x + c_4 \sin x + \sin 2x \quad .17$$

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - \frac{1}{130} (7 \cos 3x + 9 \sin 3x) \quad .18$$

$$y = c_1 \cos 4x + c_2 \sin 4x - 3x \cos 4x \quad .19$$

10.9.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$y = \frac{3}{2} e^{3x} + 2e^{-x} - \frac{1}{2} e^x + 2 \sin x - \cos x \quad .1$$

$$y = \frac{1}{29} \left[e^{-2x} \left(37 \cos 3x - \frac{2}{3} \sin 3x \right) + (9 \sin 2x - 8 \cos 2x) \right] \quad .2$$

$$y = c_1 e^{-2x} + e^x (c_2 \cos \sqrt{3}x + c_3 \sin \sqrt{3}x) + \frac{1}{8} (x^4 - x + 1) \quad .3$$

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x} - \left(x + \frac{1}{6} \right) \quad .4$$

$$y = c_1 + c_2 e^{-x} + c_3 e^{-2x} + \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + \frac{7x}{2} \quad .5$$

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x} + \frac{1}{6} \left(x + \frac{5}{6} \right) \quad .6$$

$$y = e^{-x} (c_1 \cos x + c_2 \sin x) + x - 1 \quad .7$$

$$y = c_1 + c_2 e^{3x} + c_3 e^{-2x} - \frac{1}{6} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{6} + \frac{25x}{18} \right) \quad .8$$

$$y = c_1 + (c_2 + c_3 x) e^{-x} + \frac{1}{18} e^{2x} + \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 4x \quad .9$$

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + x^2 + 3x + 4 \quad .10$$

$$x = 1 + 2t - 3t^2 - e^{-3t} \quad .11$$

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x} - \frac{1}{170} e^{2x} (7 \cos x - 11 \sin x) \quad .12$$

$$y = c_1 e^{2x} + c_2 e^x - x e^x \quad .13$$

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{2x} + \frac{1}{20} x^5 e^{2x} \quad .14$$

$$\begin{aligned}
y &= c_1 e^{-2x} + c_2 e^x + \frac{1}{3} x e^x \quad .15 \\
y &= c_1 e^{-x} + c_2 e^x - \frac{1}{39} e^x (2 \cos 3x + 3 \sin 3x) \quad .16 \\
y &= (c_1 + c_2 x) e^x + \frac{1}{8} e^{3x} (2x^2 - 4x + 3) \quad .17 \\
y &= (c_1 + c_2 x + c_3 x^2) e^{-x} + \frac{1}{8} x^5 e^{-x} \quad .18 \\
y &= c_1 e^{-x} + c_2 e^x + 2e^x (x^2 - x) \quad .19 \\
y &= e^{-x} (c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x) + \frac{1}{73} e^x (3 \sin 2x - 8 \cos 2x) \quad .20 \\
y &= c_1 e^x + (c_2 + c_3 x) e^{-2x} - \frac{1}{18} (x^3 + x^2) e^{-2x} \quad .21 \\
y &= c_1 e^{3x} + c_2 e^x - \frac{1}{8} e^x (\cos 2x + \sin 2x) - \frac{1}{30} (\cos 3x + 2 \sin 3x) \quad .22 \\
y &= e^x (c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x) + \frac{1}{2} e^x \cos x \quad .23 \\
y &= c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + \frac{1}{9} (3x \sin 2x - 2 \cos x) \quad .24 \\
y &= c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x} + c_3 e^{3x} - \left(\frac{x}{12} + \frac{17}{144} \right) e^{2x} \quad .25 \\
y &= c_1 e^{-x} + c_2 e^x + c_3 \cos x + c_4 \sin x + \frac{1}{6} \left(\frac{x^3}{3} - \frac{5x}{2} \right) \cos x - \frac{3}{8} x^2 \sin x \quad .26 \\
y &= c_1 e^{-6x} + c_2 e^{2x} + \frac{e^{2x}}{32} (2x^2 - 3) \quad .27 \\
y &= c_1 e^x + c_2 e^{2x} + \frac{x}{20} (3 \sin 2x - \cos x) + \frac{1}{25} \left(3 \cos 2x - \frac{7}{8} \sin 2x \right) \quad .28 \\
y &= e^x (c_1 \cos \sqrt{3}x + c_2 \sin \sqrt{3}x) + \frac{1}{2} e^x \sin x \quad .29 \\
y &= (c_1 + c_2 x) e^{2x} - e^x (2 \cos x + x \sin 2x) \quad .30
\end{aligned}$$

10.10 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhania, S.Chand & Co., New Delhi
3. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume –I , V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company

اکائی 11 - متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساواتیں

(Homogeneous Linear Differential Equations with Variable Coefficients)

اکائی کے اجزا

تمہید	11.0
مقاصد	11.1
متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساواتیں	11.2
متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات کے حل کے عملی قاعدے	11.2.1
متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات میں تحویل پزیر مساواتیں	11.2.2
اکتسابی نتائج	11.3
کلیدی الفاظ	11.4
نمونہ امتحانی سوالات	11.5
معروضی جوابات کے حامل سوالات	11.5.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	11.5.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	11.5.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	11.6

اس اکائی میں ہم متغیر ضریب کی متجانس تفرقی مساوات کو حل کرنے کے کچھ طریقوں کو سمجھیں گے۔ اس کے لیے ہم غیر تابع متغیر x کو دوسرے متغیر z کی رکن میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے مان لیتے ہیں کہ $x = e^z$ ، اور $\frac{d}{dz}$ کی جگہ D رکھیں، تب

$$\frac{dx}{dz} = e^z = x$$

$$Dy = \frac{dy}{dz} = \frac{dy}{dx} \times \frac{dx}{dz} = x \frac{dy}{dx}$$

اسی طرح

$$D^2y = \frac{d^2y}{dz^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{dy}{dz} \right)$$

$$= \frac{d}{dx} \left(x \frac{dy}{dx} \right) \frac{dx}{dz}$$

$$= \left\{ x \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} \right\} x$$

$$= \left\{ x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} \right\}$$

$$\Rightarrow x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = D^2y - x \frac{dy}{dx}$$

$$= D^2y - Dy$$

$$= D(D - 1)y$$

اور

$$D^3y = \frac{d^3y}{dz^3} = \frac{d}{dz} \left(\frac{d^2y}{dz^2} \right)$$

$$= \frac{d}{dx} \left(x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} \right) \frac{dx}{dz}$$

$$= \left\{ x^2 \frac{d^3y}{dx^3} + 2x \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} \right\} x$$

$$\begin{aligned}
&= \left\{ x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 3x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} \right\} \\
\Rightarrow \quad x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} &= D^3 y - 3x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} \\
&= D^3 y - 3D(D-1)y - Dy \\
&= D^3 y - 3D^2 y + 2Dy \\
&= D(D^2 - 3D + 2)y \\
&= D(D-1)(D-2)y
\end{aligned}$$

اسی طرز پر آگے بڑھتے ہوئے، ہمیں درجہ ذیل مساوات حاصل ہو جاتی ہے

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} = D(D-1)(D-2) \cdots (D-n+1)y$$

11.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات کی معیاری شکل سے واقفیت کے ساتھ ان کا حل بھی حاصل کر سکیں۔

11.2 متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساواتیں

(Homogeneous Linear Differential Equations with Variable Coefficients)

تفرقی مساوات کی درجہ ذیل شکل

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + A_2 x^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \cdots + A_{n-1} x \frac{dy}{dx} + A_n y = Q$$

متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات کہلاتی ہے، جہاں $A_1, A_2, \dots, A_n$ مستقلات ہیں اور x کا کوئی تفاعل Q ہے۔ اس مساوات کا حل حاصل کرنے کے لیے $x = e^z$ رکھتے ہیں اور $x \frac{dy}{dx} = Dy, x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = D(D-1)y, x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = D(D-1)(D-2)y$ اور اسی طرح $x^n \frac{d^n y}{dx^n} = D(D-1)(D-2) \cdots (D-n+1)y$ کرنے پر مساوات مستقل ضریب کی خطی تفرقی مساوات میں بدل جاتی ہے جس کا حل گزشتہ اکائی میں بتایے گئے طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔

11.2.1 متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات کے حل کے عملی قاعدے

(Working Rules to Solve Homogeneous Linear Differential Equations with Variable Coefficients)

1. مان لو کہ

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + A_2 x^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + A_{n-1} x \frac{dy}{dx} + A_n y = Q \quad \dots(1)$$

متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس کا حل حاصل کرنے کے لیے درجہ ذیل اقدامات پر عمل کریں:

$$I. \quad x \text{ کی جگہ } \log x = z \text{ یا } e^z = x \text{ لیں اور } \frac{d}{dz} = D$$

$$II. \quad x \frac{dy}{dx} \text{ کی جگہ } Dy, x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ کی جگہ } D(D-1)y \text{ اور } x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} \text{ کی جگہ } D(D-1)(D-2)y \text{ درج کریں اور اسی طرح آگے}$$

کے ارکان میں بھی بدلاؤ کریں۔ فرض کرو کہ اب مساوات درجہ ذیل شکل میں ہے

$$f(D)y = R \quad \dots(2)$$

جہاں R کسی متغیر z کا تفاعل ہے۔

III. گزشتہ اکائی کے طریقوں کی مدد سے اس مساوات کا حل حاصل کریں۔ مان لو کہ اس کا حل ہے

$$y = f(z) \quad \dots(3)$$

IV. مساوات (3) میں z کی جگہ $\log x$ درج کریں۔ اب ہمیں حاصل ہو گا

$$y = F(\log x)$$

جو کہ دی گئی متجانس خطی تفرقی مساوات کا حل ہو گا۔

اب ہم کچھ مثالوں کی مدد سے اس طریقہ کو سمجھیں گے۔

$$\text{مثال 1- مساوات } x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = \log x^2 \text{ کو حل کرو۔}$$

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = \log x^2 \quad \dots(1)$$

سب سے پہلے ہم مساوات (1) کو مستقل ضریب کے ساتھ خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس کے لیے دی گئی مساوات میں x کی جگہ $\log x = z$ یا e^z لیں اور $x \frac{dy}{dx}$ کی جگہ Dy اور $x^2 \frac{d^2y}{dx^2}$ کی جگہ $D(D-1)y$ رکھتے ہیں۔ اس لیے

$$D(D-1)y - Dy + y = 2z$$

$$(D^2 - 2D + 1)y = 2z \quad \dots(2)$$

اس مساوات کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 - 2m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (m-1)(m-1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, 1$$

اس لیے اتمای تقاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 z)e^z$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} R \\ &= \frac{1}{(D^2 - 2D + 1)} (2z) \\ &= [1 + (D^2 - 2D)]^{-1} (2z) \\ &= [1 - (D^2 - 2D) + (D^2 - 2D)^2 - \dots] (2z) \\ &= 2[z - (D^2 - 2D)z + (D^2 - 2D)^2 z - \dots] \\ &= 2[z - (D^2 z - 2Dz) + 0 - \dots] \\ &= 2[z - (0 - 2 \times 1)] \\ &= 2(z + 2) \end{aligned}$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہوگا

$$\begin{aligned} y &= C.F. + P.I. \\ &= (c_1 + c_2 z)e^z + 2(z + 2) \end{aligned}$$

اس طرح مساوات (1) کا عام حل حاصل کرنے کے لیے z کی جگہ $\log x$ رکھتے ہیں، تب ضروری حل ہوگا

$$y = (c_1 + c_2 \log x)e^{\log x} + 2(\log x + 2)$$

$$= (c_1 + c_2 \log x)x + 2(\log x + 2)$$

$$\text{مثال 2- حل کرو: } x^4 \frac{d^3 y}{dx^3} + 2x^3 \frac{d^2 y}{dx^2} - x^2 \frac{dy}{dx} + xy = 1$$

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$x^4 \frac{d^3 y}{dx^3} + 2x^3 \frac{d^2 y}{dx^2} - x^2 \frac{dy}{dx} + xy = 1$$

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} + 2x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{x} \quad \dots (1)$$

سب سے پہلے ہم مساوات (1) میں x کی جگہ e^z یا $(\log x = z)$ لیں اور $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ Dy ، $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$ کی جگہ $D(D-1)y$ اور $x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = D(D-1)(D-2)y$ رکھیں۔ اس طرح ہمیں حاصل ہوگا

$$D(D-1)(D-2)y + 2D(D-1)y - Dy + y = e^{-z}$$

$$(D^3 - D^2 - D + 1)y = e^{-z} \quad \dots (2)$$

اس مساوات کا حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^3 - m^2 - m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (m-1)^2(m+1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 1, 1, -1$$

اس لیے اتمی تقابل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 z)e^z + c_3 e^{-z}$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} R$$

$$= \frac{1}{(D-1)^2(D+1)} (e^{-z})$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{(-1-1)^2(D+1)}(e^{-z}) \\
&= \frac{1}{4(D+1)}(e^{-z}) \\
&= \frac{1}{4}e^{-z} \int e^z e^{-z} dz \\
&= \frac{1}{4}e^{-z} \int (1) dz \\
&= \frac{1}{4}ze^{-z}
\end{aligned}$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہو گا

$$\begin{aligned}
y &= C.F. + P.I. \\
&= (c_1 + c_2 z)e^z + c_3 e^{-z} + \frac{1}{4}ze^{-z} \\
&= (c_1 + c_2 z)e^z + \left(c_3 + \frac{1}{4}z\right)e^{-z}
\end{aligned}$$

اب مساوات (1) کا عام حل حاصل کرنے کے لیے z کی جگہ $\log x$ درج کریں، اس طرح دی گئی مساوات کا حل ہو گا

$$\begin{aligned}
y &= (c_1 + c_2 \log x)e^{\log x} + \left(c_3 + \frac{1}{4} \log x\right)e^{-\log x} \\
&= (c_1 + c_2 \log x)x + \left(c_3 + \frac{1}{4} \log x\right)\frac{1}{x}
\end{aligned}$$

مثال 3۔ مساوات $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2y = x^2 + \frac{1}{x}$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2y = x^2 + \frac{1}{x} \quad \dots (1)$$

مساوات (1) کو مستقل ضریب کے ساتھ خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں x کی جگہ e^z یا $\log x = z$

رکھیں اور $\frac{dy}{dx}$ کی جگہ Dy اور $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$ کی جگہ $D(D-1)y$ رکھتے ہیں۔ اس لیے

$$D(D-1)y - 2y = e^{2z} + e^{-z}$$

یا

$$(D^2 - D - 2)y = e^{2z} + e^{-z} \quad \dots(2)$$

اب مساوات (2) کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 - m - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (m - 2)(m + 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 2, -1$$

اس لیے اتمی تقاض (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^{2z} + c_2 e^{-z}$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} R \\ &= \frac{1}{(D - 2)(D + 1)} (e^{2z} + e^{-z}) \\ &= \frac{1}{(D - 2)(2 + 1)} e^{2z} + \frac{1}{(-1 - 2)(D + 1)} e^{-z} \\ &= \frac{1}{3(D - 2)} e^{2z} - \frac{1}{3(D + 1)} e^{-z} \\ &= \frac{1}{3} \left[e^{2z} \int e^{-2z} e^{2z} dz - e^{-z} \int e^z e^{-z} dz \right] \\ &= \frac{1}{3} \left[e^{2z} \int dz - e^{-z} \int dz \right] \\ &= \frac{1}{3} [e^{2z} z - e^{-z} z] \\ &= \frac{1}{3} z (e^{2z} - e^{-z}) \end{aligned}$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 e^{2z} + c_2 e^{-z} + \frac{1}{3} z (e^{2z} - e^{-z})$$

اب مساوات (1) کا عام حل حاصل کرنے کے لیے z کی جگہ $\log x$ رکھتے ہیں، اس لیے ضروری حل ہوگا

$$y = c_1 x^2 + c_2 \left(\frac{1}{x} \right) + \frac{1}{3} \log x \left(x^2 - \frac{1}{x} \right)$$

مثال 4- مساوات $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} + 5y = x^2 \sin(\log x)$ کو حل کرو۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} + 5y = x^2 \sin(\log x) \quad \dots (1)$$

مساوات (1) کو مستقل ضریب کے ساتھ خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کرنے کے لیے دی گئی مساوات میں x کی جگہ e^z یا $(\log x = z)$ رکھیں اور $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$ کی جگہ $D(D-1)y$ رکھتے ہیں۔ اس لیے

$$D(D-1)y - 3Dy + 5y = e^{2z} \sin z$$

یا

$$(D^2 - 4D + 5)y = e^{2z} \sin z \quad \dots (2)$$

اب مساوات (2) کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 - 4m + 5 = 0$$

$$\Rightarrow (m-5)(m+1) = 0$$

$$\Rightarrow m = 5, -1$$

اس لیے اتمی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 e^{5z} + c_2 e^{-z}$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(D)} R \\ &= \frac{1}{(D-5)(D+1)} (e^{2z} \sin z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= e^{2z} \frac{1}{(D+2-5)(D+2+1)} (\sin z) \\
&= e^{2z} \frac{1}{(D-3)(D+3)} (\sin z) \\
&= e^{2z} \frac{1}{D^2-9} (\sin z) \\
&= e^{2z} \frac{1}{-(1)^2-9} (\sin z) \\
&= -\frac{1}{10} e^{2z} \sin z
\end{aligned}$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہو گا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 e^{5z} + c_2 e^{-z} - \frac{1}{10} e^{2z} \sin z$$

اب مساوات (1) کا عام حل حاصل کرنے کے لیے z کی جگہ $\log x$ رکھتے ہیں، اس لیے ضروری حل ہو گا

$$y = c_1 x^5 + c_2 \left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{10} x^2 \sin(\log x)$$

2. مان لو کہ متجانس خطی تفرقی مساوات درجہ ذیل ہے

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + A_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + A_2 x^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + A_{n-1} x \frac{dy}{dx} + A_n y = Q \quad \dots (1)$$

جہاں $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n$ مستقلات ہیں اور x کا کوئی تفاعل Q ہے۔ یہاں ہم عامل $x \frac{d}{dx}$ (Operator) کو $\mathcal{D}$ سے ظاہر کرتے ہیں اور

اس لیے $x \frac{dy}{dx} = \mathcal{D}y$, $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \mathcal{D}(\mathcal{D}-1)y$, $x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} = \mathcal{D}(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-2)y$ اور اسی طرح $x^n \frac{d^n y}{dx^n} = \mathcal{D}(\mathcal{D}-1)(\mathcal{D}-2) \dots (\mathcal{D}-n+1)y$ سے ظاہر کرتے ہیں۔ اب مساوات (1) درجہ ذیل شکل میں ہو گی۔

$$f(\mathcal{D})y = Q \quad \dots (2)$$

اب مان لیتے ہیں کہ $y = Ax^m$ مساوات $f(\mathcal{D})y = 0$ کا ایک حل ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ

$$Ax^m f(m) = 0$$

اس لیے $y = Ax^m$ مساوات $f(\mathcal{D})y = 0$ کا حل تبھی ہو گا جب معاون مساوات

$$f(m) = 0 \quad \dots(3)$$

کا ایک روٹ m ہو۔

1. جب معاون مساوات کے سبھی روٹس الگ الگ ہوں:

اس صورت میں مان لیجیے کہ $m_1, m_2, \dots, m_n$ معاون مساوات کے الگ الگ روٹس ہیں، تب

$$C.F. = A_1 x^{m_1} + A_2 x^{m_2} + \dots + A_n x^{m_n}$$

2. جب معاون مساوات کے k روٹس تکراری (Repeated) ہوں:

مان لیجیے کہ معاون مساوات کے n روٹس میں سے k روٹس مساوی ہیں $m = m_1 = m_2 = \dots = m_k$ ، تب

$$C.F. = (c_1 + c_2 \log x + c_3 (\log x)^2 + \dots + c_k (\log x)^{k-1}) x^m + c_{k+1} e^{m_{k+1}x} + \dots + c_n e^{m_n x}$$

$$= (c_1 + c_2 + \dots + c_k) e^{mx} + c_{k+1} e^{m_{k+1}x} + \dots + c_n e^{m_n x}$$

3. جب معاون مساوات کے روٹس ملتی اعداد ہوں:

اس صورت میں مان لیجیے کہ $m_1 = \alpha + i\beta$ اور $m_2 = \alpha - i\beta$ حاصل کردہ معاون مساوات کے روٹس ہیں، تب

$$C.F. = x^\alpha \{c_1 \cos(\beta \log x) + c_2 \sin(\beta \log x)\}$$

خاص تکملہ (Particular Integral):

مساوات (2) کے لیے خاص تکملہ ہے

$$P.I. = \frac{1}{f(D)} Q \quad \dots(4)$$

مان لو کہ

$$\frac{1}{D-m} Q = v \quad \dots(5)$$

$$\Rightarrow (D - m)v = Q$$

$$\Rightarrow x \frac{dv}{dx} - mv = Q$$

$$\Rightarrow \frac{dv}{dx} - \frac{m}{x} v = \frac{Q}{x}$$

یہ پہلے رتبہ کی خطی تفرقی مساوات ہے جس کا حل ہے

$$vx^{-m} = \int \left(x^{-m} \cdot \frac{Q}{x} \right) dx$$

$$\Rightarrow v = x^m \int \left(x^{-m} \cdot \frac{Q}{x} \right) dx$$

$$\frac{1}{\mathcal{D}-m} Q = x^m \int (x^{-m-1} Q) dx \quad \text{مساوات (5) سے کی قیمت رکھنے پر}$$

اب اگر مان لیا جائے کہ $f(\mathcal{D}) = (\mathcal{D} - m_1)(\mathcal{D} - m_2) \cdots (\mathcal{D} - m_n)$ تب

$$\begin{aligned} \frac{1}{f(\mathcal{D})} Q &= \frac{1}{(\mathcal{D} - m_1)(\mathcal{D} - m_2) \cdots (\mathcal{D} - m_n)} Q \\ \Rightarrow \frac{1}{f(\mathcal{D})} Q &= \left[\frac{C_1}{(\mathcal{D} - m_1)} + \frac{C_2}{(\mathcal{D} - m_2)} + \cdots + \frac{C_n}{(\mathcal{D} - m_n)} \right] Q \\ &= \frac{C_1}{(\mathcal{D} - m_1)} Q + \frac{C_2}{(\mathcal{D} - m_2)} Q + \cdots + \frac{C_n}{(\mathcal{D} - m_n)} Q \\ &= C_1 x^{m_1} \int (x^{-m_1-1} \cdot Q) dx + C_2 x^{m_2} \int (x^{-m_2-1} \cdot Q) dx + \cdots + C_n x^{m_n} \int (x^{-m_n-1} \cdot Q) dx \end{aligned}$$

تبصرہ: اگر $Q = x^m$ ہو اور $f(m) \neq 0$ تب خاص تکملہ ہوگا

$$P.I. = \frac{1}{f(\mathcal{D})} x^m = \frac{1}{f(m)} x^m$$

اس مسئلہ میں اگر $f(m) = 0$ تب

$$P.I. = \frac{1}{(\mathcal{D} - m)^n} x^m = \frac{(\log x)^n}{n!} x^m$$

آئیے اب ہم کچھ مثالوں کو حل کریں۔

$$\text{مثال 1۔ مساوات } x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + y = (1 - x)^2 \text{ کو حل کرو۔}$$

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + y = (1 - x)^2 \quad \dots (1)$$

مساوات (1) میں $x \frac{dy}{dx}$ کی جگہ $\mathcal{D}y$ رکھیں اور $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$ کی جگہ $\mathcal{D}(\mathcal{D} - 1)y$ رکھتے ہیں۔ اس لیے

$$\mathcal{D}(\mathcal{D} - 1)y + 3\mathcal{D}y + y = x^2 - 2x + 1$$

یا

$$(\mathcal{D}^2 + 2\mathcal{D} + 1)y = x^2 - 2x + 1 \quad \dots(2)$$

اب مساوات (2) کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + 2m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (m + 1)(m + 1) = 0$$

$$\Rightarrow m = -1, -1$$

اس لیے اتمی تقابل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 \log x)x^{-1}$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(\mathcal{D})} Q \\ &= \frac{1}{\mathcal{D}^2 + 2\mathcal{D} + 1} (x^2 - 2x + 1) \\ &= \frac{x^2}{2^2 + 2 \times 2 + 1} - 2 \frac{x}{1^2 + 2 \times 1 + 1} + \frac{x^0}{0^2 + 2 \times 0 + 1} \\ &= \frac{x^2}{9} - \frac{2x}{4} + 1 \\ &= \frac{1}{9}x^2 - \frac{1}{2}x + 1 \end{aligned}$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2 \log x)x^{-1} + \frac{1}{9}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$$

مثال 2- مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} + 4y = x^m$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3x \frac{dy}{dx} + 4y = x^m \quad \dots(1)$$

مساوات (1) میں $x \frac{dy}{dx}$ کی جگہ $\mathcal{D}y$ رکھیں اور $x^2 \frac{d^2y}{dx^2}$ کی جگہ $y(\mathcal{D} - 1)$ رکھتے ہیں۔ اس لیے

$$\mathcal{D}(\mathcal{D} - 1)y - 3\mathcal{D}y + 4y = x^m$$

یا

$$(\mathcal{D}^2 - 4\mathcal{D} + 4)y = x^m \quad \dots(2)$$

اب مساوات (2) کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 - 4m + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (m - 2)(m - 2) = 0$$

$$\Rightarrow m = 2, 2$$

اس لیے اتمائی تفاعل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 \log x)x^2$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$P.I. = \frac{1}{f(\mathcal{D})} Q$$

$$= \frac{1}{(\mathcal{D} - 2)^2} x^m$$

$$= \frac{1}{(m - 2)^2} x^m \quad \left[\because \frac{1}{f(\mathcal{D})} x^m = \frac{1}{f(m)} x^m \right]$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2 \log x)x^{-1} + \frac{1}{(m - 2)^2} x^m$$

مثال 3۔ مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = e^x$ کا حل معلوم کرو۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = e^x \quad \dots(1)$$

مساوات (1) میں $\frac{dy}{dx}x$ کی جگہ $\mathcal{D}y$ رکھیں اور $x^2 \frac{d^2y}{dx^2}$ کی جگہ $y(\mathcal{D} - 1)\mathcal{D}$ رکھتے ہیں۔ اس لیے

$$\mathcal{D}(\mathcal{D} - 1)y + 4\mathcal{D}y + 2y = e^x$$

یا

$$(\mathcal{D}^2 + 3\mathcal{D} + 2)y = e^x \quad \dots(2)$$

اب مساوات (2) کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + 3m + 2 = 0$$

$\Rightarrow$

$$(m + 1)(m + 2) = 0$$

$\Rightarrow$

$$m = -1, -2$$

اس لیے اتمائی تقاض (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1x^{-1} + c_2x^{-2}$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$P.I. = \frac{1}{f(\mathcal{D})} Q$$

$$= \frac{1}{(\mathcal{D} + 1)(\mathcal{D} + 2)} e^x$$

$$= \left(\frac{1}{\mathcal{D} + 1} - \frac{1}{\mathcal{D} + 2} \right) e^x$$

$$= \frac{1}{\mathcal{D} + 1} e^x - \frac{1}{\mathcal{D} + 2} e^x$$

$$= x^{-1} \int x^{1-1} e^x dx - x^{-2} \int x^{2-1} e^x dx$$

$$= x^{-1} \int e^x dx - x^{-2} \int x e^x dx$$

$$= x^{-1} e^x - x^{-2} (x - 1) e^x$$

$$= (x^{-1} - x^{-1} + x^{-2}) e^x$$

$$= x^{-2} e^x$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 x^{-1} + c_2 x^{-2} + x^{-2} e^x$$

مثال 4۔ مساوات $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + y = (1-x)^{-2}$ کو حل کرو۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + y = (1-x)^{-2} \quad \dots (1)$$

مساوات (1) میں $x \frac{dy}{dx}$ کی جگہ $\mathcal{D}y$ رکھیں اور $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$ کی جگہ $\mathcal{D}(\mathcal{D}-1)y$ رکھتے ہیں۔ اس لیے

$$\mathcal{D}(\mathcal{D}-1)y + 3\mathcal{D}y + y = (1-x)^{-2}$$

یا

$$(\mathcal{D}^2 + 2\mathcal{D} + 1)y = (1-x)^{-2} \quad \dots (2)$$

اب مساوات (2) کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 + 2m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow (m+1)(m+1) = 0$$

$$\Rightarrow m = -1, -1$$

اس لیے اتمی تقاض (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = (c_1 + c_2 \log x)x^{-1}$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(\mathcal{D})} Q \\ &= \frac{1}{(\mathcal{D}+1)(\mathcal{D}+1)} (1-x)^{-2} \\ &= \frac{1}{(\mathcal{D}+1)} x^{-1} \int x^{1-1} (1-x)^{-2} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{(\mathcal{D} + 1)} \{x^{-1}(1-x)^{-1}\} \\
&= x^{-1} \int x^{1-1} \{x^{-1}(1-x)^{-1}\} dx \\
&= x^{-1} \int \{x^{-1}(1-x)^{-1}\} dx \\
&= x^{-1} \int \frac{1}{x(1-x)} dx \\
&= x^{-1} \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx \\
&= x^{-1} (\log|x| - \log|1-x|) \\
&= x^{-1} \log \left| \frac{x}{1-x} \right|
\end{aligned}$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= (c_1 + c_2 \log x)x^{-1} + x^{-1} \log \left| \frac{x}{1-x} \right|$$

11.2.2 متغیر ضرب کی متجانس خطی تفرقی مساوات میں تحویل پزیر مساواتیں

(Equations Reducible to Homogeneous Linear Differential Equations)
with Variable Coefficients

مان لو کہ کوئی مساوات درجہ ذیل شکل میں ہے

$$(a + bx)^n \frac{d^n y}{dx^n} + A_1(a + bx)^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + A_2(a + bx)^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dx^{n-2}} + \dots + A_{n-1}(a + bx) \frac{dy}{dx} + A_n y = Q \quad \dots (1)$$

جہاں $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n$ مستقلات ہیں اور x کا کوئی تفاعل Q ہے۔

اس مساوات میں $a + bx$ کی جگہ z رکھنے پر اور اس سے $b = \frac{dz}{dx}$ اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = b \frac{dy}{dz}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dz} \left(b \frac{dy}{dz} \right) \frac{dz}{dx} = \frac{d}{dz} \left(b^2 \frac{dy}{dz} \right) = b^2 \frac{d^2 y}{dz^2}$$

.....
.....

اور اسی طرح

$$\frac{d^n y}{dx^n} = b^n \frac{d^n y}{dz^n}$$

یہ سبھی قیمتیں مساوات (1) میں رکھنے پر

$$\begin{aligned} z^n b^n \frac{d^n y}{dz^n} + A_1 z^{n-1} b^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dz^{n-1}} + A_2 z^{n-2} b^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dz^{n-2}} + \dots + A_{n-1} z b \frac{dy}{dz} + A_n y &= \varphi(z) \\ \Rightarrow z^n \frac{d^n y}{dz^n} + A_1 z^{n-1} \frac{b^{n-1}}{b^n} \frac{d^{n-1} y}{dz^{n-1}} + A_2 z^{n-2} \frac{b^{n-2}}{b^n} \frac{d^{n-2} y}{dz^{n-2}} + \dots + A_{n-1} z \frac{b}{b^n} \frac{dy}{dz} + \frac{A_n}{b^n} y &= F(z) \\ \Rightarrow z^n \frac{d^n y}{dz^n} + \frac{A_1}{b} z^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dz^{n-1}} + \frac{A_2}{b^2} z^{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dz^{n-2}} + \dots + \frac{A_{n-1}}{b^{n-1}} z \frac{dy}{dz} + \frac{A_n}{b^n} y &= F(z) \end{aligned}$$

اس مساوات کا حل گزشتہ طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

مثال 1- مساوات $(3x + 2)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3(3x + 2) \frac{dy}{dx} - 36y = 3x^2 + 4x + 1$ کو حل کریں۔

حل۔ دی گئی تفرقی مساوات ہے

$$(3x + 2)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3(3x + 2) \frac{dy}{dx} - 36y = 3x^2 + 4x + 1 \quad \dots (1)$$

اس مساوات میں $3x + 2$ کی جگہ z رکھنے پر اور اس سے $3 = \frac{dz}{dx}$ اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = 3 \frac{dy}{dz}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dz} \left(b \frac{dy}{dz} \right) \frac{dz}{dx} = 9 \frac{d^2 y}{dz^2}$$

مساوات (1) میں یہ قیمتیں رکھنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$9z^2 \frac{d^2 y}{dz^2} + 3z \left(3 \frac{dy}{dz} \right) - 36y = 3 \left(\frac{z-2}{3} \right)^2 + 4 \left(\frac{z-2}{3} \right) + 1$$

$$\Rightarrow z^2 \frac{d^2 y}{dz^2} + z \frac{dy}{dz} - 4y = \frac{1}{9} \left[\frac{3z^2 - 12z + 12 + 12z - 24 + 9}{9} \right]$$

$$\Rightarrow z^2 \frac{d^2 y}{dz^2} + z \frac{dy}{dz} - 4y = \frac{1}{9} \left[\frac{3(z^2 - 1)}{9} \right]$$

$$\Rightarrow z^2 \frac{d^2 y}{dz^2} + z \frac{dy}{dz} - 4y = \frac{1}{27} (z^2 - 1)$$

مساوات (1) میں $z \frac{dy}{dz}$ کی جگہ $\mathcal{D}y$ رکھیں اور $z^2 \frac{d^2 y}{dz^2}$ کی جگہ $y(\mathcal{D}(\mathcal{D} - 1))$ رکھتے ہیں۔ اس لیے

$$\mathcal{D}(\mathcal{D} - 1)y + \mathcal{D}y - 4y = \frac{1}{27} (z^2 - 1)$$

یا

$$(\mathcal{D}^2 - 4)y = \frac{1}{27} (z^2 - 1) \quad \dots (2)$$

اب مساوات (2) کو حل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات (Auxiliary Equation) درجہ ذیل ہوگی

$$m^2 - 4 = 0$$

$$\Rightarrow m = -2, 2$$

اس لیے اتمامی تقابل (Complementary Function) درجہ ذیل ہوگا

$$C.F. = c_1 z^{-2} + c_2 z^2$$

اور خاص تکملہ (Particular Integral) ہوگا

$$\begin{aligned} P.I. &= \frac{1}{f(\mathcal{D})} Q \\ &= \frac{1}{27} \left[\frac{1}{\mathcal{D}^2 - 4} (z^2 - 1) \right] \\ &= \frac{1}{27} \left[\left(\frac{1}{\mathcal{D}^2 - 4} z^2 - \frac{1}{\mathcal{D}^2 - 4} z^0 \right) \right] \\ &= \frac{1}{27} \left[\left(\frac{1}{(\mathcal{D} - 2)(\mathcal{D} + 2)} z^2 - \frac{1}{(0)^2 - 4} z^0 \right) \right] \\ &= \frac{1}{27} \left[\left(\frac{1}{(\mathcal{D} - 2)} z^{-2} \int z^{2-1} z^2 dz - \frac{1}{(0)^2 - 4} z^0 \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{27} \left[\left(\frac{1}{(D-2)} \frac{z^4}{4} + \frac{1}{4} \right) \right] \\
&= \frac{1}{108} \left(z^2 \int z^{-2-1} z^2 dz + 1 \right) \\
&= \frac{1}{108} \left(z^2 \int z^{-1} dz + 1 \right) \\
P.I. &= \frac{1}{108} (z^2 \log z + 1)
\end{aligned}$$

اس لیے مساوات (2) کا عام حل ہوگا

$$y = C.F. + P.I.$$

$$= c_1 z^{-2} + c_2 z^2 + \frac{1}{108} (z^2 \log z + 1)$$

$z = 3x + 2$ رکھنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$y = c_1 (3x + 2)^{-2} + c_2 (3x + 2)^2 + \frac{1}{108} ((3x + 2)^2 \log |3x + 2| + 1)$$

11.3 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی کے مکمل ہونے پر ہم نے متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات کی بنیادی جانکاری حاصل کی اور اس کو حل کرنے کے مختلف طریقوں کو باریکی سے سیکھا۔ اس علاوہ متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات میں تحویل پزیر مساواتوں کو پہچان کر ان کو متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کر کے ان کا حل حاصل کرنے پر مہارت حاصل کی۔

11.4 کلیدی الفاظ (Key Words)

متجانس تفرقی مساوات، اتمای تفاعل، معاون مساوات، مستقل ضریب، غیر متجانس تفرقی مساوات

11.5 نمونہ امتحانی سوالات (Sample Examination Questions)

11.5.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات کی عام شکل لکھیے۔
2. مساوات $\frac{d^3y}{dx^3} + \frac{2}{x} \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{3}{x^2} \frac{dy}{dx} - \frac{3}{x^3} y = 0$ کو متجانس خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کریے۔
3. مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 4y = 0$ کو متجانس خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کریے۔
4. مساوات $x^3 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x^2 \frac{dy}{dx} + xy = 0$ کو متجانس خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کریے۔

11.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

1. مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 4x \frac{dy}{dx} + 6y = 0$ کو حل کریے۔
2. مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 4y = 0$ کو حل کریے۔
3. مساوات $x^3 \frac{d^3y}{dx^3} + 2x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} - 3y = 0$ کو حل کریے۔
4. حل کریے: $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$

11.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. مساوات $x^3 \frac{d^3y}{dx^3} - x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 2x \frac{dy}{dx} - 2y = x^3 + 3x$ کا حل معلوم کرو۔
2. مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 3y = x^2 \log x$ کو حل کرو۔
3. مساوات $x^3 \frac{d^3y}{dx^3} + 2x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} - 3y = x^2 + x$ کو حل کرو۔
4. مساوات $\frac{d^3y}{dx^3} - \frac{4}{x} \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{5}{x^2} \frac{dy}{dx} - \frac{2}{x^3} y = 1$ کو حل کریں۔
5. مساوات $(1+x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + (1+x) \frac{dy}{dx} + y = 4 \cos\{\log(1+x)\}$ کو حل کرو۔
6. مساوات $(5+2x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 6(5+2x) \frac{dy}{dx} + 8y = 0$ کا حل معلوم کریں۔
7. مساوات $(2x-1)^3 \frac{d^3y}{dx^3} + (2x-1) \frac{dy}{dx} - 2y = 0$ کو حل کرو۔

جوابات:

11.5.1 معروضی سوالات کے جوابات

1. متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات کی عام شکل لکھیے۔
2. مساوات $\frac{d^3y}{dx^3} + \frac{2}{x} \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{3}{x^2} \frac{dy}{dx} - \frac{3}{x^3} y = 0$ کو متجانس خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کریے۔
3. مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - 4y = 0$ کو متجانس خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کریے۔

4. مساوات $x^3 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x^2 \frac{dy}{dx} + xy = 0$ کو متجانس خطی تفرقی مساوات میں تبدیل کریے۔

11.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$\begin{aligned} 1. & y = c_1 x^2 + c_2 x^3 \\ 2. & y = c_1 x^2 + c_2 x^{-2} \\ 3. & y = c_1 x + c_2 \sin(\sqrt{3} \log x) + c_3 \cos(\sqrt{3} \log x) \\ 4. & y = \sqrt{x} \left\{ c_1 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x\right) + c_2 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2} \log x\right) \right\} \end{aligned}$$

11.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$\begin{aligned} 1. & y = (c_1 + c_2 \log x) + c_3 x^2 + \frac{1}{4} x^3 - \frac{3}{2} x (\log x)^2 \\ 2. & y = c_1 x^{-1} + c_2 x^3 - \frac{x^2}{9} (3 \log x + 2) \\ 3. & y = c_1 x + c_2 \cos(\sqrt{3} \log x) + c_3 \sin(\sqrt{3} \log x) + \frac{x^2}{7} + \frac{x \log x}{4} \\ 4. & y = c_1 x^2 + x^{5/2} \left(c_2 x^{\sqrt{21}/2} + c_3 x^{-\sqrt{21}/2} \right) - \frac{x^3}{5} (3 \log x + 2) \\ 5. & y = c_1 \cos\{\log(1+x)\} + c_2 \sin\{\log(1+x)\} + 2 \log(1+x) \sin\{\log(1+x)\} \\ 6. & y = (5+2x)^2 \left\{ c_1 (5+2x)^{\sqrt{2}} + c_2 (5+2x)^{-\sqrt{2}} \right\} \\ 7. & y = (2x-1) \left\{ c_1 + c_2 (2x-1)^{\frac{\sqrt{3}}{2}} + c_3 (2x-1)^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} \right\} \end{aligned}$$

11.6 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Scope as in "Differential Equations and Their Applications" Zafar Ahsan, Prentice hall of India Private Limited, New Delhi
2. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
3. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhanian, S.Chand & Co., New Delhi
4. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume –I, V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company

اکائی 12- متغیر ضریب کے اعلیٰ رتبے کی خطی تفرقی مساواتیں

(پیرامیٹرس کے تغیر کا طریقہ)

(Higher Order Linear Differential Equations with Variable Coefficients: Method of Variation of Parameters)

اکائی کے اجزا

تمہید	12.0
مقاصد	12.1
پیرامیٹرس کا تغیر	12.2
اکتسابی نتائج	12.3
کلیدی الفاظ	12.4
نمونہ امتحانی سوالات	12.5
معروضی جوابات کے حامل سوالات	12.5.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	12.5.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	12.5.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	12.6

12.0 تمہید (Introduction)

اس اکائی میں ہم خطی تفرقی مساوات کی درجہ ذیل شکل پر غور کریں گے

$$\frac{d^2y}{dx^2} + P \frac{dy}{dx} + Qy = R$$

جہاں x کے تفاعلات P ، Q اور R ہیں۔ کسی خطی تفرقی مساوات کا مکمل حل حاصل کرنے کے طریقہ کو سمجھیں گے جب کہ اس مساوات کا اتمامی تفاعل معلوم ہو۔ یہاں ہم پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقہ سے پہلے اور دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات کو حل کرنا سیکھیں گے۔

12.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے عبور پر آپ ذیل کی مساواتوں کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کی مدد سے حل کر سکیں گے:

1. خطی تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ اور

2. دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} + P \frac{dy}{dx} + Qy = R$

12.2 پیرامیٹرس کا تغیر (Variation of Parameters)

اب ہم کسی خطی تفرقی مساوات کے مکمل حل حاصل کرنے کے پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کو سیکھیں گے جب کہ اس مساوات کا اتمامی تفاعل معلوم ہے۔

1. خطی تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ کا حل:

مان لو کہ پہلے رتبے کی خطی تفرقی مساوات

$$\frac{dy}{dx} + Py = Q \quad \dots\dots(1)$$

جہاں P اور Q مستقلات ہیں یا x کے تفاعلات ہیں۔ مان لو کہ $y = au$ مساوات

$$\frac{dy}{dx} + Py = 0 \quad \dots\dots(2)$$

کا عام حل ہے، جہاں a ایک اختیاری مستقل ہے اور u تفاعل ہے x کا۔ مساوات (2) سے

$$\frac{du}{dx} + Pu = 0 \quad \text{.....(3)}$$

مساوات (1) کا عام حل حاصل کرنے کے لیے مان لو کہ $y = bu$ اس کا عام حل ہے، یہاں b مستقل نہیں بلکہ یہ x کا ایک تفاعل ہے جسے اس طرح مانا جاتا ہے کہ مساوات (1) مطمئن ہو جائے۔ اب

$$y = bu \quad \text{.....(4)}$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{dy}{dx} = b \frac{du}{dx} + \frac{db}{dx} u \quad \text{.....(5)}$$

مساوات (1) میں مساوات (5) کی قدر درج کرنے پر حاصل ہو گا

$$b \frac{du}{dx} + \frac{db}{dx} u + Pbu = Q$$

$$\frac{db}{dx} u + b \left(\frac{du}{dx} + Pu \right) = Q \quad \text{.....(6)}$$

مساوات (3) اور (6) سے

$$\frac{db}{dx} u + b(0) = Q$$

$$db = \left(\frac{Q}{u} \right) dx$$

$$b = \int \left(\frac{Q}{u} \right) dx + c$$

جہاں c ایک اختیائی مستقل ہے۔ مساوات (4) میں یہ قیمت رکھنے پر

$$y = \left(\int \left(\frac{Q}{u} \right) dx + c \right) u$$

$$= u \int \left(\frac{Q}{u} \right) dx + cu$$

جیسا کہ ہم نے مانا تھا کہ مساوات (4) مساوات (1) کا عام حل ہے، اس لیے $y = u \int \left(\frac{Q}{u} \right) dx + cu$ مساوات $\frac{dy}{dx} + Py = Q$ کے لیے عام حل ہے۔ اب ہم کچھ مثالوں کی مدد سے پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔

مثال 1۔ مساوات $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x(1+x^2)}$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x(1+x^2)} \quad \dots(1)$$

یہاں $P = \frac{1}{x}$ اور $Q = -\frac{1}{x(1+x^2)}$ ہیں۔ سب سے پہلے ہم مساوات

$$\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0 \quad \dots(2)$$

کا عام حل حاصل کرتے ہیں۔ مساوات (2) سے

$$\frac{dy}{y} + \frac{dx}{x} = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\log y + \log x = \log c$$

$$y = cx^{-1}$$

جہاں c ایک اختیاری مستقل ہے۔ اس لیے مان لو کہ

$$u = x^{-1}$$

اب دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = u \int \left(\frac{Q}{u} \right) dx + Bu$$

$$= x^{-1} \int \left(\frac{-\frac{1}{x(1+x^2)}}{x^{-1}} \right) dx + Bx^{-1}$$

$$= x^{-1} \left[B - \int \left(\frac{1}{1+x^2} \right) dx \right]$$

$$= x^{-1} [B - \tan^{-1} x]$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل $xy = B - \tan^{-1} x$ ہے۔

مثال 2۔ مساوات $\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = \sin x$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = \sin x \quad \dots(1)$$

یہاں $P = \frac{2}{x}$ اور $Q = \sin x$ ہیں۔ سب سے پہلے ہم مساوات

$$\frac{dy}{dx} + \frac{2y}{x} = 0 \quad \dots(2)$$

کا عام حل حاصل کرتے ہیں۔ مساوات (2) ظاہر کرتا ہے

$$\frac{dy}{y} + 2 \frac{dx}{x} = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\log y + 2 \log x = \log c$$

$$y = cx^{-2}$$

جہاں c ایک اختیاری مستقل ہے۔ اس لیے مان لو کہ

$$u = x^{-2}$$

اب دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = u \int \left(\frac{Q}{u} \right) dx + Bu$$

$$= x^{-2} \int \left(\frac{\sin x}{x^{-2}} \right) dx + Bx^{-2}$$

$$= x^{-2} \left[B + \int x^2 \sin x dx \right]$$

$\Rightarrow$

$$x^2 y = B + x^2 (-\cos x) - \int 2x (-\cos x) dx$$

$$= B - x^2 \cos x + 2 \int x \cos x dx$$

$$= B - x^2 \cos x + 2 \left\{ x \sin x - \int \sin x dx \right\}$$

$$= B - x^2 \cos x + 2 \{ x \sin x + \cos x \}$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل $x^2 y = B - x^2 \cos x + 2\{x \sin x + \cos x\}$ ہے۔

مثال 3- مساوات $\frac{dy}{dx} + \left(\frac{4x}{1+x^2}\right)y = \frac{1}{(1+x^2)^2}$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{4x}{1+x^2}\right)y = \frac{1}{(1+x^2)^2} \quad \dots(1)$$

یہاں $P = \frac{4x}{1+x^2}$ اور $Q = \frac{1}{(1+x^2)^2}$ ہیں۔ سب سے پہلے ہم مساوات

$$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{4x}{1+x^2}\right)y = 0 \quad \dots(2)$$

کا عام حل حاصل کرتے ہیں۔ مساوات (2) سے حاصل ہے

$$\frac{dy}{y} + 2\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)dx = 0$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\log y + 2 \log(1+x^2) = \log c$$

$\Rightarrow$

$$\log y = \log c - \log(1+x^2)^2$$

$\Rightarrow$

$$y = c(1+x^2)^{-2}$$

جہاں c ایک اختیاری مستقل ہے۔ اس لیے مان لو کہ

$$u = (1+x^2)^{-2}$$

اب دی گئی مساوات کا عام حل ہوگا

$$y = u \int \left(\frac{Q}{u}\right) dx + Bu$$

$$= (1+x^2)^{-2} \int \left(\frac{1}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{1}{(1+x^2)^{-2}}\right) dx$$

$$+ B(1+x^2)^{-2}$$

$$= (1+x^2)^{-2} \left[B + \int (1) dx \right]$$

⇒

$$(1 + x^2)^2 y = B + x$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اس لیے دی گئی مساوات کا عام حل $(1 + x^2)^2 y = B + x$ ہے۔

2. دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات کا حل:

مان لو کہ دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P \frac{dy}{dx} + Qy = R \quad \text{.....(1)}$$

جہاں P ، Q اور R ، x کے تفاعلات ہیں۔ مان لو کہ $y = au + bv$ مساوات

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P \frac{dy}{dx} + Qy = 0 \quad \text{.....(2)}$$

کا عام حل ہے، جہاں a اور b اختیاری مستقلات ہیں اور u ، v تفاعلات ہیں x کے۔ اس کے علاوہ ہم مان لیتے ہیں کہ مساوات (1) کا مکمل حل

$$y = au + bv \quad \text{.....(3)}$$

اس طرح سے ہے کہ اب a اور b مستقلات نہیں ہیں بلکہ ان کو x کے تفاعلات کے طور پر اس طرح سے منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ مساوات (1) کو مطمئن کر سکیں۔

مساوات (3) کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر

$$\frac{dy}{dx} = a \frac{du}{dx} + \frac{da}{dx} u + b \frac{dv}{dx} + \frac{db}{dx} v$$

⇒

$$\frac{dy}{dx} = a \frac{du}{dx} + b \frac{dv}{dx} + \frac{da}{dx} u + \frac{db}{dx} v \quad \text{.....(5)}$$

اب a اور b کو اس طرح سے منتخب کرتے ہیں کہ

$$\frac{da}{dx} u + \frac{db}{dx} v = 0 \quad \text{.....(5)}$$

اب مساوات (4) ہوگی

$$\frac{dy}{dx} = a \frac{du}{dx} + b \frac{dv}{dx}$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = a \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{da}{dx} \frac{du}{dx} + b \frac{d^2 v}{dx^2} + \frac{db}{dx} \frac{dv}{dx}$$

اب مساوات (1) میں $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ، $\frac{dy}{dx}$ ، y کی قیمتیں درج کرنے پر

$$\begin{aligned} & \left(a \frac{d^2 u}{dx^2} + \frac{da}{dx} \frac{du}{dx} + b \frac{d^2 v}{dx^2} + \frac{db}{dx} \frac{dv}{dx} \right) + P \left(a \frac{du}{dx} + b \frac{dv}{dx} \right) + Q(au + bv) = R \\ \Rightarrow & a \left(\frac{d^2 u}{dx^2} + P \frac{du}{dx} + Qu \right) + b \left(\frac{d^2 v}{dx^2} + P \frac{dv}{dx} + Qv \right) + \left(\frac{da}{dx} \frac{du}{dx} + \frac{db}{dx} \frac{dv}{dx} \right) = R \end{aligned}$$

چوں کہ u اور v مساوات (1) کے حل ہیں۔ اس لیے یہ اس کو مطمئن بھی کریں گے

$$\frac{d^2 u}{dx^2} + P \frac{du}{dx} + Qu = 0$$

$$\frac{d^2 v}{dx^2} + P \frac{dv}{dx} + Qv = 0$$

اور

اس لیے

$$\frac{da}{dx} \frac{du}{dx} + \frac{db}{dx} \frac{dv}{dx} = R \quad \dots\dots(6)$$

مساوات (5) اور (6) سے

$$\frac{\frac{da}{dx}}{-v} = \frac{\frac{db}{dx}}{u} = \frac{R}{u \frac{dv}{dx} - \frac{du}{dx} v}$$

اب

$$\frac{da}{dx} = \frac{-vR}{u \frac{dv}{dx} - \frac{du}{dx} v} \quad \dots\dots(7)$$

$$\frac{db}{dx} = \frac{uR}{u \frac{dv}{dx} - \frac{du}{dx} v} \quad \dots\dots(8)$$

مساوات (7) اور (8) کو تکمیل کرنے پر ہم a اور b کی قیمتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ مان لو کہ $a = f(x) + A$ اور $b = g(x) + B$

اب مساوات (1) کا عام حل ہوگا

$$y = uf(x) + Au + vg(x) + Bv$$

اب ہم کچھ مثالوں کی مدد سے پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کو سمجھتے ہیں۔

مثال 1۔ مساوات $y = x + \frac{d^2y}{dx^2}$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{d^2y}{dx^2} + y = x \quad \dots(1)$$

سب سے پہلے ہم $0 = y + \frac{d^2y}{dx^2}$ کا حل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات ہوگی

$$m^2 + 1 = 0$$

$\Rightarrow$

$$m = \pm i$$

اس لیے $0 = y + \frac{d^2y}{dx^2}$ کا حل ہے

$$C.F. = C_1 \cos x + C_2 \sin x$$

اب مان لو کہ دی گئی مساوات کا مکمل حل $y = F \cos x + G \sin x$ ہے۔، جہاں F اور G دو x کے تفاعلات ہیں۔ اس لیے

$$y = F \cos x + G \sin x$$

$$\frac{dy}{dx} = -F \sin x + \frac{dF}{dx} \cos x + G \cos x + \frac{dG}{dx} \sin x$$

F اور G کو اس طرح منتخب کیا جاتا ہے کہ

$$\frac{dF}{dx} \cos x + \frac{dG}{dx} \sin x = 0 \quad \dots(2)$$

اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = -F \sin x + G \cos x$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفریق کرنے پر

$$\frac{d^2y}{dx^2} = -F \cos x - \frac{dF}{dx} \sin x - G \sin x + \frac{dG}{dx} \cos x$$

مساوات (1) سے

$$-F \cos x - \frac{dF}{dx} \sin x - G \sin x + \frac{dG}{dx} \cos x + F \cos x + G \sin x = x$$

$$\Rightarrow -\frac{dF}{dx} \sin x + \frac{dG}{dx} \cos x = x \quad \dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) سے

$$\frac{dF}{dx} = -x \sin x, \frac{dG}{dx} = x \cos x$$

مکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$F = -\int x \sin x dx + C \text{ اور } G = \int x \cos x dx + D$$

$$\Rightarrow F = -[-x \cos x + \sin x] + C \text{ اور } G = [x \sin x + \cos x] + D$$

$$\Rightarrow F = x \cos x - \sin x + C \text{ اور } G = x \sin x + \cos x + D$$

اب مساوات $y = F \cos x + G \sin x$ میں F اور G کی قیمتیں درج کرنے پر

$$\begin{aligned} y &= (x \cos x - \sin x + C) \cos x + (x \sin x + \cos x + D) \sin x \\ &= (x \cos^2 x - \sin x \cos x + C \cos x) + (x \sin^2 x + \sin x \cos x + D \sin x) \\ &= x(\cos^2 x + \sin^2 x) + C \cos x + D \sin x \\ &= x + C \cos x + D \sin x \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا مکمل حل $y = x + C \cos x + D \sin x$ ہے۔

مثال 2- مساوات $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - y = x^2 e^x$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - y = x^2 e^x \quad \dots(1)$$

سب سے پہلے ہم دی گئی مساوات میں سے متجانس تفرقی مساوات $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - y = 0$ کا حل حاصل کرتے ہیں۔

اس کے لیے $x = e^z$ اور $D = \frac{d}{dz}$ رکھتے ہیں، تب

$$\log x = z$$

تفرق کرنے پر

$$\frac{1}{x} = \frac{dz}{dx}$$

اب

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dz} \left(\frac{1}{x} \right)$$

یا

$$x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} = Dy$$

اس طرح

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dz} \left(\frac{1}{x} \right) \right) \\ &= - \left(\frac{1}{x^2} \right) \frac{dy}{dz} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dz} \right) \\ &= - \left(\frac{1}{x^2} \right) \frac{dy}{dz} + \frac{1}{x} \frac{d}{dz} \left(\frac{dy}{dz} \right) \frac{dz}{dx} \\ &= - \left(\frac{1}{x^2} \right) \frac{dy}{dz} + \left(\frac{1}{x} \frac{d^2y}{dz^2} \right) \left(\frac{1}{x} \right) \\ &= \frac{1}{x^2} \left[\frac{d^2y}{dz^2} - \frac{dy}{dz} \right] \end{aligned}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{aligned} x^2 \frac{d^2y}{dx^2} &= [D^2y - Dy] \\ &= D(D - 1)y \end{aligned}$$

اب دی گئی مساوات میں $x \frac{dy}{dx} = Dy$ اور $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} = D(D - 1)y$ رکھتے ہیں۔ تب

$$D(D - 1)y + Dy - y = 0$$

$$(D^2 - 1)y = 0$$

اس مساوات کے لیے معاون مساوات ہے

$$m^2 - 1 = 0$$

⇒

$$m = \pm 1$$

اس لیے اتمی تفاعل ہے

$$C.F. = C_1x + C_2 \frac{1}{x}$$

اب مان لو کہ دی گئی مساوات کا مکمل حل $y = Fx + G \frac{1}{x}$ ہے، جہاں F اور G دو x کے تفاعلات ہیں۔ اس لیے

$$y = Fx + G \frac{1}{x}$$

⇒

$$\frac{dy}{dx} = F + x \frac{dF}{dx} - G \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x} \frac{dG}{dx}$$

F اور G کو اس طرح منتخب کیا جاتا ہے کہ

$$x \frac{dF}{dx} + \frac{1}{x} \frac{dG}{dx} = 0 \quad \dots\dots(2)$$

اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = F - G \frac{1}{x^2}$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفریق کرنے پر

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dF}{dx} + 2G \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^2} \frac{dG}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$\left(\frac{dF}{dx} + 2G \frac{1}{x^3} - \frac{1}{x^2} \frac{dG}{dx} \right) + \frac{1}{x} \left(F - G \frac{1}{x^2} \right) - \frac{1}{x^2} \left(Fx + G \frac{1}{x} \right) = e^x$$

⇒

$$\frac{dF}{dx} - \frac{1}{x^2} \frac{dG}{dx} = e^x \quad \dots\dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) سے

$$\frac{dF}{dx} = \frac{1}{2} e^x, \quad \frac{dG}{dx} = -\frac{1}{2} x^2 e^x$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$F = \frac{1}{2}e^x + C \text{ اور } G = -\frac{1}{2}e^x(x^2 - 2x + 2) + D$$

اب مساوات $y = Fx + G \frac{1}{x}$ میں F اور G کی قیمتیں رکھنے پر حاصل ہے

$$\begin{aligned} y &= \left(\frac{1}{2}e^x + C\right)x + \left(-\frac{1}{2}e^x(x^2 - 2x + 2) + D\right)\frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{2}xe^x + Cx - \frac{1}{2}e^x\left(x - 2 + \frac{2}{x}\right) + \frac{D}{x} \\ &= Cx + \frac{D}{x} + e^x - \frac{e^x}{x} \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا مکمل حل $y = Cx + \frac{D}{x} + e^x - \frac{e^x}{x}$ ہے۔

مثال 3۔ مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} = e^x \sin x$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} = e^x \sin x \quad \dots\dots(1)$$

سب سے پہلے ہم دی گئی مساوات میں سے مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} = 0$ کا حل حاصل کرتے ہیں۔

اس مساوات کے لیے معاون مساوات ہے

$$m^2 - 2m = 0$$

$$m(m - 2) = 0$$

$\Rightarrow$

$$m = 0, 2$$

اس لیے اتمی تفاعل ہے

$$C.F. = C_1 + C_2e^{2x}$$

اب مان لو کہ دی گئی مساوات کا مکمل حل $y = F + Ge^{2x}$ ہے۔، جہاں F اور G دو x کے تفاعلات ہیں۔ اس لیے

$$y = F + Ge^{2x}$$

⇒

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dF}{dx} + 2Ge^{2x} + e^{2x} \frac{dG}{dx}$$

F اور G کو اس طرح منتخب کیا جاتا ہے کہ

$$\frac{dF}{dx} + e^{2x} \frac{dG}{dx} = 0 \quad \dots (2)$$

اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = 2Ge^{2x}$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفریق کرنے پر

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 4Ge^{2x} + 2e^{2x} \frac{dG}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$\left(4Ge^{2x} + 2e^{2x} \frac{dG}{dx}\right) - 2(2Ge^{2x}) = e^x \sin x$$

⇒

$$2e^{2x} \frac{dG}{dx} = e^x \sin x$$

⇒

$$\frac{dG}{dx} = \frac{1}{2} e^{-x} \sin x$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$G = \frac{1}{2} \int e^{-x} \sin x \, dx + C$$

ہم جانتے ہیں $\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{(a)^2 + (b)^2}$ اس لیے

$$G = \frac{1}{2} \frac{e^{-x}}{(-1)^2 + (1)^2} (-\sin x - \cos x) + C$$

$$= -\frac{1}{4} e^{-x} (\sin x + \cos x) + C$$

$\frac{dG}{dx}$ کی قیمت مساوات $0 = \frac{dF}{dx} + e^{2x} \frac{dG}{dx}$ میں رکھنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\frac{dF}{dx} + e^{2x} \left(\frac{1}{2} e^{-x} \sin x \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dF}{dx} = -\frac{1}{2} e^x \sin x$$

مکمل کرنے پر

$$\begin{aligned} F &= - \int \frac{1}{2} e^x \sin x dx + D \\ &= -\frac{1}{2} \frac{e^x}{(1)^2 + (1)^2} (\sin x - \cos x) + D \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F = -\frac{1}{4} e^x (\sin x - \cos x) + D$$

اب مساوات $y = F + G e^{2x}$ میں F اور G کی اوپر حاصل کی گئی قیمتیں رکھنے پر

$$\begin{aligned} y &= -\frac{1}{4} e^x (\sin x - \cos x) + D + \left(-\frac{1}{4} e^{-x} (\sin x + \cos x) + C \right) e^{2x} \\ &= -\frac{1}{4} e^x (\sin x - \cos x) + D - \frac{1}{4} e^x (\sin x + \cos x) + C e^{2x} \\ &= -\frac{1}{4} e^x \{2 \sin x\} + D + C e^{2x} \\ &= -\frac{1}{2} e^x \sin x + C e^{2x} + D \end{aligned}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا مکمل حل $y = -\frac{1}{2} e^x \sin x + C e^{2x} + D$ ہے۔

مثال 4۔ مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 1$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 1 \quad \dots (1)$$

سب سے پہلے ہم دی گئی مساوات میں سے مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = 0$ کا حل حاصل کرتے ہیں۔

اس مساوات کے لیے معاون مساوات ہے

$$m^2 - 3m + 2 = 0$$

$$(m - 1)(m - 2) = 0$$

⇒

$$m = 1, 2$$

اس لیے اتمی تفاعل ہے

$$C.F. = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

اب مان لو کہ دی گئی مساوات کا مکمل حل $y = Fe^x + Ge^{2x}$ ہے، جہاں F اور G دو x کے تفاعلات ہیں۔ اس لیے

$$y = Fe^x + Ge^{2x}$$

⇒

$$\frac{dy}{dx} = Fe^x + e^x \frac{dF}{dx} + 2Ge^{2x} + e^{2x} \frac{dG}{dx}$$

F اور G کو اس طرح منتخب کیا جاتا ہے کہ

$$e^x \frac{dF}{dx} + e^{2x} \frac{dG}{dx} = 0 \quad \dots\dots(2)$$

اس لیے

$$\frac{dy}{dx} = Fe^x + 2Ge^{2x}$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x تفرق کرنے پر

$$\frac{d^2y}{dx^2} = Fe^x + e^x \frac{dF}{dx} + 4Ge^{2x} + 2e^{2x} \frac{dG}{dx}$$

مساوات (1) سے

$$\left(Fe^x + e^x \frac{dF}{dx} + 4Ge^{2x} + 2e^{2x} \frac{dG}{dx} \right) - 3(Fe^x + 2Ge^{2x}) + 2(Fe^x + Ge^{2x}) = 1$$

⇒

$$e^x \frac{dF}{dx} + 2e^{2x} \frac{dG}{dx} = 1 \quad \dots\dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) سے

$$\frac{dF}{dx} = -\frac{1}{e^x} = -e^{-x}, \quad \frac{dG}{dx} = \frac{1}{e^{2x}} = e^{-2x}$$

تکمل کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$F = e^{-x} + C \text{ اور } G = -\frac{1}{2}e^{-2x} + D$$

اب مساوات $y = Fe^x + Ge^{2x}$ میں F اور G کی مندرجہ بالا حاصل کردہ قیمتیں درج کرنے پر

$$y = e^x(e^{-x} + C) + \left(-\frac{1}{2}e^{-2x} + D\right)e^{2x}$$

$$= (1 + Ce^x) + \left(-\frac{1}{2} + De^{2x}\right)$$

$$= \frac{1}{2} + Ce^x + De^{2x}$$

اس لیے دی گئی مساوات کا مکمل حل $y = \frac{1}{2} + Ce^x + De^{2x}$ ہے۔

12.3 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی میں ہم نے پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے پہلے اور دوسرے رتبے کی خطی تفرقی مساوات کو حل کرنا سیکھا۔

12.4 کلیدی الفاظ (Key Words)

پیرامیٹرس کا تغیر، متجانس تفرقی مساوات، اتما می تفاعل، معاون مساوات

12.5 نمونہ امتحانی سوالات (Sample Examination Questions)

12.5.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. پیرامیٹرس کے تغیر کا طریقہ کیا ہے؟

2. اتما می تفاعل لکھو جب کہ $\frac{d^2y}{dx^2} + y = \operatorname{cosec} x$

12.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

درجہ ذیل مساوات کا حل پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کی مدد سے حاصل کریے:

$$1. \frac{d^2y}{dx^2} - y = \frac{2}{1+e^x}$$

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x(1+x) \frac{dy}{dx} + 2(1+x)y = x^3 \quad .2$$

$$(1-x) \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - y = (1-x)^2 \quad .3$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + y = \frac{e^x}{x^2} \quad .4$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = x \quad .5$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - 2 \frac{dy}{dx} + y = e^x \quad .6$$

12.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} - 3 \frac{dy}{dx} + 2y = \frac{e^x}{1+e^x}$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کی مدد سے حل کریے جب کہ اس کے لیے اتمائی

تفاعل $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ ہے۔

2. مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} + 4y = 4 \tan 2x$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کی مدد سے حل کریں۔

جوابات:

12.5.1 معروضی سوالات کے جوابات

$$C.F. = A \cos x + B \sin x \quad .2$$

12.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

درجہ ذیل مساوات کا حل پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کی مدد سے حاصل کریے:

$$y = Ae^x + Be^{-x} - 1 + e^x \log \left(\frac{1+e^x}{e^x} \right) - e^{-x} \log(1+e^x) \quad .1$$

$$y = -\frac{x^2}{2} - \frac{x}{4} + Ax + Bxe^{2x} \quad .2$$

$$y = Ax + Be^x + (1+x+x^2) \quad .3$$

$$y = e^x(A+Bx) - e^x(1+\log x) \quad .4$$

$$y = A \cos x + B \sin x + x \quad .5$$

$$y = e^x(A+Bx) + \frac{x^2 e^x}{2} \quad .6$$

12.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + (e^x + e^{2x}) \log(e^{-x} + 1) - 1 \quad .1$$

$$y = A \cos 2x + B \sin 2x - \cos 2x \log|\sec 2x + \tan 2x| \quad .2$$

12.6 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Text Book of Differential Equations, Khalil Ahmad, Real World Education Publishers, New Delhi
2. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhanian, S.Chand & Co., New Delhi
3. A Text Book of B.Sc. (Mathematics), Volume –I , V. Venkateshwara Rao and others, S. Chand & Company

اکائی 13۔ جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل-I

(Formation of Partial Differential Equations – I)

اکائی کے اجزا

تمہید	13.0
مقاصد	13.1
جزوی تفرقی مساواتیں	13.2
جزوی تفرقی مساوات کا رتبہ اور درجہ	13.2.1
خطی اور غیر خطی جزوی تفرقی مساواتیں	13.2.2
جزوی تفرقی مساواتوں کی درجہ بندی	13.2.3
جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل	13.2.4
اکتسابی نتائج	13.3
کلیدی الفاظ	13.4
نمونہ امتحانی سوالات	13.5
معروضی جوابات کے حامل سوالات	13.5.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	13.5.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	13.5.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	13.6

13.0 تمہید (Introductions)

جزوی تفرقی مساواتوں کو مختلف اقسام کے مظاہر کی وضاحت کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے، جیسے آواز، حرارت، ڈیفوزن، الیکٹروڈائنامکس، الاسٹی سٹی اور کوانٹم میکینکس۔ اس لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ تکنیک تیار کی جائے جس کی مدد سے جزوی تفرقی مساواتوں کی وسیع اقسام کا حل حاصل کیا جاسکے۔

13.1 مقاصد (Objectives)

- اس اکائی کے مکمل ہونے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:
1. آپ کو جزوی تفرقی مساواتوں کی مختلف اقسام کی بنیادی جانکاری حاصل ہو جائے۔
 2. جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل کسی دیے گئے ضابطہ سے اختیاری مستقلات کو ساقط کر کے کرنا سیکھ سکیں۔

13.2 جزوی تفرقی مساواتیں (Partial Differential Equations)

تعریف: وہ مساوات جس میں دو یا زیادہ غیر تابع (Independent) متغیر (Variable) کے کسی تفاعل کے ایک یا زیادہ جزوی مشتقات (Derivatives) موجود ہوں، جزوی تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔ درجہ ذیل جزوی تفرقی مساوات کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں:

$$\begin{aligned} 1. \quad \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} &= z + xy \\ 2. \quad \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \frac{\partial^3 z}{\partial y^3} &= 2x \frac{\partial z}{\partial x} \\ 3. \quad z \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} &= x \\ 4. \quad \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} &= xyz \\ 5. \quad \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} &= \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y}\right)^{1/2} \\ 6. \quad y \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 \right\} &= z \frac{\partial z}{\partial y} \end{aligned}$$

13.2.1 جزوی تفرقی مساوات کا رتبہ اور درجہ (Degree & Order of Partial Differential Equations)

تعریف: کسی جزوی تفرقی مساوات میں موجود اعظم ترین جزوی مشتق کے رتبے کو اس جزوی تفرقی مساوات کا رتبہ کہتے ہیں۔ مثال کے لیے مساوات 1، 3، 4 اور 6 پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات ہیں، جب کہ مساوات 5 دوسرے رتبے کی اور مساوات 2 کا رتبہ تین ہے۔

تعریف: کسی جزوی تفرقی مساوات کو ریشن لائز (Rationalize) کرنے کے بعد اس میں موجود اعظم ترین رتبہ کے مشتق کی قوت (Power) کو اس جزوی تفرقی مساوات کا درجہ (Degree) کہتے ہیں۔ مثال کے لیے مساوات 1، 2، 3 اور 4 پہلے درجے کی جزوی تفرقی مساوات ہیں، جب کہ مساوات 5 اور 6 کا درجہ دو ہے۔

13.2.2 خطی اور غیر خطی جزوی تفرقی مساواتیں (linear & Nonlinear Partial Differential Equations)

تعریف: اگر کسی جزوی تفرقی مساوات میں موجود تابع متغیر (Dependent Variable) اور اس کے جزوی مشتق کا درجہ ایک ہو اور وہ ضرب کی شکل میں بھی موجود نہ ہوں، تب اس طرح کی مساوات کو خطی جزوی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔ اگر جزوی تفرقی مساوات خطی نہ ہو تو اس مساوات کو غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔

مثال کے لیے مساوات 1 اور 4 خطی جزوی تفرقی مساوات ہیں، جب کہ مساوات 2، 3، 5 اور 6 غیر خطی جزوی تفرقی مساوات ہیں۔
نوٹ: اس اکائی میں ہم دو غیر تابع متغیرات x اور y کو تمام جگہ استعمال کریں گے اور z کو تابع متغیر کی طرح ہی استعمال کریں گے۔ کچھ علامتی اظہار درجہ ذیل ہیں جو اس اکائی میں استعمال ہوں گے:

$$p = \frac{\partial z}{\partial x}, q = \frac{\partial z}{\partial y}, r = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, s = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, t = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$$

اگر n غیر تابع متغیرات $x_1, x_2, \dots, x_n$ کا کوئی انجان (Unknown) تفاعل جس کا تابع متغیر z ہو اس کے لیے درجہ ذیل علامتی اظہار استعمال ہوں گے:

$$p_1 = \frac{\partial z}{\partial x_1}, p_2 = \frac{\partial z}{\partial x_2}, p_3 = \frac{\partial z}{\partial x_3}, \dots, p_n = \frac{\partial z}{\partial x_n}$$

یا کچھ جگہ یہ علامتی اظہار بھی استعمال کیے جاتے ہیں

$$u_x = \frac{\partial z}{\partial x}, u_y = \frac{\partial z}{\partial y}, u_{xy} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

13.2.3 جزوی تفرقی مساواتوں کی درجہ بندی (Classification of Partial Differential Equations)

(a) خطی جزوی تفرقی مساوات (Linear Partial Differential Equations): اگر کسی مساوات $f(x, y, z, p, q) = 0$ میں p, q, z خطی ہوں تو اس مساوات کو خطی جزوی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں خطی جزوی تفرقی مساوات اس شکل میں ہوتی ہے

$$P(x, y)p + Q(x, y)q = R(x, y)z + S(x, y)$$

مثال کے لیے $yx^2p + xy^2q = xyz + x^2y^3$ اور $p + q = z + xy$ دونوں پہلے رتبے کی خطی جزوی تفرقی مساوات ہیں۔

(b) نصف خطی جزوی تفرقی مساوات (Semi-Linear Partial Differential Equations): پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات $f(x, y, z, p, q) = 0$ میں اگر p اور q خطی ہوں اور p اور q کے ضریب x اور y کے ہی تفاعل ہوں تو اس مساوات کو نصف خطی جزوی تفرقی مساوات کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں نصف خطی جزوی تفرقی مساوات اس شکل میں ہوتی ہے

$$P(x, y)p + Q(x, y)q = R(x, y, z)$$

مثال کے لیے $xyp + x^2yq = x^2y^2z^2$ اور $yp + xq = \frac{x^2z^2}{y^2}$ دونوں پہلے رتبے کی نصف خطی جزوی تفرقی مساوات ہیں۔

(c) قواسمی خطی جزوی تفرقی مساوات (Quasi-Linear Partial Differential Equations): پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات $f(x, y, z, p, q) = 0$ قواسمی خطی جزوی تفرقی مساوات کہلاتی ہے اگر یہ p اور q میں خطی ہوں اور وہ اس شکل میں ہو

$$P(x, y, z)p + Q(x, y, z)q = R(x, y, z)$$

مثال کے لیے $x^2zp + y^2zq = xy$ اور $(x^2 - yz)p + (y^2 - zx)q = z^2 - xy$ دونوں پہلے رتبے کی قواسمی خطی جزوی تفرقی مساوات ہیں۔

(d) غیر خطی جزوی تفرقی مساوات (Non-Linear Partial Differential Equations): پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات $f(x, y, z, p, q) = 0$ غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کہلاتی ہے اگر یہ p اور q میں خطی نہ ہو۔

مثال کے لیے $x^2p^2 + y^2q^2 = z^2$ اور $p^2 + q^2 = 1$ ، $pq = z$ سبھی پہلے رتبے کی غیر خطی جزوی تفرقی مساوات ہیں۔

13.2.4 جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل (Formation of Partial Differential Equations)

13.2.4.1 اختیاری مستقل کے اخراج سے تشکیل (Formation by Elimination of Arbitrary Constant)

مان لو کہ $f(x, y, z, a, b) = 0$ کوئی مساوات ہے، جہاں a اور b اختیاری مستقلات ہیں۔ مان لو کہ z دو غیر تابع متغیرات x اور y کا ایک تفاعل ہے۔ اب

$$f(x, y, z, a, b) = 0 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی طور پر (Partially) الگ الگ تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \quad \dots(2a) \quad \text{یا}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \quad \dots(2b) \quad \text{اور اسی طرح}$$

مساوات (1) اور (2a)، (2b) کی مدد سے اختیاری مستقلات کو ہٹا کر درجہ ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے

$$f(x, y, z, p, q) = 0 \quad \dots(3)$$

جو کہ پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

نوٹ: اگر کسی مساوات میں غیر تابع متغیر سے زیادہ اختیاری مستقل موجود ہوں تو اس سے حاصل جزوی تفرقی مساوات کا رتبہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم درجہ ذیل تین نتائج پر پہنچتے ہیں:

1. جب کسی مساوات میں غیر تابع متغیر کی تعداد اختیاری مستقلات سے زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں ایک سے زیادہ پہلے رتبے کی جزوی تفرقی

مساوات حاصل ہوتی ہیں۔ مثال کے لیے اگر a کوئی اختیاری مستقل ہو اور

$$z = ax + y \quad \dots(1)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = a, \frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

مساوات (1) میں $a = \frac{\partial z}{\partial x}$ رکھنے پر

$$z = x \frac{\partial z}{\partial x} + y$$

مساوات $1 = \frac{\partial z}{\partial y}$ اور $z = x \frac{\partial z}{\partial x} + y$ دی گئی مساوات کے لیے جزوی تفرقی مساوات ہیں۔

2. جب کسی مساوات میں غیر تابع متغیر کی تعداد اختیاری مستقل کی تعداد کے برابر ہوتی ہے تو ہمیں پہلے رتبے کی یکتا (Unique) جزوی

تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے لیے اگر a اور b اختیاری مستقلات ہوں اور

$$az + b = a^2x + y \quad \dots(1)$$

$$\Rightarrow a \frac{\partial z}{\partial x} = a^2, a \frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

اس لیے $1 = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}$ دی گئی مساوات کے لیے یکتا جزوی تفرقی مساوات ہے۔

3. جب کسی مساوات میں غیر تابع متغیر کی تعداد اختیاری مستقلات کی تعداد سے کم ہوتی ہے تو ہمیں ایک سے زیادہ رتبہ کی جزوی تفرقی

مساوات حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے لیے اگر a ، b اور c اختیاری مستقلات ہوں اور

$$z = ax + by + cxy \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو دوبارہ لحاظ x اور دوبارہ لحاظ y جزوی تفرقی کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = a + cy \quad \dots(2)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \quad \dots(3)$$

اور

$$\frac{\partial z}{\partial y} = b + cx \quad \dots(4)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0 \quad \dots(5)$$

مساوات (2) کو بہ لحاظ y جزوی تفرقی کرنے پر

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = c \quad \dots(6)$$

مساوات (2) میں x سے اور مساوات (4) میں y سے ضرب کرنے پر

$$x \frac{\partial z}{\partial x} = ax + cxy \quad \dots(7)$$

$$y \frac{\partial z}{\partial y} = by + cxy \quad \dots(8)$$

مساوات (7) اور (8) سے

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = (ax + by + cxy) + cxy$$

مساوات (1) اور (4) کی مدد سے

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \quad \dots(9)$$

اس طرح ہمیں تین جزوی تفرقی مساواتیں (3)، (5) اور (9) حاصل ہوتی ہیں۔ یہ تمام دوسرے رتبے کی جزوی تفرقی مساواتیں ہیں۔

مثال 1۔ اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے $z = ax + by + a^2 + b^2$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل دیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = ax + by + a^2 + b^2 \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرقی کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = a$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = b$$

اور

a اور b کی یہ قیمتیں مساوات (1) میں درج کرنے پر

$$z = x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2$$

جو کہ پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 2- اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے $z = (x - a)^2 + (y - b)^2$ سے جزوی تفرقی مساوات کو تشکیل دیجیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = (x - a)^2 + (y - b)^2 \quad \dots (1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2(x - a)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2(y - b)$$

اور

ان مساواتوں سے $x - a$ اور $y - b$ کی یہ قیمتیں مساوات (1) میں درج کرنے پر

$$z = \left(\frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{1}{2} \frac{\partial z}{\partial y} \right)^2$$

$$4z = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2$$

$\Rightarrow$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے پہلے رتبے اور دوسرے درجے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 3- اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے درجہ ذیل ضابطوں کے لیے جزوی تفرقی مساوات تشکیل کرو:

$$z = a(x + y) + b \quad (i)$$

$$z = ax + by + ab \quad (ii)$$

$$z = ax + a^2y^2 + b \quad (iii)$$

$$z = (x + a)(y + b) \quad (iv)$$

حل۔

(i) دی گئی مساوات ہے

$$z = a(x + y) + b \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = a$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = a$$

اور

اس لیے

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial y}$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے پہلے رتبے اور پہلے درجے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

(ii) دی گئی مساوات ہے

$$z = ax + by + ab \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = a$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = b$$

اور

a اور b کی یہ قیمتیں مساوات (1) میں درج کرنے پر

$$z = x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے پہلے رتبے اور پہلے درجے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

(iii) دی گئی مساوات ہے

$$z = ax + a^2 y^2 + b \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = a$$

.....(2)

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2a^2 y$$

اور.....(3)

a کی یہ قیمت مساوات (3) میں درج کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 y$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے پہلے رتبے اور دوسرے درجے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

(iv) دی گئی مساوات ہے

$$z = (x + a)(y + b) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y + b$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x + a \quad \text{اور}$$

ان مساواتوں سے $x + a$ اور $y + b$ کی یہ قیمتیں مساوات (1) میں درج کرنے پر

$$z = \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے پہلے رتبے اور پہلے درجے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 4۔ اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے $z = axe^y + \frac{1}{2}a^2e^{2y} + b$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = axe^y + \frac{1}{2}a^2e^{2y} + b \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = ae^y \quad \dots(2)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = axe^y + a^2e^{2y} = ae^y(x + ae^y) \quad \text{اور} \dots(3)$$

ae^y کی یہ قیمت مساوات (3) میں درج کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial x} \left(x + \frac{\partial z}{\partial x}\right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x \frac{\partial z}{\partial x} + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے ضروری جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 5۔ اختیاری مستقلات h اور k کو ساقط کر کے $(x - h)^2 + (y - k)^2 + z^2 = r^2$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 + z^2 = r^2 \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} 2(x - h) + 2z \frac{\partial z}{\partial x} &= 0 \\ \Rightarrow (x - h) &= -z \frac{\partial z}{\partial x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2(y - k) + 2z \frac{\partial z}{\partial y} &= 0 \quad \text{اور} \\ \Rightarrow (y - k) &= -z \frac{\partial z}{\partial y} \end{aligned}$$

$x - h$ اور $y - k$ کی یہ قیمتیں مساوات (1) میں درج کرنے پر

$$\begin{aligned} \left(-z \frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(-z \frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + z^2 &= r^2 \\ \Rightarrow z^2 \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1 \right\} &= r^2 \end{aligned}$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 6۔ اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے $z = (x^2 + a)(y^2 + b)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = (x^2 + a)(y^2 + b) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= 2x(y^2 + b) \\ \Rightarrow \frac{1}{2x} \frac{\partial z}{\partial x} &= y^2 + b \end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2y(x^2 + a) \quad \text{اور}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2y} \frac{\partial z}{\partial y} = x^2 + a$$

$x^2 + a$ اور $y^2 + b$ کی یہ قیمتیں مساوات (1) میں درج کرنے پر

$$z = \left(\frac{1}{2y} \frac{\partial z}{\partial y} \right) \left(\frac{1}{2x} \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$\Rightarrow$

$$4xyz = \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 7- اختیاری مستقلات A اور p کو ساقط کر کے $z = Ae^{pt} \sin px$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = Ae^{pt} \sin px \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ t دوبار جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = Ape^{pt} \cos px$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -Ap^2 e^{pt} \sin px$$

اور

$$\frac{\partial z}{\partial t} = Ape^{pt} \sin px$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = Ap^2 e^{pt} \sin px$$

اس طرح

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = -\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 8- تمام قائم دائری مقروط (Right Circular Cones) کے سٹ جن کی محور (Axis)، z - محور کو چھوتی (Coincide) ہے۔ اس کے

لیے جزوی تفرقی مساوات حاصل کریے۔

حل۔ تمام قائم دائری مقروط کے سٹ جن کی محور (Axis)، z-محور کو چھوتی (Coincide) ہے اور جس کا نصف عمودی زاویہ ϕ اور جس کا راس یا چوٹی (Vertex) $(0,0,a)$ ہے، کی عام مساوات (General Equation) درجہ ذیل ہوتی ہے

$$x^2 + y^2 = (z - a)^2 \tan^2 \phi \quad \dots (1)$$

جہاں a اور ϕ اختیاری مستقلات ہیں۔

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y دوبار جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} 2x &= 2(z - a) \frac{\partial z}{\partial x} \tan^2 \phi \\ \Rightarrow x &= (z - a) \tan^2 \phi \frac{\partial z}{\partial x} \quad \dots (2) \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} 2y &= 2(z - a) \frac{\partial z}{\partial y} \tan^2 \phi \\ \Rightarrow y &= (z - a) \tan^2 \phi \frac{\partial z}{\partial y} \quad \dots (3) \end{aligned}$$

مساوات (2) کو مساوات (3) سے تقسیم دین پر

$$\begin{aligned} \frac{x}{y} &= \frac{\frac{\partial z}{\partial x}}{\frac{\partial z}{\partial y}} \\ \Rightarrow x \frac{\partial z}{\partial y} &= y \frac{\partial z}{\partial x} \end{aligned}$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 9۔ ثابت کرو کہ تمام مقروط جن کا راس یا چوٹی (Vertex) مبدا (Origin) پر ہو، کی جزوی تفرقی مساوات $px + qy = z$ ہوگی۔

حل۔ کسی مقروط کی عام مساوات، جس کا راس یا چوٹی مبدا پر ہے، درجہ ذیل ہوتی ہے

$$ax^2 + by^2 + cz^2 + 2fyz + 2gxz + 2hxy = 0 \quad \dots (1)$$

جہاں a, b, c, f, g, h پیرامیٹرز ہیں۔ اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$2ax + 2cz \frac{\partial z}{\partial x} + 2fy \frac{\partial z}{\partial x} + 2gz + 2gx \frac{\partial z}{\partial x} + 2hy = 0$$

$$\Rightarrow ax + czp + fyp + gz + gxp + hy = 0 \quad \text{..... (2)}$$

اور

$$2by + 2cz \frac{\partial z}{\partial y} + 2fy \frac{\partial z}{\partial y} + 2fz + 2gx \frac{\partial z}{\partial y} + 2hx = 0$$

$$\Rightarrow by + czq + f y q + fz + gxq + hx = 0 \quad \text{..... (3)}$$

مساوات (2) کو x سے اور مساوات (3) کو y سے ضرب دے کر جمع کرنے پر

$$\begin{aligned} \Rightarrow (ax^2 + by^2 + fyz + gxz + 2hxy) + (gx + fy + cz)(px + qy) &= 0 \\ \Rightarrow -(cz^2 + fyz + gxz) + (gx + fy + cz)(px + qy) &= 0 \\ \Rightarrow -z(cz + fy + gx) + (gx + fy + cz)(px + qy) &= 0 \\ \Rightarrow (gx + fy + cz)(px + qy - z) &= 0 \end{aligned}$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 10۔ درجہ ذیل ضابطوں سے اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو:

$$2z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad (i)$$

$$2z = (ax + y)^2 + b \quad (ii)$$

حل۔

(i) دی گئی مساوات ہے

$$2z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad \text{..... (1)}$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2 \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{2x}{a^2} \\ xp &= \frac{x^2}{a^2} \quad \text{..... (2)} \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \Rightarrow 2 \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{2y}{b^2} \\ qy &= \frac{y^2}{b^2} \quad \text{..... (3)} \end{aligned}$$

مساوات (2) اور مساوات (3) کو جمع کرنے پر

$$2z = px + qy$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

(ii) دی گئی مساوات ہے

$$2z = (ax + y)^2 + b \quad \dots (1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$2 \frac{\partial z}{\partial x} = 2a(ax + y)$$

$$\Rightarrow p = a(ax + y) \quad \dots (2)$$

اور

$$2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2(ax + y)$$

$$\Rightarrow q = (ax + y) \quad \dots (3)$$

مساوات (2) اور مساوات (3) سے

$$\frac{p}{q} = a$$

مساوات (3) میں a کی قدر درج کرنے پر

$$q = \frac{p}{a}x + y$$

$$\Rightarrow q^2 = px + qy$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 11۔ اختیاری مستقلات b, a اور c کو ساقط کر کے $z = a(x + y) + b(x - y) + abt + c$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = a(x + y) + b(x - y) + abt + c \quad \dots (1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x ، y اور بہ لحاظ t جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= a + b \\ \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} &= a - b \end{aligned}$$

اور

$$\frac{\partial z}{\partial t} = ab$$

ہم جانتے ہیں کہ

$$(a + b)^2 + (a - b)^2 = 4ab$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = 4 \frac{\partial z}{\partial t}$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 12۔ اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے $\log(az - 1) = x + ay + b$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\log(az - 1) = x + ay + b \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} \frac{a \frac{\partial z}{\partial x}}{az - 1} &= 1 \\ \Rightarrow a &= \frac{-1}{\frac{\partial z}{\partial x} - z} \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{a \frac{\partial z}{\partial y}}{az - 1} &= a \\ \Rightarrow a &= \frac{1 + \frac{\partial z}{\partial y}}{z} \end{aligned}$$

اس لیے

$$\frac{-1}{\frac{\partial z}{\partial x} - z} = \frac{1 + \frac{\partial z}{\partial y}}{z}$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{\frac{\partial z}{\partial x} - z} = \frac{1 + \frac{\partial z}{\partial y}}{z}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial z}{\partial x} - z\right) \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y}\right) = -z$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y}\right) - z - z \frac{\partial z}{\partial y} = -z$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y}\right) = z \frac{\partial z}{\partial y}$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 13۔ اختیاری مستقلات a, b, c کو ساقط کر کے $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{.....(1)}$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} \frac{2x}{a^2} + \frac{2z}{c^2} \frac{\partial z}{\partial x} &= 0 \\ \Rightarrow c^2 x + a^2 z \frac{\partial z}{\partial x} &= 0 \quad \text{.....(2)} \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{2y}{b^2} + \frac{2z}{c^2} \frac{\partial z}{\partial y} &= 0 \\ \Rightarrow c^2 y + b^2 z \frac{\partial z}{\partial y} &= 0 \quad \text{.....(3)} \end{aligned}$$

مساوات (2) کو بہ لحاظ x اور مساوات (3) کو بہ لحاظ y ایک اور مرتبہ جزوی تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$c^2 + a^2 \left\{ z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 \right\} = 0 \quad \text{.....(4)}$$

اور

$$c^2 + b^2 \left\{ z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 \right\} = 0 \quad \dots(5)$$

مساوات (2) اور مساوات (4) سے

$$\begin{aligned} & -\frac{a^2 z}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + a^2 \left\{ z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 \right\} = 0 \\ \Rightarrow & -\frac{z}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 = 0 \\ \Rightarrow & -z \frac{\partial z}{\partial x} + xz \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + x \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 = 0 \quad \dots(6) \end{aligned}$$

اسی طرح مساوات (3) اور مساوات (5) سے

$$\Rightarrow -z \frac{\partial z}{\partial y} + yz \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + y \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 = 0 \quad \dots(7)$$

اب مساوات (2) کو بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} & 0 + a^2 \left\{ z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} \right\} = 0 \\ \Rightarrow & z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \quad \dots(8) \end{aligned}$$

مساواتیں (6)، (7) اور (8) دی گئی مساوات کے لیے ممکنہ جزوی تفرقی مساوات ہیں۔

مثال 14۔ مبداسے ایک مستقل (Constant) دوری پر موجود تمام مستویوں (Planes) کے لیے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ فرض کرو کہ مبداسے ایک مستقل (Constant) دوری a پر مستویوں (Planes) کی مساوات درجہ ذیل ہے

$$lx + my + nz = a \quad \dots(1)$$

اور سطح پر عمودی سمتی کو سائنس (Direction Cosines) اس طرح سے ہیں کہ

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1 \quad \dots(2)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} & l + n \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\ \Rightarrow & l = -n \frac{\partial z}{\partial x} \quad \dots(3) \end{aligned}$$

اور

$$m + n \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$\Rightarrow m = -n \frac{\partial z}{\partial y} \quad \dots(4)$$

مساوات (2) میں l اور m کی قیمتیں رکھنے پر

$$\left(-n \frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(-n \frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + n^2 = 1$$

$$\Rightarrow \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1 \right\} n^2 = 1$$

$$\Rightarrow n = \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1 \right\}^{-1/2}$$

مساوات (3) اور مساوات (4) سے

$$l = - \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1 \right\}^{-1/2} \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$m = - \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1 \right\}^{-1/2} \frac{\partial z}{\partial y}$$

مساوات (1) میں l ، m اور n کی قیمتیں رکھنے پر

$$- \left\{ \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1 \right\}^{-1/2} \left(\frac{\partial z}{\partial x} x + \frac{\partial z}{\partial y} y - z \right) = a$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} x + \frac{\partial z}{\partial y} y - z = -a \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + 1}$$

$$\Rightarrow z = px + qy + a\sqrt{p^2 + q^2 + 1}$$

جو کہ مبدا سے مستقل (Constant) دوری پر موجود تمام سطحوں (Planes) کے لیے جزوی تفرقی مساوات۔

مثال 15- ثابت کرو کہ $z = ax + by + f(a, b)$ سے a, b کے لیے جزوی تفرقی مساوات $z = px + qy + f(p, q)$ ہے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = ax + by + f(a, b) \quad \dots(1)$$

من درجہ بالا مساوات کو بہ لحاظ x اور y جزوی تفرق کرنے پر

$$\Rightarrow \begin{aligned} p &= \frac{\partial z}{\partial x} = a \\ q &= \frac{\partial z}{\partial y} = b \end{aligned}$$

مساوات (1) میں a اور b کی قیمتیں رکھنے پر

$$z = px + qy + f(p, q)$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

13.3 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ نے جزوی تفرقی مساوات کی تعریف اور اس کی مختلف اقسام کی بنیادی جانکاری حاصل کی اور کسی مساوات سے اختیاری مستقلات کو ساقط کر کے جزوی تفرقی مساوات کو تشکیل کرنا سیکھا۔

13.4 کلیدی الفاظ (Key Words)

خطی، غیر خطی، جزوی تفرقی مساوات، نصف خطی تفرقی مساوات، قواسمی خطی جزوی تفرقی مساوات

13.5 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

13.5.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. خطی اور غیر خطی جزوی تفرقی مساواتوں کی تعریف کرو۔
2. کسی جزوی تفرقی مساوات کے رتبے اور درجہ کی تعریف کرو۔
3. $yp + xq = \frac{x^2 z^2}{y^2}$ نصف خطی جزوی تفرقی مساوات ہے۔ (T/F)
4. مساوات $f(x, y, z, p, q) = 0$ ایک جزوی تفرقی مساوات کہلاتی ہے اگر یہ p اور q میں خطی ہوں اور اس کی شکل $P(x, y, z)p + Q(x, y, z)q = R(x, y, z)$ ہو۔
5. $pq = z$ دونوں پہلے رتبے کی خطی جزوی تفرقی مساوات ہیں۔ (T/F)
6. مساوات $(x^2 - yz)p + (y^2 - zx)q = z^2 - xy$ پہلے رتبے کی قواسمی - خطی جزوی تفرقی مساوات ہے۔ (T/F)

7. جب کسی مساوات میں غیر تابع متغیر کی تعداد اختیاری مستقل سے زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں پہلے رتبے کی ایک جزوی تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہیں۔
(T/F)

8. جب کسی مساوات میں غیر تابع متغیر کی تعداد اختیاری مستقل کی تعداد سے کم ہوتی ہے تو ہمیں ایک سے زیادہ رتبے کی جزوی تفرقی مساوات حاصل ہوتی ہے۔
(T/F)

13.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

1. اختیاری مستقالات a اور b کو ساقط کر کے $z = ae^{-b^2t} \cos bx$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔
2. اختیاری مستقالات a اور b کو ساقط کر کے $z = ax^3 + by^3$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔
3. اختیاری مستقالات a اور b کو ساقط کر کے $4z = \left(ax + \frac{y}{a} + b\right)^2$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔
4. اختیاری مستقالات a اور b کو ساقط کر کے $z = ax^2 + bxy + cy^2$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔
5. اختیاری مستقالات a اور b کو ساقط کر کے $z^2 = ax^3 + by^3 + ab$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔
6. اختیاری مستقالات a اور b کو ساقط کر کے $ax^2 + by^2 + z^2 = 1$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

13.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. ان تمام کرہوں (Spheres) کے لیے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو جن کا مرکز XY مستوی (Plane) پر ہو اور جس کا نصف قطر 4 ہو۔
2. x اور y محاور پر یکساں مقطوعہ (Intercept) بنانے والی مستوی کی جزوی تفرقی مساوات حاصل کریں۔
3. ان کرہوں کے خاندان کے لیے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو جس کا مرکز مستوی $x - y = 0$ پر ہو اور جس کا نصف قطر 7 ہو۔
4. z -محور پر مرکوز والے تمام کرہوں کے لیے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو۔

جوابات:

13.5.1

T .3

4. قواسی خطی

F .5

T .6

F .7

T .8

13.5.2

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial z}{\partial t} \quad .1$$

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 3z \quad .2$$

$$z = \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) \quad .3$$

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2z \quad .4$$

$$9x^2 y^2 z = 6x^3 y^2 \frac{\partial z}{\partial x} + 6x^2 y^3 \frac{\partial z}{\partial y} + 4 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) z \quad .5$$

$$z \left(z - x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 1 \quad .6$$

13.5.3

$$(x - y)^2 (p^2 + q^2 + 1) = 16(p - q)^2 \quad .1$$

$$p - q = 0 \quad .2$$

$$(x - y)^2 (p^2 + q^2 + 1) = 49(p - q) \quad .3$$

$$xq - yp = 0 \quad .4$$

13.7 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhania, S.Chand & Co., New Delhi

اکائی 14۔ جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل-II

(Formation of Partial Differential Equations – II)

اکائی کے اجزا

تمہید	14.0
مقاصد	14.1
جزوی تفرقی مساواتیں	14.2
اختیاری تفاعل کے اخراج سے جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل	14.2.1
اکتسابی نتائج	14.3
کلیدی الفاظ	14.4
نمونہ امتحانی سوالات	14.5
معروضی جوابات کے حامل سوالات	14.5.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	14.5.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	14.5.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	14.6

14.0 تمہید (Introductions)

گزشتہ اکائی میں ہم نے جزوی تفرقی مساوات کی بنیادی معلومات حاصل کی اور اختیاری مستقلات کے اخراج سے اس کی تشکیل دینا سیکھا ہے۔ اس اکائی میں ہم جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل اختیاری تفاعلات کے اخراج سے حاصل کرنا سیکھیں گے۔

14.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل اختیاری تفاعلات کو ساقط کر کے کر سکیں۔

14.2 جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل (Formation of Partial Differential Equations)

14.2.1 اختیاری تفاعل کے اخراج سے جزوی تفرقی مساواتوں کی تشکیل

(Formation of Partial Differential Equations by Elimination of Arbitrary Functions)

مان لو کہ $f(u, v) = 0$ کوئی مساوات ہے، جہاں u اور v غیر تابع متغیرات y, x اور z کے تفاعلات ہیں اور f ایک اختیاری تفاعل ہے۔
اب

$$f(u, v) = 0 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی طور پر (Partially) الگ الگ تفرق کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) = 0 \quad \dots(2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) سے $\frac{\partial f}{\partial u}$ اور $\frac{\partial f}{\partial v}$ کو ہٹانے پر

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} p \right) \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} q \right) - \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} q \right) \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} p \right) &= 0 \\ p \left(\frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial z} \right) + q \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial x} \right) &= \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} \\ Pp + Qq &= R \end{aligned} \quad \dots(4)$$

جہاں

$$P = \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial z}$$

$$Q = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$R = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y}$$

مساوات (4) پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

نوٹ: اگر کسی مساوات میں دو اختیاری تفاعلات موجود ہوں تو اس سے حاصل جزوی تفرقی مساوات کا رتبہ دو سے زیادہ ہوگا۔

اب ہم کچھ مثالوں سے اختیاری تفاعل کے اخراج سے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرنا سمجھتے ہیں۔

مثال 1- اختیاری تفاعل ϕ کو ساقط کر کے $z = e^{mt} \phi(t - x)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = e^{mt} \phi(t - x) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ t جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{mt} \frac{\partial}{\partial x} \{ \phi(t - x) \} \times (-1)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -e^{mt} \phi'(t - x) \quad \dots(2)$$

$\Rightarrow$

اور

$$\frac{\partial z}{\partial t} = m e^{mt} \phi(t - x) + e^{mt} \frac{\partial}{\partial t} \phi(t - x)$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} = m e^{mt} \phi(t - x) + e^{mt} \phi'(t - x) \quad \dots(3)$$

$\Rightarrow$

مساوات (1)، (2) اور (3) سے

$$\frac{\partial z}{\partial t} = m z - \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial x} = m z$$

$\Rightarrow$

جو کہ پہلے رتبے کی مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 2- اختیاری تفاعلات ϕ اور ψ کو ساقط کر کے $z = \phi(x + iy) + \psi(x - iy)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = \phi(x + iy) + \psi(x - iy) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = p = \phi'(x + iy) + \psi'(x - iy) \quad \dots(2)$$

اور

$$\frac{\partial z}{\partial y} = q = i\phi'(x + iy) - i\psi'(x - iy) \quad \dots(3)$$

مساوات (2) کو بہ لحاظ x اور مساوات (3) کو بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \phi''(x + iy) + \psi''(x - iy) \quad \dots(4)$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= i^2 \phi''(x + iy) + i^2 \psi''(x - iy) \\ &= -\phi''(x + iy) - \psi''(x - iy) \end{aligned}$$

مساوات (4) سے

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= -\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 0 \end{aligned}$$

اس لیے $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ دوسرے رتبے کی مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 3- اختیاری تفاعل ϕ کو ساقط کر کے $z = \phi(x^2 + y^2)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = \phi(x^2 + y^2) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \{\phi(x^2 + y^2)\} \times (2x) \\ \Rightarrow p &= 2x\phi'(x^2 + y^2) \quad \dots(2) \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \{\phi(x^2 + y^2)\} \times (2y) \\ \Rightarrow q &= 2y\phi'(x^2 + y^2) \quad \dots(3) \end{aligned}$$

مساوات (2) اور (3) سے

$$\frac{p}{q} = \frac{x}{y}$$

$$\Rightarrow py - qx = 0$$

جو کہ پہلے رتبے کی مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 4۔ اختیاری تفاعل ϕ کو ساقط کر کے $z = \phi\left(\frac{y}{x}\right)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = \phi\left(\frac{y}{x}\right) \quad \dots(1)$$

من درجہ بالا مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ \phi\left(\frac{y}{x}\right) \right\} \times \left(-\frac{y}{x^2} \right)$$

$$\Rightarrow p = -\frac{y}{x^2} \phi'\left(\frac{y}{x}\right) \quad \dots(2)$$

اور

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left\{ \phi\left(\frac{y}{x}\right) \right\} \times \left(\frac{1}{x} \right)$$

$$\Rightarrow q = \frac{1}{x} \phi'\left(\frac{y}{x}\right) \quad \dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) سے

$$\frac{p}{q} = \frac{-\frac{y}{x^2}}{\frac{1}{x}} = -\frac{y}{x}$$

$$\Rightarrow px + qy = 0$$

جو کہ پہلے رتبے کی مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 5۔ اختیاری تفاعل f کو ساقط کر کے $z = y^2 + 2f\left(\frac{1}{x} + \log y\right)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = y^2 + 2f\left(\frac{1}{x} + \log y\right) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left\{ 2f\left(\frac{1}{x} + \log y\right) \right\} \times \left(-\frac{1}{x^2} \right)$$

$$\Rightarrow p = -\frac{2}{x^2} f' \left(\frac{1}{x} + \log y \right)$$

$$\Rightarrow -px^2 = 2f' \left(\frac{1}{x} + \log y \right) \quad \dots(2)$$

اور

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2y + \frac{\partial}{\partial y} \left\{ 2f \left(\frac{1}{x} + \log y \right) \right\} \times \left(\frac{1}{y} \right)$$

$$\Rightarrow q = 2y + \frac{2}{y} f' \left(\frac{1}{x} + \log y \right) \quad \dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) سے

$$q = 2y - \frac{px^2}{y}$$

$$\Rightarrow px^2 + qy = 2y^2$$

جو کہ پہلے رتبے کی مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 6- $lx + my + nz = f(x^2 + y^2 + z^2)$ سے اختیاری تفاعل f کو ہٹائیے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$lx + my + nz = f(x^2 + y^2 + z^2) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$l + n \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \{ f(x^2 + y^2 + z^2) \} \times \left(2x + 2z \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$\Rightarrow l + np = 2(x + zp) f'(x^2 + y^2 + z^2) \quad \dots(2)$$

اور

$$m + n \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \{ f(x^2 + y^2 + z^2) \} \times \left(2y + 2z \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

$$\Rightarrow m + nq = 2(y + zq) f'(x^2 + y^2 + z^2) \quad \dots(3)$$

مساوات (2) اور (3) سے

$$\frac{l + np}{m + nq} = \frac{x + zp}{y + zq}$$

جو کہ پہلے رتبے کی مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 7- $f(x + y + z, x^2 + y^2 - z^2) = 0$ سے اختیاری تفاعل f کو ساقط کریے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$f(x + y + z, x^2 + y^2 - z^2) = 0$$

فرض کرو کہ $u = x + y + z, v = x^2 + y^2 - z^2$ اس لیے

$$f(u, v) = 0 \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial u} (1 + p) + \frac{\partial f}{\partial v} (2x - 2pz) &= 0 \\ \Rightarrow (1 + p) \frac{\partial f}{\partial u} + 2(x - pz) \frac{\partial f}{\partial v} &= 0 \quad \dots(2) \end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial u} (1 + q) + \frac{\partial f}{\partial v} (2y - 2zq) &= 0 \\ \Rightarrow (1 + q) \frac{\partial f}{\partial u} + 2(y - zq) \frac{\partial f}{\partial v} &= 0 \quad \dots(3) \end{aligned}$$

مساوات (2) اور (3) سے

$$\frac{1 + p}{1 + q} = \frac{x - zp}{y - zq}$$

جو کہ پہلے رتبے کی مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مثال 8- $z = \phi(x \cos \alpha + y \sin \alpha - at) + \psi(x \cos \alpha + y \sin \alpha + at)$ سے اختیاری تفاعلات ϕ اور ψ کو ساقط

کر کے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z = \phi(x \cos \alpha + y \sin \alpha - at) + \psi(x \cos \alpha + y \sin \alpha + at) \quad \dots(1)$$

اس مساوات کو دو مرتبہ بہ لحاظ x, y اور بہ لحاظ t جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \phi'(x \cos \alpha + y \sin \alpha - at) \cos \alpha + \psi'(x \cos \alpha + y \sin \alpha + at) \cos \alpha$$

اور پھر

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \phi''(x \cos \alpha + y \sin \alpha - at) \cos^2 \alpha + \psi''(x \cos \alpha + y \sin \alpha + at) \cos^2 \alpha \quad \dots(2)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \phi'(x \cos \alpha + y \sin \alpha - at) \sin \alpha + \psi'(x \cos \alpha + y \sin \alpha + at) \sin \alpha$$

اور پھر

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \phi''(x \cos \alpha + y \sin \alpha - at) \sin^2 \alpha + \psi''(x \cos \alpha + y \sin \alpha + at) \sin^2 \alpha \dots (3)$$

اور

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \phi'(x \cos \alpha + y \sin \alpha - at)(-a) + \psi'(x \cos \alpha + y \sin \alpha + at)a$$

دوبارہ جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = \phi''(x \cos \alpha + y \sin \alpha - at)a^2 + \psi''(x \cos \alpha + y \sin \alpha + at)a^2 \dots (4)$$

مساوات (2)، (3) اور (4) سے

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$$

اس لیے $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$ دوسرے رتبے کی مطلوبہ جزوی تفرقی مساوات ہے۔

14.4 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ جزوی تفرقی مساوات سے اختیاری تفاعلات کو خارج کر کے جزوی تفرقی مساوات کو تشکیل کرنا سیکھ گئے ہوں گے۔

14.5 کلیدی الفاظ (Key Words)

اختیاری تفاعل، ضابطہ

14.6 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

14.6.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. کسی ضابطے میں اگر دو اختیاری تفاعلات ہوں تب اس سے حاصل جزوی تفرقی مساوات کا رتبہ دو سے زیادہ ہوگا۔ (T/F)
2. ضابطہ $z = f(x^2 + y^2)$ کے لیے جزوی تفرقی مساوات $yp + xq = 0$ ہے۔ (T/F)

3. تفاعلات ϕ اور ψ کو ساقط کر کے $z = \phi(x + iy) + \psi(x - iy)$ سے پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات حاصل ہوگی۔

(T/F)

14.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

1. اختیاری تفاعل ϕ کو ساقط کر کے $z = e^y \phi(x + y)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔
2. اختیاری تفاعل ϕ کو ساقط کر کے $z = e^{Ax+By} \phi(Ax - By)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔
3. اختیاری تفاعل ϕ کو ساقط کر کے $z = \phi(x^2 - y^2)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔
4. اختیاری تفاعل ϕ کو ساقط کر کے $z = xy + \phi(x^2 + y^2)$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

14.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. تفاعلات ϕ اور ψ کو ساقط کر کے $z = y\phi(x) + x\psi(y)$ سے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو۔
2. تفاعلات ϕ اور ψ کو ساقط کر کے $z = \phi(x) + \psi(y)$ سے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو۔

جوابات:

14.6.1 معروضی سوالات کے جوابات

1. T

2. F

3. F

14.6.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$1. \frac{\partial z}{\partial y} = z + \frac{\partial z}{\partial x}$$

$$2. B \frac{\partial z}{\partial x} + A \frac{\partial z}{\partial y} = 2ABz$$

$$3. y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

$$4. y \frac{\partial z}{\partial x} + x \frac{\partial z}{\partial y} = y^2 - x^2$$

14.6.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$xy \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} - z \quad .1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0 \quad .2$$

14.7 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhania, S.Chand & Co., New Delhi

اکائی 15۔ جزوی تفرقی مساواتوں کے حل (لگرانج کا طریقہ)

(Solution of Partial Differential Equations: Lagrange's Method)

اکائی کے اجزا

تمہید	15.0
مقاصد	15.1
لگرانج کی خطی جزوی تفرقی مساوات	15.2
لگرانج کی خطی جزوی تفرقی مساوات کا حل	15.2.1
لگرانج کا $Pp + Qq = R$ کو حل کرنے کا طریقہ	15.2.2
خطی اور غیر خطی جزوی تفرقی مساواتیں	15.4
اکتسابی نتائج	15.5
کلیدی الفاظ	15.6
نمونہ امتحانی سوالات	15.7
معروضی جوابات کے حامل سوالات	15.7.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	15.7.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	15.7.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	15.8

15.0 تمہید (Introduction)

پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات بہت سی عملی صورتحال میں واقع ہوتی ہیں جیسے براؤنین گردش (Brownian Motion)، ریڈیو ایکٹو تقسیم، مواصلاتی (Communication) نظام میں شور (Noise)، ٹیلی فون ٹریفک (Telephonic Traffic) وغیرہ۔ درحقیقت خطی جزوی تفرقی مساوات کے حل کی نوعیت کو سمجھ کر اعلیٰ رتبہ کی جزوی تفرقی مساوات کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک طریقہ کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ اس اکائی میں ہم لگرائنج کی خطی جزوی تفرقی مساوات اور اس کا لگرائنج کے طریقہ سے حل حاصل کرنا سیکھیں گے۔

15.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے کے بعد آپ:

1. لگرائنج کی خطی تفرقی مساوات کی بنیادی جانکاری سے متعارف ہو جائیں گے۔
2. لگرائنج کے طریقے کی مدد سے خطی جزوی تفرقی مساواتوں کا حل حاصل کرنا سیکھائیں گے۔

15.2 لگرائنج کی خطی جزوی تفرقی مساوات (Lagrange's Linear Partial Differential Equations)

تعریف: جزوی تفرقی مساوات $Pp + Qq = R$ کو پہلے رتبے کی لگرائنج کی خطی جزوی تفرقی مساوات کہتے ہیں، جہاں P, Q, R متغیرات x, y, z کے تفاعلات ہیں۔

مان لو کہ $u = c$ لگرائنج کی خطی تفرقی مساوات کا ایک حل ہے۔ اس لیے یہ مساوات

$$Pp + Qq = R \quad \dots(1)$$

کی تصدیق کریگا۔ اب مساوات $u = c$ کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

یا

$$\frac{\partial u}{\partial x} + p \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \Rightarrow p = - \frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial z}} \quad \dots(2)$$

اور

$$\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

یا

$$\frac{\partial u}{\partial y} + q \frac{\partial u}{\partial z} = 0 \Rightarrow p = -\frac{\frac{\partial u}{\partial y}}{\frac{\partial u}{\partial z}} \quad \dots(3)$$

مساوات (1) سے

$$\begin{aligned} P \left(-\frac{\frac{\partial u}{\partial x}}{\frac{\partial u}{\partial z}} \right) + Q \left(-\frac{\frac{\partial u}{\partial y}}{\frac{\partial u}{\partial z}} \right) &= R \\ \Rightarrow P \frac{\partial u}{\partial x} + Q \frac{\partial u}{\partial y} &= -R \frac{\partial u}{\partial z} \\ \Rightarrow P \frac{\partial u}{\partial x} + Q \frac{\partial u}{\partial y} + R \frac{\partial u}{\partial z} &= 0 \quad \dots(4) \end{aligned}$$

اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ $u = c$ مساوات (1) اور مساوات (4) کی تصدیق کرتی ہے۔ اس لیے مساوات (4) کو مساوات (1) کے مساوی (Equivalent) لیا جاسکتا ہے۔

15.2.1 لگرانج کی خطی جزوی تفرقی مساوات کا حل

(Solution of Lagrange's Linear Partial Differential Equations)

قضیہ (Theorem):

ہم جانتے ہیں کہ لگرانج کی خطی تفرقی مساوات ہے

$$Pp + Qq = R \quad \dots(1)$$

مان لو کہ

$$\phi(u, v) = 0 \quad \dots(2)$$

مساوات (1) کا حل ہے، جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔ یہاں $u(x, y, z) = a$ اور $v(x, y, z) = b$ مساوات

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R} \quad \dots(3)$$

کے دو غیر تابع حل ہیں اور a, b دو اختیاری تفاعلات ہیں اور کم از کم ایک میں z ضرور ہوگا۔

ثبوت: مساوات (2) کو بہ لحاظ x اور بہ لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial \phi}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial \phi}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} \right) = 0$$

یا

$$\frac{\partial \phi}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + p \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \frac{\partial \phi}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + p \frac{\partial v}{\partial z} \right) = 0 \quad \dots(4)$$

اور

$$\frac{\partial \phi}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{\partial \phi}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} \right) = 0$$

یا

$$\frac{\partial \phi}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + q \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \frac{\partial \phi}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial y} + q \frac{\partial v}{\partial z} \right) = 0 \quad \dots(5)$$

مساوات (4) اور مساوات (5) سے $\frac{\partial \phi}{\partial u}$ اور $\frac{\partial \phi}{\partial v}$ کو ہٹانے پر

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{cc} \frac{\partial u}{\partial x} + p \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial x} + p \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial u}{\partial y} + q \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial v}{\partial y} + q \frac{\partial v}{\partial z} \end{array} \right| = R \\ \Rightarrow & \left(\frac{\partial u}{\partial x} + p \frac{\partial u}{\partial z} \right) \left(\frac{\partial v}{\partial y} + q \frac{\partial v}{\partial z} \right) = \left(\frac{\partial u}{\partial y} + q \frac{\partial u}{\partial z} \right) \left(\frac{\partial v}{\partial x} + p \frac{\partial v}{\partial z} \right) \\ \Rightarrow & p \left(\frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial z} \right) + q \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial u}{\partial z} \frac{\partial v}{\partial x} \right) = 0 \quad \dots(6) \end{aligned}$$

اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ $\phi(u, v) = 0$ مساوات (6) کا حل ہے۔ اب $u(x, y, z) = a$ اور $v(x, y, z) = b$ کے مشتق لینے پر

$$\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz = 0 \quad \dots(7)$$

اور

$$\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy + \frac{\partial v}{\partial z} dz = 0 \quad \dots(8)$$

چوں کہ u, v دونوں غیر تابع تفاعلات ہیں، اس لیے

$$\frac{dx}{\frac{\partial u \partial v}{\partial y \partial z} - \frac{\partial u \partial v}{\partial z \partial y}} = \frac{dy}{\frac{\partial v \partial u}{\partial x \partial z} - \frac{\partial u \partial v}{\partial x \partial z}} = \frac{dz}{\frac{\partial u \partial v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u \partial v}{\partial y \partial x}} \quad \dots(9)$$

مساوات (3) اور مساوات (9) سے

$$\begin{aligned} \frac{\frac{\partial u \partial v}{\partial y \partial z} - \frac{\partial u \partial v}{\partial z \partial y}}{P} &= \frac{\frac{\partial v \partial u}{\partial x \partial z} - \frac{\partial u \partial v}{\partial x \partial z}}{Q} = \frac{\frac{\partial u \partial v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u \partial v}{\partial y \partial x}}{R} = k \\ \Rightarrow & \begin{cases} \frac{\partial u \partial v}{\partial y \partial z} - \frac{\partial u \partial v}{\partial z \partial y} = kP, \\ \frac{\partial v \partial u}{\partial x \partial z} - \frac{\partial u \partial v}{\partial x \partial z} = kQ, \\ \frac{\partial u \partial v}{\partial x \partial y} - \frac{\partial u \partial v}{\partial y \partial x} = kR \end{cases} \end{aligned}$$

یہ قیمتیں مساوات (6) میں درج کرنے پر

$$k(Pp + Qq) = kR$$

$$Pp + Qq = R$$

یا

اس لیے اگر u, v دونوں $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$ کے غیر تابع حل ہوں تب $\phi(u, v) = 0$ جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے، مساوات $Pp + Qq = R$ کا حل ہے۔

مساوات (3) کو مساوات (1) کے لیے لگرائنج کی معاون (Auxiliary یا Subsidiary) مساوات کہتے ہیں۔

15.2.2 لگرائنج کا $Pp + Qq = R$ کو حل کرنے کا طریقہ (Lagrange's Method to Solve $Pp + Qq = R$)

I. دی گئی پہلے رتبے کی خطی جزوی تفرقی مساوات کو ذیل شکل میں تبدیل کرتے ہیں $Pp + Qq = R$

II. اس مساوات کے لیے لگرائنج کی معاون مساوات لکھو جو کہ ذیل ہے $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$

III. معاون مساوات کو کسی مناسب طریقہ سے حل کریں۔ مان لیجیے کہ $u(x, y, z) = a$ اور $v(x, y, z) = b$ اس مساوات کے دو غیر تابع حل ہیں۔

IV. مساوات $Pp + Qq = R$ کا عام حل درجہ ذیل میں سے کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے:

$$\phi(u, v) = 0 \quad (i)$$

$$u = \phi(v) \quad (ii)$$

$$v = \phi(u) \quad (iii)$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

نوٹ: معاون مساوات میں اگر کبھی دو کسروں (Fractions) میں ایک متغیر نہ ہو یا وہ منسوق ہو جائے، تب ایک تکمل حاصل ہوتا ہے جس کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کسرے کے جوڑے کو لے کر ہم دیے گئے سوال کا حل نکال سکتے ہیں۔
مثال 1۔ درجہ ذیل خطی جزوی تفرقی مساواتوں کو حل کریں:

$$\frac{y^2 zp}{x} + xzq = y^2 \quad (i)$$

$$p + q = z \quad (ii)$$

$$2p + 3q = 1 \quad (iii)$$

$$p \tan x + q \tan y = \tan z \quad (iv)$$

$$y^2 p - xyq + 2xy = xz \quad (v)$$

$$x^2 p + y^2 q = z^2 \quad (vi)$$

$$xp + yq = z \quad (\text{vii})$$

$$p + q = 1 \quad (\text{viii})$$

$$xyp + y^2q = xyz - 2x^2 \quad (\text{ix})$$

حل۔ (i) دیا ہے

$$\frac{y^2zp}{x} + xzq = y^2 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = \frac{y^2z}{x}, Q = xz, R = y^2$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{\frac{y^2z}{x}} = \frac{dy}{xz} = \frac{dz}{y^2} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\frac{dx}{\frac{y^2z}{x}} = \frac{dy}{xz}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{dx}{y^2} = \frac{dy}{x^2}$$

$\Rightarrow$

$$x^2dx - y^2dy = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\frac{x^3}{3} - \frac{y^3}{3} = a$$

$\Rightarrow$

$$x^3 - y^3 = 3a = A \quad (\text{مان لو}) \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے پہلے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$\frac{dx}{\frac{y^2z}{x}} = \frac{dz}{y^2}$$

$\Rightarrow$

$$xdx - zdz = 0 \quad \dots(5)$$

مساوات (5) کو تکمیل کرنے پر

$$\frac{x^2}{2} - \frac{z^2}{2} = b$$

$$\Rightarrow x^2 - z^2 = 2b = B \quad (\text{مان لو}) \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi(x^3 - y^3, x^2 - z^2) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

حل۔(ii) دیا ہے

$$p + q = z \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = 1, Q = 1, R = z$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{z} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1}$$

$$\Rightarrow dx - dy = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow x - y = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے دوسرے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$dy = \frac{dz}{z} \quad \dots(5)$$

مساوات (5) کو تکمیل کرنے پر

$$y = \log z + \log B$$

$$\Rightarrow y = \log Bz$$

$$\Rightarrow \frac{e^y}{z} = B \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi\left(x - y, \frac{e^y}{z}\right) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

حل۔(iii) دیا ہے

$$2p + 3q = 1 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = 2, Q = 3, R = 1$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{2} = \frac{dy}{3} = \frac{dz}{1} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\frac{dx}{2} = \frac{dy}{3}$$

$$\Rightarrow 3dx - 2dy = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow 3x - 2y = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے دوسرے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$\frac{dy}{3} = \frac{dz}{1}$$

$$\Rightarrow dy - 3dz = 0 \quad \dots(5)$$

مساوات (5) کو تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow y - 3z = B \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi(3x - 2y, y - 3z) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

حل۔(iv) دیا ہے

$$p \tan x + q \tan y = \tan z \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = \tan x, Q = \tan y, R = \tan z$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{\tan x} = \frac{dy}{\tan y} = \frac{dz}{\tan z} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\frac{dx}{\tan x} = \frac{dy}{\tan y}$$

$$\Rightarrow \cot x dx - \cot y dy = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\log \sin x - \log \sin y = \log A$$

$$\Rightarrow \log \frac{\sin x}{\sin y} = \log A$$

$$\Rightarrow \frac{\sin x}{\sin y} = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے دوسرے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$\frac{dy}{\tan y} = \frac{dz}{\tan z}$$

$$\Rightarrow \cot y dy - \cot z dz = 0 \quad \dots(5)$$

مساوات (5) کو تکمیل کرنے پر

$$\log \sin y - \log \sin z = \log B$$

$$\Rightarrow \log \frac{\sin y}{\sin z} = \log B$$

$$\Rightarrow \frac{\sin y}{\sin z} = B \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi \left(\frac{\sin x}{\sin y}, \frac{\sin y}{\sin z} \right) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

حل۔ (v) دیا ہے $y^2 p - xyq + 2xy = xz$ اس مساوات کو درجہ ذیل شکل میں لکھ سکتے ہیں

$$y^2 p - xyq = x(z - 2y) \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = y^2, Q = -xy, R = x(z - 2y)$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{y^2} = \frac{dy}{-xy} = \frac{dz}{x(z-2y)} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے اور دوسرے کسرے لینے پر

$$\frac{dx}{y^2} = \frac{dy}{-xy}$$

$$\Rightarrow xdx + ydy = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} = \frac{a^2}{2}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = a^2 = A$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے دوسرے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$\frac{dy}{-xy} = \frac{dz}{x(z - 2y)}$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dy} = -\frac{z}{y} + 2$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dy} + \frac{z}{y} = 2 \quad \dots(5)$$

یہ ایک خطی تفرقی مساوات ہے۔ اس لیے

$$I.F. = e^{\int \frac{1}{y} dy} = y$$

مساوات (5) کا حل درجہ ذیل ہوگا

$$z(y) = \int 2 \cdot y dy + B$$

$$\Rightarrow yz = 2 \frac{y^2}{2} + B$$

$$\Rightarrow yz - y^2 = B \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi(x^2 + y^2, yz - y^2) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

حل۔(vi) دیا ہے

$$x^2p + y^2q = z^2 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = x^2, Q = y^2, R = z^2$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{z^2} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\Rightarrow \frac{dx}{x^2} = \frac{dy}{y^2} \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow -\frac{1}{x} = -\frac{1}{y} + A$$

$$\Rightarrow \frac{x-y}{xy} = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے دوسرے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{z^2} \quad \dots(5)$$

مساوات (5) کو تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow -\frac{1}{y} = -\frac{1}{z} + B$$

$$\Rightarrow \frac{y-z}{yz} = B \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi\left(\frac{x-y}{xy}, \frac{y-z}{yz}\right) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

حل۔(vii) دیا ہے

$$xp + yq = z \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = x, Q = y, R = z$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\log x = \log y + \log A$$

$$\Rightarrow \log x - \log y = \log A$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے دوسرے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z} \quad \dots(5)$$

مساوات (5) کو تکمیل کرنے پر

$$\log y = \log z + \log B$$

$$\Rightarrow \log y - \log z = \log B$$

$$\Rightarrow \frac{y}{z} = B \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi\left(\frac{x}{y}, \frac{y}{z}\right) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

حل۔ (viii) دیا ہے

$$p + q = 1 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = 1, Q = 1, R = 1$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{1} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\Rightarrow dx - dy = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow x - y = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے دوسرے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$dy - dz = 0 \quad \dots(5)$$

مساوات (5) کو تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow y - z = B \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi(x - y, y - z) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

حل۔ (ix) دیا ہے

$$xyp + y^2q = xyz - 2x^2 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں حاصل ہوتا ہے $p = xy, Q = y^2, R = xyz - 2x^2$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{xy} = \frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{xyz - 2x^2} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\frac{dx}{xy} = \frac{dy}{y^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{x} - \frac{dy}{y} = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\log x - \log y = \log A$$

$$\Rightarrow \log \frac{x}{y} = \log A$$

$$\Rightarrow \frac{x}{y} = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے دوسرے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{xyz - 2x^2}$$

مساوات (4) سے $x = Ay$ درج کرنے پر

$$\frac{dy}{y^2} = \frac{dz}{Ay^2z - 2A^2y^2}$$

$$\Rightarrow \quad A dy = \frac{dz}{z - 2A} \quad \dots(5)$$

مساوات (5) کو تکمیل کرنے پر

$$Ay = \log(z - 2A) + B$$

$$\Rightarrow \quad x - \log\left(z - \frac{2x}{y}\right) = B \quad \dots(6)$$

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi\left(\frac{x}{y}, x - \log\left(z - \frac{2x}{y}\right)\right) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

مثال 2- مساوات $z(z^2 + xy)(px - qy) = x^4$ کو حل کریے۔

حل۔ دی گئی مساوات ہے

$$z(z^2 + xy)(px - qy) = x^4$$

اس مساوات کو $Pp + Qq = R$ کی شکل میں بدلنے پر

$$pxz(z^2 + xy) - qyz(z^2 + xy) = x^4 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کی $Pp + Qq = R$ سے مشابہت کرنے پر ہمیں ملتا ہے $R = x^4$, $Q = -yz(z^2 + xy)$, $p = xz(z^2 + xy)$

اس لیے دی گئی مساوات کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{xz(z^2 + xy)} = \frac{dy}{-yz(z^2 + xy)} = \frac{dz}{x^4} \quad \dots(2)$$

اس مساوات کے پہلے دو کسرے لینے پر

$$\frac{dx}{xz(z^2 + xy)} = \frac{dy}{-yz(z^2 + xy)}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} = 0 \quad \dots(3)$$

مساوات (3) کو تکمیل کرنے پر

$$\log x + \log y = \log A$$

$$\Rightarrow \quad \log xy = \log A$$

$$\Rightarrow \quad xy = A \quad \dots(4)$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (2) کے پہلے اور آخری کسرے کو لینے پر

$$\frac{dx}{xz(z^2 + xy)} = \frac{dz}{x^4}$$

مساوات (4) سے $xy = A$ رکھنے پر

$$\frac{dx}{z(z^2 + A)} = \frac{dz}{x^3}$$

$$x^3 dx = z(z^2 + A) dz$$

.....(5)

مساوات (5) کو مکمل کرنے پر

$$\frac{x^4}{4} = \frac{z^4}{4} + A \frac{z^2}{2} + \frac{B}{4}$$

یہاں $xy = A$ درج کرنے پر

$$\Rightarrow x^4 - z^4 - 2xyz^2 = B$$

.....(6)

جہاں B ایک اختیاری مستقل ہے۔ اب مساوات (4) اور مساوات (6) سے مساوات (1) کا عام حل درجہ ذیل ہوگا

$$\phi(xy, x^4 - z^4 - 2xyz^2) = 0$$

جہاں ϕ ایک اختیاری تفاعل ہے۔

15.3 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ لگرائج کی خطی جزوی تفرقی مساوات کی تعریف، اس کے لیے معاون مساوات حاصل کرنا اور پھر اس کا حل حاصل کرنا سیکھ گئے ہوں گے۔

15.4 کلیدی الفاظ (Key Words)

لگرائج کی خطی جزوی تفرقی مساوات، معاون مساوات

15.5 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

15.5.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. لگرائج کی خطی جزوی تفرقی مساوات کی تعریف کرو۔
2. لگرائج کی خطی جزوی تفرقی مساوات کے لیے معاون مساوات کی تعریف کرو۔
3. $xzp + yzq = xy$ لگرائج کی خطی جزوی تفرقی مساوات نہیں ہے۔ (T/F)

4. مساوات $Pp + Qq = R$ ایک جزوی تفرقی مساوات کہلاتی ہے۔

5. لگرائج مساوات $p + q = \sin x$ کے لیے معاون مساوات ہے۔

15.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

درجہ ذیل مساوات کو حل کرو:

$$1. p + q = \sin x$$

$$2. yzp + zxq = xy$$

$$3. y^2p - xyq = x(z - 2y)$$

$$4. (y + zx)p - (x + yz)q = x^2 - y^2$$

$$5. y^2p^2 + x^2q^2 = x^2y^2z^2$$

15.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

درجہ ذیل مساوات کو حل کرو:

$$1. p + 3q = z + \cot(y - 3x)$$

$$2. p + 3q = 5z + \tan(y - 3x)$$

$$3. p - 2q = 3x^2 \sin(y + 2x)$$

$$4. (cy + bz)p + (az - cx)q = bx - ay$$

$$5. (x^2 - yz)p + (y^2 - zx)q = z^2 - xy$$

جوابات:

15.5.1 معروضی سوالات کے جوابات

3. F

4. لگرائج کی خطی

$$5. \frac{dx}{1} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{\sin x}$$

15.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$\phi(x - y, z + \cos x) = 0 \quad .1$$

$$\phi(x^2 - y^2, x^2 - z^2) = 0 \quad .2$$

$$\phi(x^2 + y^2, y^2 - yz) = 0 \quad .3$$

$$\phi(x^2 + y^2 - z^2, xy + z) = 0 \quad .4$$

$$\phi\left(x^3 - y^3, y^3 + \frac{3}{z}\right) = 0 \quad .5$$

15.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

$$x - \log|z + \cot(y - 3x)| = \phi(y - 3x) \quad .1$$

$$5x - \log|5z + \tan(y - 3x)| = \phi(y - 3x) \quad .2$$

$$x^3 \sin(y + 2x) - z = \phi(y + 2x) \quad .3$$

$$\phi(x^2 + y^2 + z^2, ax + by + cz) = 0 \quad .4$$

$$\phi\left(\frac{x-y}{y-z}, \frac{y-z}{z-x}\right) = 0 \quad .5$$

15.6 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Ordinary and Partial Differential Equations- Rai Singhanian, S.Chand & Co., New Delhi

اکائی 16۔ جزوی تفرقی مساواتوں کے حل (چارپٹ کا طریقہ)

(Solution of Partial Differential Equations: Charpit's Method)

اکائی کے اجزا

تمہید	16.0
مقاصد	16.1
چارپٹ کا طریقہ	16.2
پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات کا ہم آہنگ نظام	16.2.1
چارپٹ کے طریقے کی مدد سے غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کو حل کرنا	16.2.2
اکتسابی نتائج	16.3
کلیدی الفاظ	16.4
نمونہ امتحانی سوالات	16.5
معروضی جوابات کے حامل سوالات	16.5.1
مختصر جوابات کے حامل سوالات	16.5.2
طویل جوابات کے حامل سوالات	16.5.3
مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں	16.6

کسی تفرقی مساوات کا حل متغیرات کے درمیان وہ رشتہ ہے جس کے ذریعے اور مساوات سے حاصل کردہ مشتق مطمئن ہو جاتا ہے۔

اب ہم پہلے رتبے کی غیر خطی جزوی تفرقی مساوات

$$\phi(x, y, z, a, b) = 0 \quad \dots(1)$$

کے حل حاصل کرنے پر روشنی ڈالیں گے۔ یہاں z, y, x متغیرات ہیں۔ ان میں y, x غیر تابع متغیرات اور z تابع متغیر ہے۔

مساوات (1) کو b لحاظ x اور پھر b لحاظ y جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

یا

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} + p \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad \dots(2)$$

اور

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = 0$$

یا

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} + q \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \quad \dots(3)$$

چوں کہ اختیاری مستقلات a اور b مساوات (1)، (2) اور (3) سے منسلک ہیں۔ اس لیے تینوں مساواتوں سے a اور b کو ہٹا کر ہمیں درجہ ذیل رشتہ حاصل ہوتا ہے

$$f(x, y, z, p, q) = 0 \quad \dots(4)$$

جو کہ پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات ہے۔

مساوات (4) کا وہ حل جس میں ممکنہ اختیاری مستقلات غیر تابع متغیرات کی تعداد کے برابر ہوں، مکمل حل (Complete Solution) کہلاتا ہے۔

اختیاری مستقلات کے لیے اگر خاص قیمتیں دی جائیں تب حاصل کردہ حل خاص حل (Particular Integral) کہلاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان تمام مختص (Coordinate) نقاط کا طریق (Locus) جن کے مختص p اور q کی قیمتوں کے ساتھ مساوات (4) کو مطمئن کرتے ہیں، سطحوں (Surfaces) کے لامحدود نظام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ چوں کہ ان سطحوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تمام سطحوں کے لفافوں (Envelope) کو اس کے ہر نقاط پر چھو لیا جاتا ہے، اس لیے لفافے میں موجود کسی بھی نقطے کے اس مقام پر لفافے سے متعلق p اور q کی قیمتوں کے ساتھ مساوات (4) کو مطمئن کریں گی۔

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لفافے کی مساوات دی گئی مساوات (4) کا ایک حل ہے۔ اب مساوات (1) کو الگ الگ بہ لحاظ a اور b جزوی تفرق کرتے ہیں

$$\frac{\partial \phi}{\partial a} = 0, \frac{\partial \phi}{\partial b} = 0 \quad \dots (5)$$

مساوات (1) اور (5) سے a اور b کو ہٹا کر ہمیں y, x اور z میں ایک رشتہ حاصل ہوتا ہے جسے مساوات (4) کا نادر (Singular) حل کہتے ہیں۔ کسی جزوی تفرقی مساوات کا وہ حل جس میں ممکنہ اختیاری تقاضات اعظم تعداد میں موجود ہوں، عام حل کہلاتا ہے۔

16.1 مقاصد (Objectives)

اس اکائی کے مکمل ہونے کے بعد آپ:

1. چارپٹ کی غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کی بنیادی جانکاری سے متعارف ہو جائیں گے۔
2. چارپٹ کے طریقے کی مدد سے غیر خطی جزوی تفرقی مساواتوں کا حل حاصل کرنا سیکھ جائیں گے۔

16.2 چارپٹ کا طریقہ (Charpit's Method)

16.2.1 پہلے رتبے کی جزوی تفرقی مساوات کا ہم آہنگ نظام

(Compatible System of First Order Partial Differential Equations)

پہلے رتبے کی دو جزوی تفرقی مساواتوں کو ہم آہنگ کہا جاتا ہے اگر ان کا مشترکہ حل وجود رکھتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں درجہ ذیل جزوی تفرقی مساواتیں

$$f(x, y, z, p, q) = 0 \quad \dots (1)$$

$$f_1(x, y, z, p, q) = 0 \quad \dots (2)$$

ہم آہنگ ہوں گی اگر

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} + p \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} + q \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} = 0$$

یہ جزوی تفرقی مساواتوں کے نظام کے ہم آہنگ ہونے کی شرط ہے۔

نوٹ: (1) دو جزوی تفرقی مساواتیں $p = P(x, y)$ اور $q = Q(x, y)$ ہم آہنگ ہوں گی اگر اور صرف اگر $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

(2) اگر دو جزوی تفرقی مساواتوں کا نظام ہم آہنگ ہے تب ان کا ایک مشترکہ حل ہوگا۔

(3) ہم آہنگ نظام کا حل حاصل کرنے کے لیے p اور q کی قیمتیں درجہ ذیل مساوات میں رکھتے ہیں

$$dz = p dx + q dy$$

مثال 1۔ دکھاؤ کہ $xp - yq = x$ اور $x^2 p + q = xz$ ہم آہنگ ہیں۔

حل۔ مان لو کہ

$$f = xp - yq - x = 0 \quad \dots (1)$$

$$f_1 = x^2p + q - xz = 0 \quad \dots(2)$$

اب

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial p} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial p} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} p-1 & x \\ 2px-z & x^2 \end{vmatrix} = xz - x^2p - x^2$$

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial z} & \frac{\partial f}{\partial p} \\ \frac{\partial f_1}{\partial z} & \frac{\partial f_1}{\partial p} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & x \\ -x & x^2 \end{vmatrix} = x^2$$

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial q} \\ \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial q} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -q & -y \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -q$$

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial z} & \frac{\partial f}{\partial q} \\ \frac{\partial f_1}{\partial z} & \frac{\partial f_1}{\partial q} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -y \\ -x & 1 \end{vmatrix} = -xy$$

دیا گیا نظام ہم آہنگ ہو گا اگر

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} + p \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} + q \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} = 0$$

اس لیے

$$\begin{aligned} \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} + p \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} + q \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} &= xz - x^2p - x^2 + px^2 - q - qxy \\ &= (xz - q) - x^2 - qxy \end{aligned}$$

مساوات (2) سے

$$\begin{aligned} &= x^2p - x^2 - qxy \\ &= x(xp - x - qy) \end{aligned}$$

مساوات (1) سے

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} + p \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} + q \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} = 0$$

اس لیے دی گئی جزوی تفرقی مساوات کا نظام ہم آہنگ ہے۔

مثال 2- کیا جزوی تفرقی مساوات کا نظام $\frac{\partial z}{\partial y} = 9x + 11y - 2$ اور $\frac{\partial z}{\partial x} = 7x + 8y - 1$ ہم آہنگ ہے؟

حل۔ مان لو کہ

$$f = p - 7x - 8y + 1 = 0 \quad \dots(1)$$

$$f_1 = q - 9x - 11y + 2 = 0 \quad \dots(2)$$

اب

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial p} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial p} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -7 & 1 \\ -9 & 0 \end{vmatrix} = 9$$

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial z} & \frac{\partial f}{\partial p} \\ \frac{\partial f_1}{\partial z} & \frac{\partial f_1}{\partial p} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial q} \\ \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial q} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -8 & 0 \\ -11 & 1 \end{vmatrix} = -8$$

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial z} & \frac{\partial f}{\partial q} \\ \frac{\partial f_1}{\partial z} & \frac{\partial f_1}{\partial q} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

دیا گیا نظام ہم آہنگ ہو گا اگر

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} + p \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} + q \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} = 0$$

اس لیے

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} + p \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} + q \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} = 9 + 0 - 8 + 0 = 1 \neq 0$$

اس لیے دی گئی جزوی تفرقی مساوات کا نظام ہم آہنگ نہیں ہے۔

مثال 3- کیا جزوی تفرقی مساوات کا نظام $\frac{\partial z}{\partial y} = 3x - 4y$ اور $\frac{\partial z}{\partial x} = 6x + 3y$ ہم آہنگ ہے؟ اگر ہاں تو اس کے لیے حل محسوب کریے۔

حل۔ مان لو کہ

$$f = p - 6x - 3y = 0 \quad \dots(1)$$

$$f_1 = q - 3x + 4y = 0 \quad \dots(2)$$

یہاں $Q = 3x - 4y$ اور $P = 6x + 3y$

ہم جانتے ہیں کہ دو جزوی تفرقی مساواتیں $p = P(x, y)$ اور $q = Q(x, y)$ ہم آہنگ ہوں گی اگر اور صرف اگر $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

اس لیے

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 3$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 3$$

اس لیے دی گئی جزوی تفرقی مساوات کا نظام ہم آہنگ ہے۔ اب دیے گئے نظام کا مشترکہ حل درجہ ذیل طریقہ سے حاصل کرتے ہیں

$$\begin{aligned} dz &= p dx + q dy \\ &= (6x + 3y) dx + (3x - 4y) dy \\ &= 6x dx + 3y dx + 3x dy - 4y dy \\ &= 6x dx - 4y dy + 3(y dx + 3x dy) \\ dz &= 6x dx - 4y dy + 3d(xy) \end{aligned}$$

تکمل کرنے پر

$$z = 6 \frac{x^2}{2} - 4 \frac{y^2}{2} + 3xy + A$$

جہاں A ایک اختیاری مستقل ہے۔

16.2.2 چارپٹ کے طریقے سے غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کا حل

(Solution of Non linear Partial Differential Equations by Charpit's Method)

ہم ایک عام طریقہ پر بحث کریں گے جو چارپٹ کے طریقہ کار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرض کرو کہ پہلے رتبے کی غیر خطی جزوی تفرقی مساوات ذیل ہے

$$f(x, y, z, p, q) = 0 \quad \dots(1)$$

چارپٹ کے طریقہ کار میں بنیادی خیال پہلے رتبے کی ایک اور جزوی تفرقی مساوات کا تعارف ہے۔ یہ اس طرح ہوگی

$$f_1(x, y, z, p, q) = 0 \quad \dots(2)$$

مساوات (1) اور مساوات (2) کو p اور q کے لیے حل کرتے ہیں اور پھر ان کی قیمتیں درجہ ذیل مساوات میں درج کرتے ہیں

$$dz = p(x, y, z, a) dx + q(x, y, z, b) dy$$

اس مساوات کا حل، (اگر یہ وجود رکھتا ہو) ہی دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ مکمل حل ہو گا۔

مان لو کہ جزوی تفرقی مساوات کا نظام

$$f(x, y, z, p, q) = 0 \quad \dots(1)$$

$$f_1(x, y, z, p, q) = 0 \quad \dots(2)$$

ہم آہنگ ہے۔ تب ہم جاننے ہیں دیا گیا نظام ہم آہنگ ہو گا اگر

$$\frac{\partial(f, f_1)}{\partial(x, p)} + p \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(y, q)} + q \frac{\partial(f, f_1)}{\partial(z, q)} = 0 \quad \dots(3)$$

اس لیے

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial p} \right| + p \left| \frac{\partial f}{\partial z} \quad \frac{\partial f}{\partial p} \right| + \left| \frac{\partial f}{\partial y} \quad \frac{\partial f}{\partial q} \right| + q \left| \frac{\partial f}{\partial z} \quad \frac{\partial f}{\partial q} \right| = 0$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial f_1}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial f_1}{\partial x} \right) + p \left(\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial f_1}{\partial p} - \frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial f_1}{\partial z} \right) + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial f_1}{\partial q} - \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) + q \left(\frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial f_1}{\partial q} - \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial f_1}{\partial z} \right) = 0$$

$$\Rightarrow - \left(\frac{\partial f}{\partial p} \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial q} \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) - p \left(\frac{\partial f}{\partial p} + \frac{\partial f}{\partial q} \right) \frac{\partial f_1}{\partial z} + \left(\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z} \right) \frac{\partial f_1}{\partial p} + \left(\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z} \right) \frac{\partial f_1}{\partial q} = 0 \quad \dots(4)$$

یہ ایک خطی جزوی تفرقی مساوات ہے، جس کی مدد سے ہم f_1 کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے معاون مساوات درجہ ذیل ہوگی

$$\frac{dx}{\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{-\left(\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z}\right)} = \frac{dq}{-\left(\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z}\right)} \quad \dots(5)$$

اب درجہ ذیل مثالوں سے اوپر دیا گیا طریقہ سمجھتے ہیں:

مثال 1- مساوات $z^2 = pqxy$ کو حل کریے۔

حل- دیا ہے $z^2 = pqxy$

$$f = z^2 - pqxy = 0 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -pqy$$

اسی طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -pqx,$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = 2z,$$

$$\frac{\partial f}{\partial p} = -qxy,$$

$$\frac{\partial f}{\partial q} = -pxy$$

اور

ہم جانتے ہیں کہ چارپٹ کی معاون مساوات درجہ ذیل ہوتی ہے

$$\frac{dx}{\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{-\left(\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z}\right)} = \frac{dq}{-\left(\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z}\right)}$$

اس لیے

$$\frac{dx}{-qxy} = \frac{dy}{-pxy} = \frac{dz}{p(-qxy) + q(-pxy)} = \frac{dp}{-(-pqy + 2pz)} = \frac{dq}{-(-pqx + 2qz)}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{-qxy} = \frac{dy}{-pxy} = \frac{dz}{-2pqxy} = \frac{dp}{p(qy - 2z)} = \frac{dq}{q(px - 2z)}$$

$$\Rightarrow \frac{dx/x}{-qy} = \frac{dy/y}{-px} = \frac{dz}{qy - 2z} = \frac{dp/p}{px - 2z} = \frac{dq/q}{px - 2z}$$

$$\Rightarrow \frac{-\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}}{qy - px} = \frac{\frac{dp}{p} - \frac{dq}{q}}{qy - px}$$

$$\Rightarrow \frac{-\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y}}{qy - px} = \frac{\frac{dp}{p} - \frac{dq}{q}}{qy - px}$$

اس مساوات کو مکمل کرنے پر

$$\begin{aligned} -\log x + \log y &= \log p - \log q + \log A \\ \Rightarrow \log \frac{y}{x} &= -\log \frac{q}{p} + \log A \\ \Rightarrow \log \frac{y}{x} + \log \frac{q}{p} &= \log A \\ \Rightarrow \frac{y}{x} \times \frac{q}{p} &= A \\ \Rightarrow q &= \frac{Axp}{y} \end{aligned}$$

مساوات (1) سے

$$\begin{aligned} z^2 &= p \left(\frac{Axp}{y} \right) xy \\ &= Ap^2 x^2 \\ \Rightarrow p^2 &= \frac{z^2}{Ax^2} \\ \Rightarrow p &= \frac{z}{x\sqrt{A}} \end{aligned}$$

اس لیے

$$q = \frac{Ax}{y} \left(\frac{z}{x\sqrt{A}} \right) = \frac{\sqrt{A}z}{y}$$

p اور q کی قیمتیں مساوات $pdz + qdy = dz$ میں رکھنے پر

$$\begin{aligned} \left(\frac{z}{x\sqrt{A}} \right) dx + \left(\frac{\sqrt{A}z}{y} \right) dy &= dz \\ \left(\frac{dx}{x\sqrt{A}} \right) + \left(\frac{\sqrt{A}}{y} \right) dy &= \frac{dz}{z} \end{aligned}$$

مکمل کرنے پر

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{A}} \log x + \sqrt{A} \log y + \log B &= \log z \\ z &= Bx^{1/\sqrt{A}} y^{\sqrt{A}} \end{aligned}$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ مکمل حل ہے۔

مثال 2- مساوات $(p^2 + q^2)y = qz$ کے لیے مکمل حل حاصل کریے۔

حل۔ فرض کرو کہ

$$f = (p^2 + q^2)y - qz = 0 \quad \dots (1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

اسی طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں

$$\frac{\partial f}{\partial y} = p^2 + q^2,$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -q,$$

$$\frac{\partial f}{\partial p} = 2py,$$

$$\frac{\partial f}{\partial q} = 2qy - z$$

اور

ہم جانتے ہیں کہ چارپٹ کی معاون مساوت درجہ ذیل ہوتی ہے

$$\frac{dx}{\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{-\left(\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z}\right)} = \frac{dq}{-\left(\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z}\right)}$$

اس لیے

$$\begin{aligned} \frac{dx}{2py} &= \frac{dy}{2qy - z} = \frac{dz}{p(2py) + q(2qy - z)} = \frac{dp}{-(0 - pq)} = \frac{dq}{-(p^2 + q^2 - q^2)} \\ \Rightarrow \frac{dx}{2py} &= \frac{dy}{2qy - z} = \frac{dz}{2p^2y + 2q^2y - qz} = \frac{dp}{pq} = \frac{dq}{-p^2} \end{aligned}$$

آخری دو کسرے لینے پر

$$\begin{aligned} \frac{dp}{pq} &= \frac{dq}{-p^2} \\ \Rightarrow p dp + q dq &= 0 \end{aligned}$$

اس مساوات کو تکمیل کرنے پر

$$\begin{aligned} \frac{p^2}{2} + \frac{q^2}{2} &= \frac{A}{2} \\ \Rightarrow p^2 + q^2 &= A \end{aligned}$$

مساوات (1) میں یہ قدر رکھنے پر

$$\begin{aligned} Ay &= qz \\ \Rightarrow q &= \frac{Ay}{z} \end{aligned}$$

اس لیے

$$\begin{aligned} p &= \sqrt{A - \left(\frac{Ay}{z}\right)^2} \\ \Rightarrow p &= \frac{1}{z} \sqrt{Az^2 - A^2y^2} \end{aligned}$$

p اور q کی قیمتیں مساوات $pdx + qdy = dz$ میں رکھنے پر

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{z} \sqrt{Az^2 - A^2y^2} dx + \left(\frac{Ay}{z}\right) dy = dz \\
\Rightarrow & \sqrt{Az^2 - A^2y^2} dx + Aydy = z dz \\
\Rightarrow & dx = \frac{z dz - Aydy}{\sqrt{Az^2 - A^2y^2}} \\
\Rightarrow & dx = \frac{d(Az^2 - A^2y^2)^{1/2}}{A}
\end{aligned}$$

تکمل کرنے پر

$$\begin{aligned}
& x + B = \frac{(Az^2 - A^2y^2)^{1/2}}{A} \\
\Rightarrow & (x + B)^2 = \frac{Az^2 - A^2y^2}{A^2} \\
\Rightarrow & (x + B)^2 + y^2 = \frac{z^2}{A}
\end{aligned}$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ مکمل حل ہے۔

مثال 3۔ مساوات $0 = x^2p^2 + y^2q^2 - a$ کے لیے مکمل حل حاصل کریے۔

حل۔ فرض کرو کہ

$$f = x^2p^2 + y^2q^2 - a = 0 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xp^2$$

اسی طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y} &= 2yq^2, \\
\frac{\partial f}{\partial z} &= 0, \\
\frac{\partial f}{\partial p} &= 2px^2, \\
\frac{\partial f}{\partial q} &= 2qy^2
\end{aligned}$$

اور

ہم جانتے ہیں کہ چارپٹ کی معاون مساوات درجہ ذیل ہوتی ہے

$$\frac{dx}{\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{-\left(\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z}\right)} = \frac{dq}{-\left(\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z}\right)}$$

اس لیے

$$\frac{dx}{2px^2} = \frac{dy}{2qy^2} = \frac{dz}{p(2px^2) + q(2qy^2)} = \frac{dp}{-(2xp^2 + p(0))} = \frac{dq}{-(2yq^2 + q(0))}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{2px^2} = \frac{dy}{2qy^2} = \frac{dz}{2(x^2p^2 + y^2q^2)} = \frac{dp}{-2xp^2} = \frac{dq}{-2yq^2}$$

پہلا اور چوتھا کسرہ لینے پر

$$\Rightarrow \frac{\frac{dx}{2px^2}}{\frac{dx}{x}} = \frac{\frac{dp}{-2xp^2}}{\frac{dp}{p}} = 0$$

اس مساوات کو مکمل کرنے پر

$$\Rightarrow \log x + \log p = \log A$$

$$xp = A$$

مساوات (1) میں یہ قدر رکھنے پر

$$\Rightarrow A^2 + y^2q^2 - a = 0$$

$$q = \frac{\sqrt{a - A^2}}{y}$$

اس لیے

p اور q کی قیمتیں مساوات $pdx + qdy = dz$ میں رکھنے پر

$$A \frac{dx}{x} + \sqrt{a - A^2} \frac{dy}{y} = dz$$

مکمل کرنے پر

$$\Rightarrow B + A \log x + \sqrt{a - A^2} \log y = z$$

$$\Rightarrow B + \log x^A + \log y^{\sqrt{a - A^2}} = z$$

$$\Rightarrow B + \log x^A y^{\sqrt{a - A^2}} = z$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ مکمل حل ہے۔

مثال 4- مساوات $p^2 - q^2 = z$ کے لیے مکمل حل حاصل کریے۔

حل۔ فرض کرو کہ

$$f = p^2 - q^2 - z = 0 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0$$

اسی طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -1,$$

$$\frac{\partial f}{\partial p} = 2p,$$

$$\frac{\partial f}{\partial q} = -2q$$

اور

ہم جانتے ہیں کہ چارپٹ کی معاون مساوت درجہ ذیل ہوتی ہے

$$\frac{dx}{\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{-\left(\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z}\right)} = \frac{dq}{-\left(\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z}\right)}$$

اس لیے

$$\Rightarrow \frac{dx}{2p} = \frac{dy}{-2q} = \frac{dz}{p(2p) + q(-2q)} = \frac{dp}{-(0 + p(-1))} = \frac{dq}{-(0 + q(-1))}$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{2p} = \frac{dy}{-2q} = \frac{dz}{2(p^2 - q^2)} = \frac{dp}{p} = \frac{dq}{q}$$

آخری دو کسرے لینے پر

$$\frac{dp}{p} = \frac{dq}{q}$$

اس مساوات کو تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow \log p = \log q + \log A$$

$$p = Aq$$

تیسرے اور چوتھے کسرے لینے پر

$$\frac{dz}{2(p^2 - q^2)} = \frac{dp}{p}$$

مساوات (1) سے

$$\frac{dz}{2z} = \frac{dp}{p}$$

تکمیل کرنے پر

$$\Rightarrow \log z^{\frac{1}{2}} + \log B = \log p$$

$$\Rightarrow \log B z^{\frac{1}{2}} = \log p$$

$$\Rightarrow p = B z^{\frac{1}{2}}$$

اب

$$q = \frac{p}{A} = \frac{B z^{\frac{1}{2}}}{A} = C z^{\frac{1}{2}}$$

مان لو کہ $\frac{B}{A} = C$

p اور q کی قیمتیں مساوات $dz = p dx + q dy$ میں رکھنے پر

$$\Rightarrow B z^{\frac{1}{2}} dx + C z^{\frac{1}{2}} dy = dz$$

$$B dx + C dy = \frac{dz}{\sqrt{z}}$$

تکمیل کرنے پر

$$Bx + Cy = 2\sqrt{z} + D$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ مکمل حل ہے۔

مثال 5۔ مساوات $(p^2 + q^2)x = pz$ کے لیے مکمل حل حاصل کریے۔

حل۔ فرض کرو کہ

$$f = (p^2 + q^2)x - pz = 0 \quad \dots(1)$$

مساوات (1) کو بہ لحاظ x جزوی تفرق کرنے پر

$$\frac{\partial f}{\partial x} = p^2 + q^2$$

اسی طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -p,$$

$$\frac{\partial f}{\partial p} = 2px - z,$$

$$\frac{\partial f}{\partial q} = 2qx$$

اور

ہم جانتے ہیں کہ چارپٹ کی معاون مساوات درجہ ذیل ہوتی ہے

$$\frac{dx}{\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{-\left(\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z}\right)} = \frac{dq}{-\left(\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z}\right)}$$

اس لیے

$$\begin{aligned} \frac{dx}{2px - z} &= \frac{dy}{2qx} = \frac{dz}{p(2px - z) + q(2qx)} = \frac{dp}{-(p^2 + q^2 + p(-p))} = \frac{dq}{-(0 + q(-p))} \\ \Rightarrow \frac{dx}{2px - z} &= \frac{dy}{2qx} = \frac{dz}{2(p^2 + q^2)x - pz} = \frac{dp}{-q^2} = \frac{dq}{pq} \\ \Rightarrow \frac{dx}{2px - z} &= \frac{dy}{2qx} = \frac{dz}{2pz - pz} = \frac{dp}{-q^2} = \frac{dq}{pq} \\ \Rightarrow \frac{dx}{2px - z} &= \frac{dy}{2qx} = \frac{dz}{pz} = \frac{dp}{-q^2} = \frac{dq}{pq} \end{aligned}$$

آخری دو کسرے لینے پر

$$\begin{aligned} \frac{dp}{-q} &= \frac{dq}{p} \\ pdp + qdq &= 0 \end{aligned}$$

اس مساوات کو تکمیل کرنے پر

$$p^2 + q^2 = A^2$$

مساوات (1) سے

$$pz = A^2x$$

$$\Rightarrow p = \frac{A^2 x}{z}$$

اب $p^2 + q^2 = A^2$ میں یہ قدر رکھنے پر

$$\left(\frac{A^2 x}{z}\right)^2 + q^2 = A^2$$

$$\Rightarrow q^2 = A^2 - \left(\frac{A^2 x}{z}\right)^2$$

$$\Rightarrow q^2 = \frac{A^2 z^2 - A^4 x^2}{z^2}$$

$$\Rightarrow q = \frac{A\sqrt{z^2 - A^2 x^2}}{z}$$

p اور q کی قیمتیں مساوات $pdx + qdy = dz$ میں رکھنے پر

$$\frac{A^2 x}{z} dx + \frac{A\sqrt{z^2 - A^2 x^2}}{z} dy = dz$$

$$\Rightarrow A\sqrt{z^2 - A^2 x^2} dy = z dz - A^2 x dx$$

$$\Rightarrow A dy = \frac{z dz - A^2 x dx}{\sqrt{z^2 - A^2 x^2}} \quad \dots (2)$$

اب مان لیجیے کہ $z^2 - A^2 x^2 = m$ تب $2(z dz - A^2 x dx) = dm$

اس لیے مساوات (2) سے

$$A dy = \frac{dm}{2\sqrt{m}}$$

تکمل کرنے پر

$$B + Ay = \sqrt{m}$$

$$\Rightarrow B + Ay = \sqrt{z^2 - A^2 x^2}$$

$$\Rightarrow A^2 x^2 + (B + Ay)^2 = z^2$$

جو کہ دی گئی مساوات کے لیے مطلوبہ مکمل حل ہے۔

16.3 اکتسابی نتائج (Learning Outcomes)

اس اکائی میں آپ نے غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کے نظام کے ہم آہنگ ہونے کی شرط کو سمجھا اور غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کے لیے معاون مساوات حاصل کرنا سیکھا اور پھر اس سے چارپٹ کے طریقے کو استعمال کر کے دی گئی غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کا حل حاصل کرنا سیکھا۔

16.4 کلیدی الفاظ (Key Words)

16.5 نمونہ امتحانی سوالات (Model Examination Questions)

16.5.1 معروضی جوابات کے حامل سوالات (Objective Answer Type Questions)

1. پہلے رتبے کی غیر خطی جزوی تفرقی مساواتیں $\phi(x, y, z, p, q) = 0$ اور $\psi(x, y, z, p, q) = 0$ کے ہم آہنگ ہونے کی شرط بتائیے۔
2. چارپٹ کی غیر خطی جزوی تفرقی مساوات کے لیے معاون مساوات لکھو۔
3. پہلے رتبے کی غیر خطی جزوی تفرقی مساواتیں $\phi(x, y, z, p, q) = 0$ اور $\psi(x, y, z, p, q) = 0$ کے ہم آہنگ ہونے کی شرط $\frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(x, p)} - p \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(y, q)} - q \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(z, q)} = 0$ ہے۔ (T/F)
4. مساواتیں $p - 5x + 7y = 0$ اور $q - 6x - 8y = 0$ ہم آہنگ ہیں۔ (T/F)
5. مساوات $q = 3p^2$ کے لیے معاون مساوات..... ہے۔

16.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات (Short Answer Type Questions)

1. مساوات $2(z + xp + yq) = yp^2$ کا مکمل حل حاصل کرو۔
2. مساوات $zpq = p + q$ کا مکمل حل حاصل کرو۔
3. مساوات $z = px + qy - \sin pq$ کا مکمل حل حاصل کرو۔

16.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات (Long Answer Type Questions)

1. دکھاؤ کہ جزوی تفرقی مساواتیں $z(px + qy) = 2xy$ اور $px = qy$ ہم آہنگ ہیں۔ اور پھر ان کا حل معلوم کرو۔
2. دکھاؤ کہ جزوی تفرقی مساواتیں $p^2 + q^2 = 1$ اور $p^2 + q^2 = 1$ ہم آہنگ ہیں۔ اور پھر ان کا حل معلوم کرو۔
3. مساوات $q = (z + xp)^2$ کا مکمل حل حاصل کرو۔
4. مساوات $p(1 + q^2) + (a - z)q = 0$ کا مکمل حل حاصل کرو۔

5. مساوات $p^2 + q^2 - 2(px + qy) + 1 = 0$ کا مکمل حل حاصل کرو۔

6. مساوات $pq = xz$ کا مکمل حل حاصل کرو۔

7. مساوات $px + qy + pq = 0$ کا مکمل حل حاصل کرو۔

8. $p^2x^2 + q^2y^2 = 4$ کا مکمل حل حاصل کرو۔

جوابات:

16.5.1 معروضی سوالات کے جوابات

1. $\frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(x, p)} + p \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(z, p)} + \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(y, q)} + q \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(z, q)} = 0$

2. $\frac{dx}{\frac{\partial f}{\partial p}} = \frac{dy}{\frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dz}{p \frac{\partial f}{\partial p} + q \frac{\partial f}{\partial q}} = \frac{dp}{-(\frac{\partial f}{\partial x} + p \frac{\partial f}{\partial z})} = \frac{dq}{-(\frac{\partial f}{\partial y} + q \frac{\partial f}{\partial z})}$

3. F

4. F

5. $\frac{dx}{-6p} = \frac{dy}{1} = \frac{dz}{-6p^2 + q} = \frac{dp}{0} = \frac{dq}{0}$

16.5.2 مختصر جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

1. $yz = \frac{ax}{y} - \frac{a^2}{4y^2} + b$

2. $z^2 = 2(1 + a) \left\{ x + \frac{y}{a} \right\} + b = 0$

3. $z = ax + by - ab$

16.5.3 طویل جوابات کے حامل سوالات کے جوابات

1. $z^2 = 2xy + a$

2. $z^2 = x^2 + (y + a)^2$

3. $xz = 2\sqrt{ax} + ay + b$

4. $4(bz - ab - 1) = (x + by + c)^2$

5. $(a^2 + 1)z = \frac{(ax+y)^2}{2} \pm \left[\frac{ax+y}{2} \sqrt{(ax+y)^2 - (a^2 + 1)} - \frac{(a^2+1)}{2} \log \left\{ (ax+y) + \sqrt{(ax+y)^2 - (a^2 + 1)} \right\} \right] + b$

6. $z = \left(a + \frac{x^2}{2} \right) (b + y)$

$$z = -\frac{1}{2}(y + ax)^2 + b \quad .7$$

$$z = b + \log x^a y^{\sqrt{4-a^2}} \quad .8$$

16.6 مزید مطالعے کے لیے تجویز کردہ کتابیں (Suggested Books for Further Readings)

1. Ordinary and Partial Differential Equations, M. D. Raisinghania, S. Chand & Company Ltd., 15th Edition, 2013

نمونہ امتحانی پرچہ
پرچہ: تفرقی مساوات

وقت: 3 گھنٹے

نشانات: 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم اور حصہ سوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارت ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

- 1- حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔
 $10 \times 1 = 10$
- 2- حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالات کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 200 لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔
 $5 \times 6 = 30$
- 3- حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالات کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 500 لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔
 $3 \times 10 = 30$

حصہ اول

(i) مساوات $y = x \frac{dy}{dx} + \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}$ کا رتبہ..... ہے۔

A. 2 B. 3 C. 1 D. 4

(ii) تفرقی مساوات $\log \frac{dy}{dx} = ax + b$ کا حل..... ہے۔

(iii) ذیل میں سے کون ٹھیک مساوات ہے

A. $2xydx + (x^2 + y^2)dy = 0$ B. $(y \sin 2x)dx - (\cos^2 x + y^2)dy = 0$

C. $(a^2 - 2xy - y^2)dx - (x - y)^2 dy = 0$ D. ان میں سے کوئی نہیں

(iv) مساوات $\frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x^2}$ کا I.F. ہے

A. x B. $\frac{1}{x}$ C. $\frac{-1}{x}$ D. ان میں سے کوئی نہیں

(v) مساوات $p^2 - 5p + 6 = 0$ کو جزو ضربی میں تھویل کریے۔

(vi) مساوات $y = \sin p - p \cos p$ ایک کلیرو کی مساوات ہے۔ (صحیح/غلط)

(vii) فرض کرو کہ $f(D)y = 0$ مستقل ضریب کے ساتھ متجانس تفرقی مساوات ہے۔ اگر $m_1 \neq m_2$ حاصل کردہ معاون مساوات کے دو

روٹس ہوں، تب مساوات کا عام حل ہوگا $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$ (صحیح/غلط)

(viii) مساوات $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = \cos 2x$ کے لیے اتنامی تفاعل لکھو۔

(ix) لگرائج کی خطی جزوی تفرقی مساوات کے لیے معاون مساوات کی تعریف کرو۔

(x) پہلے رتبے کی غیر خطی جزوی تفرقی مساواتیں $\phi(x, y, z, p, q) = 0$ اور $\psi(x, y, z, p, q) = 0$ کے ہم آہنگ ہونے کی کیا شرط ہے؟

حصہ دوم

2. حل کرو: $y^2 \log y = xyp + p^2, y > 0$

3. متغیر جدا پذیر طریقہ سے مساوات $y^2 \cos \sqrt{x} dx - 2\sqrt{x} e^{\frac{1}{y}} dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

4. مساوات $x^2 p^3 + yp^2 + x^2 y^2 p^2 + y^3 p = 0$ کو حل کریے۔

5. حل کرو: $(3xy^2 - y^3)dx - (2x^2y - xy^2)dy = 0$

6. حل کرو: $x \log x \frac{dy}{dx} + y = 2 \log x$

7. حل کرو: $\frac{d^4 y}{dx^4} - y = 15 \sin 2x$

8. حل کرو: $(y + zx)p - (x + yz)q = x^2 - y^2$

9. مساوات $2(z + xp + yq) = yp^2$ کا مکمل حل حاصل کرو۔

حصہ سوم

10. ثابت کرو $Ax^2 + By^2 = 1$ ، جہاں A اور B اختیاری مستقلات ہیں، کی تفرقی مساوات $xy[y'' + (y')^2] = yy'$ ہوگی۔

11. مساوات $(2xy^4 e^y + 2xy^3 + y)dx + (x^2 y^4 e^y - x^2 y^2 - 3x)dy = 0$ کو حل کرو۔

12. اگر $y = y_1, y = y_2, \dots, y = y_n$ مساوات $f(D)y = 0$ کے n غیر تابع حل ہیں، تب ثابت کرو کہ

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$$

بھی اس کا ایک حل ہوگا، جہاں $c_1, c_2, \dots, c_n$ اختیاری مستقل ہیں۔

13. مساوات $(1+x)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + (1+x) \frac{dy}{dx} + y = 4 \cos\{\log(1+x)\}$ کو حل کرو۔

14. مساوات $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - 2x(1+x) \frac{dy}{dx} + 2(1+x)y = x^3$ کا حل پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حاصل کریے۔

BSMM250CCP

لیب مینول (تفرقی مساواتیں)

بی۔ ایس سی

(دوسرا سمسٹر)

اکائی 17۔ تفرقی مساواتوں کی تشکیل، پہلے رتبے اور پہلے درجے کے تفرقی مساواتوں کے مسائل

نمونہ تجربائی سوال

17.1 مساوات $\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$ کا حل حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

دی گئی تفرقی مساوات کا حل معلوم کرنا۔

طرز عمل (Procedure)

Step I

دی گئی مساوات کی پہچان کرنا۔ اس مساوات کے متغیرات کو جدا کرتے ہیں۔

Step II

اس کے بعد حاصل کردہ مساوات کو تکمیل کریں۔

Step III

اس طرح دی گئی مساوات کا حل حاصل ہوگا۔

حل / تجویز (Solution/Calculation)

دی گئی مساوات درجہ ذیل ہے

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$$

اس مساوات کے متغیر جدا کرنے پر ہمیں حاصل ہوگا

$$\frac{dy}{1+y^2} = \frac{dx}{1+x^2}$$

دونوں جانب تکمیل کرنے پر حاصل ہے

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{1+y^2} = \int \frac{dx}{1+x^2}$$
$$\tan^{-1} y = \tan^{-1} x + C$$

مستقل C کو $\tan^{-1} C$ لینے پر

$$\tan^{-1} y - \tan^{-1} x = \tan^{-1} C$$

$$\Rightarrow \tan^{-1} \left(\frac{y-x}{1+yx} \right) = \tan^{-1} C$$

$$\Rightarrow y - x = C(1 + yx)$$

اس طرح $y - x = C(1 + yx)$ دی گئی مساوات کا حل ہو گا۔

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

حاصل کردہ حل $y - x = C(1 + yx)$ ہے۔

☆☆☆☆☆

17.2 مساوات $y = ax + bx^2$ سے اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

17.3 مساوات $y = ae^x + be^{2x} + ce^{3x}$ کے استعمال سے تفرقی مساوات حاصل کرو، جہاں a, b, c اختیاری مستقلات ہیں۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



17.4 تفرقی مساوات $\left(\frac{x+y-a}{x+y-b}\right)\frac{dy}{dx} = \frac{x+y+a}{x+y+b}$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



17.5 تفرقی مساوات $(x - y)^2 dx + 2xy dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

17.6 تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + \frac{x^2 + 3y^2}{3x^2 + y^2} = 0$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

17.7 تفرقی مساوات $(x + 2y - 3)dx = (2x + y - 3)dy$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

17.8 تفرقی مساوات $(x - y - 2) dx = (2x - 2y - 3) dy$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

17.9 مساوات $(1+x)\frac{dy}{dx} - xy = 1-x$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



اکائی 18۔ ٹھیک مساواتیں، خطی تفرقی مساوات اور ان کے مسائل

18.1 تفرقی مساوات $(1+x)\frac{dy}{dx} - xy = 1-x$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.2 مساوات $(1 + y^2) dx = (\tan^{-1} y - x) dy$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.3 تفرقی مساوات $x \frac{dy}{dx} + 2y = x^2 \log x$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.4 تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2 x}{1+x^3} - \frac{3x^2}{1+x^3} y$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.5 تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = y^2 \sin x$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.6 تفرقی مساوات $xy - \frac{dy}{dx} = y^3 e^{-x^2}$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.7 تفرقی مساوات $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2 + 1}{2xy}$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.8 مساوات $\left(1 + e^{\frac{x}{y}}\right) dx + e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right) dy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.9 تفرقی مساوات $x dx + y dy = m(x dy - y dx)$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

18.10 مساوات $(xy + 2x^2y^2)y dx + (xy - x^2y^2)xdy = 0$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



18.11 تفرقی مساوات $xy - \frac{dy}{dx} = y^3 e^{-x^2}$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



اکائی 19- $p = \frac{dy}{dx}$ کے لیے حل کی جانے والی مساواتیں اور پہلے رتبے اور اعلیٰ

درجے کی مساواتوں کے مسائل

19.1 مساوات $x^2p^2 - 2xyp + 2y^2 - x^2 = 0$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

19.2 مساوات $p^3(x + 2y) + 3p^2(x + y) + p(2x + y) = 0$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

19.3 مساوات $xp^2 - 2yp + ax = 0$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

19.4 مساوات $y + px = x^4 p^2$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

19.5 مساوات $x^2 = a^2(1 + p^2)$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

19.6 مساوات $y = \frac{xp^2+9x^2}{3p}$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

19.7 مساوات $xp^3 - p^2 - 1 = 0$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

19.8 مساوات $xyp^2 + p(3x^2 - 2y^2) = 6xy$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

19.9 مساوات $x(1 + p^2) = 1$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجويز (Solution/Calculation)

نتيجه / اختتام (Conclusion/Result)



اکائی 20۔ کلیر وکی مساوات اور تفرقی مساوات کے اطلاقات کے مسائل

20.1 مساوات $y = xp^2 + p^4$ کا حل حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

20.2 مساوات $y = 2px - p^2$ کا حل حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

20.3 مساوات $y = 3px + 4p^2$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

20.4 اگر ریڈیم کی نصف دوران حیات 1600 سال ہو تو کتنے وقت میں 100 mg سے گھٹ کر 90 mg ہو جائے گی۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



20.5 منحنیات کے خاندان $xy = c^2$ ، جہاں c ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی
ٹراجکٹری (Orthogonal Trajectory) حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

20.6 دائروں کے خاندان $x^2 + y^2 = r^2$ کو 30° کے جھکاؤ پر کاٹنے والی اوہلک (Oblique) ٹریجیکٹری کی

مساوات حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

20.7 منحنیات کے خاندان $r = a(\sec \theta + \tan \theta)$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی
ٹریجیکٹری حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

20.8 منحنیات کے خاندان $\frac{x^2}{a^2+\lambda} + \frac{y^2}{b^2+\lambda} = 1$ جہاں λ ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹریجیکٹری حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

20.9 منحنیات کے خاندان $x^2 - y^2 + 2\lambda xy = 1$ ، جہاں λ ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی
ٹریجیکٹری حاصل کریے۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



20.10 دکھاؤ کہ منحنیات کے خاندان $r = a(1 + \cos \theta)$ کی عمودی ٹریجیکٹری ذیل ہوگی
 $r = b(1 - \cos \theta)$

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



اکائی 21۔ مستقل ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساواتوں کے مسائل

21.1 اگر $y = v$ مساوات $f(D)y = Q$ کا خاص تکملہ ہو اور $y = u$ جس میں n غیر تابع اختیاری مستقل ہیں، مساوات $f(D)y = 0$ کا عام حل ہو، تب ثابت کرو کہ $y = u + v$ مساوات $f(D)y = Q$ کا عام حل ہو گا۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

21.2 اگر متجانس تفرقی مساوات کے r روٹس برابر ہوں، تب اس کا حل کس طرح حاصل کیا جاتا ہے؟

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



21.3 مساوات $\frac{d^3y}{dx^3} - 3\frac{d^2y}{dx^2} + 9\frac{dy}{dx} + 13y = 0$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



21.4 مساوات $\frac{d^3x}{dt^3} + 3\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + x = 0$ کا حل محسوب کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

21.5 اگر $y = y_1, y = y_2, \dots, y = y_n$ مساوات $f(D)y = 0$ کے n غیر تابع حل ہیں، تب دکھاؤ کہ

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n$$

بھی اس کا ایک حل ہوگا، جہاں $c_1, c_2, \dots, c_n$ اختیاری مستقلات ہیں۔

منقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

21.6 $\frac{d^2y}{dx^2} - 2\frac{dy}{dx} - 3y = 2e^x - 10 \sin x$ کو حل کرو جب کہ دیا گیا ہے $y(0) = 2$

اور $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=0} = 4$

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



$$21.7 \quad \frac{d^3y}{dx^3} + 2\frac{d^2y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} = e^{2x} + x^2 + x \text{ کو حل کرو۔}$$

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



$$\left(\frac{dx}{dt}\right)_{t=0} = 0 \text{ اور } x(0) = 0 \text{ دیا گیا ہے کہ } \frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + 5x = 10 \quad 21.8$$

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



اکائی 22۔ متغیر ضریب کی متجانس خطی تفرقی مساوات اور پیرامیٹرس کے تغیر کے مسائل

22.1 حل کرو: $x^4 \frac{d^3y}{dx^3} + x^3 \frac{d^2y}{dx^2} - x^2 \frac{dy}{dx} + xy = 1$

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

22.2 مساوات $(5 + 2x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 6(5 + 2x) \frac{dy}{dx} + 8y = 0$ کا حل معلوم کرو۔

منقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

22.3 مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 3y = x^2 \log x$ کو حل کیجیے۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

22.4 مساوات $(1+x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + (1+x) \frac{dy}{dx} + y = 4 \cos\{\log(1+x)\}$ کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

22.5 مساوات $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -\frac{1}{x(1+x^2)}$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل معلوم کرو۔۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

22.6 مساوات $(1-x)^2 \frac{d^2y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} - y = (1-x)^2$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے سے حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



22.7 مساوات $\frac{d^2y}{dx^2} - 3\frac{dy}{dx} + 2y = \frac{e^x}{1+e^x}$ کو پیرامیٹرس کے تغیر کے طریقے کی مدد سے حل کرو
جب کہ اس کے لیے متمم تفاعل $y = C_1e^x + C_2e^{2x}$ ہے۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

اکائی 23۔ جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کے مسائل

23.1 اختیاری مستقلات a اور b کو ساقط کر کے $z = axe^y + \frac{1}{2}a^2e^{2y} + b$ سے جزوی تفرقی مساوات کی تشکیل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



23.2 سبھی قائم دائری مقروط (Right Circular Cone) کے سیٹ جن کی محور z (Axis) – محور کو چھوتی ہے۔ اس کے لیے جزوی تفرقی مساوات حاصل کریں۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

23.3 ان سبھی کروں (Spheres) کے لیے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو جن کا مرکز XY مستوی پر ہو اور جس کا نصف قطر 4 ہو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

23.4 Z- محور پر مرکز والے سبھی کروں کے لیے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

23.5 تفاعلات ϕ اور ψ کو ہٹا کر $z = y\phi(x) + x\psi(y)$ سے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

23.6 ضابطہ $F(x + y + z, x^2 + y^2 - z^2) = 0$ سے اختیاری تفاعل F کو ہٹائیے۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



اکائی 24۔ لگراج اور چارپٹ کے طریقے کے مسائل

24.1 $p - 2q = 3x^2 \sin(y + 2x)$ کا حل حاصل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

24.2 مساوات $(x^2 - yz)p + (y^2 - zx)q = z^2 - xy$ کو حل کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

24.3 مساوات $z^2 = pqxy$ کو چارپٹ کے طریقے سے حل کیجیے۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



24.4 بتلاؤ کہ جزوی تفرقی مساواتیں $p^2 + q^2 = 1$ اور $(p^2 + q^2)x = pz$ ہم آہنگ ہیں اور پھر ان کا حل معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)

☆☆☆☆☆

24.5 مساوات $pq = xz$ کا چارپٹ کے طریقے سے مکمل حل (Complete Solution) معلوم کرو۔

مقصد (Aim)

طرز عمل (Procedure)

حل / تجویز (Solution/Calculation)

نتیجہ / اختتام (Conclusion/Result)



نمونہ امتحانی پرچہ

ریاضیات (لیب مینول)

BSMM250CCP

بی۔ ایسی۔ (سمسٹر دوم)

سمسٹر - II

کل نمبر: 35

وقت: 3 Hrs

(5 × 7 = 35)

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی پانچ سوالات کے جواب دیجیے

- 1- حل معلوم کیجیے: $(x - y - 2)dx + (x - 2y - 3)dy = 0$
- 2- حل کرو: $(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + 4xy = \frac{1}{x^2 + 1}$
- 3- مساوات $xyp^2 - (x^2 - y^2)p - xy = 0$ کو حل کریے۔
- 4- منحنیات کے خاندان $x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}$ جہاں a ایک پیرامیٹر ہے، کے لیے عمودی ٹرانسجکٹری محسوب کریے۔
- 5- کسی مناسب طریقے سے مساوات $y = 12e^x \left(\frac{dy}{dx} - 1 \right)^3 - \frac{d^2y}{dx^2} \left(\frac{dy}{dx} + 1 \right)$ کا حل معلوم کرو۔
- 6- مساوات $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - 3y = x^2 \log x$ کو حل کرو۔
- 7- تفاعلات ϕ اور ψ کو ساقط کر کے $z = \phi(x) + \psi(y)$ سے جزوی تفرقی مساوات حاصل کرو۔
- 8- مساوات $p^2 + q^2 - 2(px + qy) + 1 = 0$ کا مکمل حل حاصل کرو۔